

Núdzové telefónne kontakty

Počas ordinačných hodín:

Mimo ordinačných hodín:

Roche Slovensko, s.r.o.,
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
tel.: 02/5263 8201, fax: 02/5263 5015, www.roche.sk

Program prevencie gravidity pri užívaní lieku Erivedge®,
FINAL, 23.DEC.2016.

Schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv dňa 23.DEC.2016

Dátum prípravy materiálu: december 2018 SK/ERIV/1218/0004a

Erivedge
vismodegib
Treatment Transformed

PRIPOMIENKOVÁ KARTA



pacienta

Erivedge
vismodegib
Treatment Transformed

Erivedge® môže poškodiť alebo spôsobiť úmrtie vášho nenarodeného dieťaťa. Pacientky, ktoré môžu otehotnieť, musia:

- Vždy používať **2 formy** odporúčanej antikoncepcie počas liečby a počas 24 mesiacov po poslednej dávke (pre viac informácií pozri v brožúre “Program prevencie gravidity pri užívaní lieku Erivedge®: Informácie pre pacientov užívajúcich Erivedge®“)
- Každý mesiac absolvovať tehotenský test na kontrolu tehotenstva.

Pacienti-muži musia dodržiavať:

- Vždy používať kondóm (so spermicídom, ak je dostupný) pri pohlavnom styku s partnerkou počas liečby a počas 2 mesiacov po poslednej dávke.
- Nesmú darovať spermie počas liečby a počas 2 mesiacov po poslednej dávke.

Ak nedostanete menštruáciu, ak máte podozrenie, že ste tehotná alebo ste tehotná, resp. vaša partnerka nedostane menštruáciu, máte podozrenie, že je tehotná alebo je tehotná, okamžite sa musíte poradiť so svojim lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

- Pacientky: ak máte podozrenie na tehotenstvo pri užívaní lieku Erivedge® a počas 24 mesiacov po poslednej dávke, poraďte sa so svojim lekárom.
- Pacienti-muži: ak má vaša partnerka podozrenie, že otehotnela počas obdobia, keď ste užívali Erivedge® a počas 2 mesiacov po vašej poslednej dávke, poraďte sa so svojim lekárom.

Všetci pacienti musia dodržiavať nasledovné:

Nikdy nedávajte tento liek nikomu inému.

Nedarujte krv počas liečby a počas 24 mesiacov po poslednej dávke.

Po skončení liečby vráťte všetky nepoužité kapsuly.