

KARTA PACIENTA



Eliquis[®]
(apixabán)

Túto kartu máte vy/má dieťa/má opatrovateľ nosiť vždy so sebou.

Ukážte túto kartu lekárnikovi, zubárovi alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi pred liečbou.

Informácie pre pacientov/opatrovateľov

- Eliquis užívajte/podávajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte rannú dávku, užite/podajte ju ihneď, ako si na to spomeniete a môžete ju užiť/podať aj spolu s večernou dávkou. Vynechanú večernú dávku môžete užiť/podať len v ten istý večer. Nasledujúce ráno neužívajte/nepodávajte dve dávky, ale pokračujte podľa dávkovacej schémy dvakrát denne v súlade s odporúčaním.
- Neprestaňte užívať/podávať Eliquis, ak sa najprv neporadíte s lekárom, pretože ste vy vystavený/pacient je vystavený riziku mozgovej príhody/krvnej zrazeniny a iných komplikácií.

- Eliquis pomáha riediť krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.
- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.
- Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**
- Ak vy potrebujete/pacient potrebuje operáciu alebo akýkoľvek invazívny zákrok, informujte lekára, že vy užívate/pacient užíva Eliquis.

Užívam antikoagulančnú liečbu, liek Eliquis (apixabán), na prevenciu tvorby krvných zrazenín.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Eliquis (apixabán) je perorálne antikoagulans, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- Eliquis môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácaných príhod sa má liečba okamžite zastaviť.
- Liečba Eliquisom si nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Kalibrované kvantitatívne stanovenie anti-faktora Xa môže byť prospešné vo

výnimočných situáciách, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) – pozri SPC.

- Pre dospelých je k dispozícii účinná látka na zvrátenie účinku apixabánu pôsobiaceho proti faktoru Xa, avšak jej bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené u pediatrických pacientov (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku pre andexanet alfa).

Vyplňte nasledujúce časti, alebo o to požiadajte lekára.

Meno: _____

Dátum narodenia: _____

Indikácia: _____

Hmotnosť: _____

Dávka: _____ mg dvakrát denne

Meno lekára: _____

Telefónne číslo lekára: _____