



KARTA PRE PACIENTA



Eliquis[®]
(apixabán)

**Túto kartu noste vždy so sebou.
Ukážte túto kartu svojmu lekárnikovi, zubárovi
alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu
pracovníkovi, ktorý vás lieči.**

Informácie pre pacientov

- Eliquis užívajte pravidelne podľa pokynov.
Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete a pokračujte podľa predpísanej schémy.
- Neprestaňte užívať Eliquis, ak sa najprv neporadíte so svojím lekárom, pretože ste vystavený riziku mozgovej príhody a iných komplikácií.
- Eliquis pomáha zriediť vašu krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.

- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.
- Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**
- Ak potrebujete operáciu alebo akýkoľvek invazívny zákrok, informujte ošetrojúceho lekára, že užívate Eliquis.

Užívam antikoagulančnú liečbu, liek Eliquis (apixabán), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Eliquis (apixabán) je perorálne antikoagulans, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- Eliquis môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácajúcich príhod sa má liečba okamžite zastaviť.

- Liečba Eliquisom si nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Kalibrované kvantitatívne stanovenie anti-faktora Xa môže byť prospešné vo výnimočných situáciách, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) – pozri SPC.
- K dispozícii je účinná látka na zvrátenie účinku apixabánu pôsobiaceho proti faktoru Xa.

Vyplňte nasledujúce časti, alebo o to požiadajte svojho lekára.

Meno: _____

Dátum narodenia: _____

Indikácia: _____

Dávka: _____ mg dvakrát denne

Meno lekára: _____

Telefónne číslo lekára: _____