

## Kontrolný dotazník pre osoby oprávnené predpisovať pero Jext®

› Jext® je naplnené (injekčné) pero na podanie jednej dávky adrenalínu (vo forme tartrátu).


› Pero Jext® je indikované na nalievavú liečbu závažných akútnych alergických reakcií (anafylaxie) po pichnutí alebo uštipnutí hmyzom, po jedle, liekoch a iných alergénoch a tiež pri anafylaxii z idiopatických príčin alebo vyvolanej fyzickou námahou.

› Informovanosť pacientov a ich opatrovateľov je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie včasného a správneho použitia a podania adrenalínu v nalievavých situáciách, a preto je tiež dôležitou súčasťou riadenia rizík u pacienta. Poznatky o metóde správneho podania a starostlivosti o pomôcku okrem toho znížia riziko náhodného alebo zbytočného podania lieku, čím sa minimalizuje riziko nežiaducich reakcií.

› Účelom tohto dotazníka je pomôcť Vám ako osobe oprávnenej predpisovať Jext® informovať pacienta a/alebo jeho opatrovateľov o správnom použití, uchovávaní a starostlivosti o pero Jext®. Tento dotazník môže byť použitý ako inštruktážna pomôcka alebo na dokumentovanie konzultácií s jednotlivými pacientmi.

Pre pacientov a ich opatrovateľov sú k dispozícii vzdelávacie materiály týkajúce sa správneho použitia, uchovávaní a starostlivosti o pero Jext®:

- › Školiace pero Jext®
- › Inštruktážne video
- › Informačná karta pacienta



## Jext®: Návod na použitie

1›



1. Uchopte Jext do dominantnej ruky (ruka používaná pri písaní), pričom palec je umiestnený čo najbližšie k žltému poistnému uzáveru.

2›



2. Druhou rukou odstráňte žltý poistný uzáver.

3›



3. Čierny hrot injekčného pera priložte na vašu vonkajšiu stranu stehna, držte pero v pravom uhle (približne 90 °) oproti stehnu.

4›



4. Tlačte čierny hrot do vonkajšej strany vášho stehna, pokiaľ nezaznie „klik“, čo potvrdzuje, že injekcie sa začala podávať, potom držte pero zatlačené. Zabodnuté pero podržte v stehne 10 sekúnd (pomaly počítajte do 10) a potom ho vytiahnite. Čierny hrot sa rozšíri a automaticky skryje ihlu.

5›



5. Miesto vpichu masírujte 10 sekúnd. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Zavolajte na číslo 112, požiadajte o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámte „anafylaxia“.

## Kontrolný dotazník pre osoby oprávnené predpisovať pero Jext®

› Zabezpečte, aby ste ako osoba oprávnená predpisovať mohli odpovedať „Áno“ na ďalej uvedené otázky týkajúce sa predpisovania, pokynov pre používateľov, uchovávaní a starostlivosti o pero Jext®.

Meno pacienta: \_\_\_\_\_

### › Predpisovanie

Má pacient hmotnosť 15 kg až 30 kg?	Predpíšte pero Jext® 150 mikrogramov
Má pacient vyššiu hmotnosť ako 30 kg?	Predpíšte pero Jext® 300 mikrogramov
Boli pacientovi predpísané dve perá Jext®?	
Bolo pacientovi odporučené nosiť vždy so sebou dve perá Jext®?	

### › Pokyny na použitie

Bol pacient poučený za akých okolností má použiť Jext ?	
Bolo pacientovi ukázané správne zaobchádzanie s perom a metóda podania?	
Bol pacient poučený, aby kontaktoval pohotovosť a požiadal o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámil „anafylaxia“ po použití pera Jext®?	
Bol pacient informovaný, že si má po 5-15 minútach podať druhé pero Jext®, ak nenastalo klinické zlepšenie?	
Bol pacient zaškolený v metóde podávania lieku v budúcnosti pomocou školiaceho pera Jext®?	
Dostal pacient Informačnú kartu pacienta obsahujúcu ďalšie informácie a odporúčania?	
Bolo pacientovi odporučené, aby si pozrel inštruktážne video, ako používať pero Jext Inštruktážne video je dostupné na stránke : <a href="http://www.alkabello.sk/jext/">http://www.alkabello.sk/jext/</a>	

### › Uchovávanie a starostlivosť

Bol pacient poučený, že svoje pero Jext® má uchovávať pri teplote do 25 °C a že liek nemá uchovávať v mrazničke?	
Bol pacient poučený, aby pravidelne kontroloval adrenálny roztok cez okienko jednotky na uistenie, že roztok je číry a bezfarebný, a aby pero vymenil, ak roztok zmenil zafarbenie alebo obsahuje zrazeninu?	
Bol pacient informovaný, že má pravidelne kontrolovať svoje pero Jext® a po uplynutí dátumu expirácie má pero vymeniť?	

Podpis predpisujúcej osoby: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_