

Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto prejavov, okamžite informujte svojho lekára. Ak máte akékoľvek otázky o vašej liečbe, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.	Je důležité, aby ste svojmu ošetrujícímu lékaři počas liečby Opsumitom okamžite hlásili každé tehotenstvo alebo vedľajší účinok. Liečebné centrum: Meno predpisujúceho lekára: Telefónne číslo predpisujúceho lekára:	Karta pacienta Opsumit macitentan Táto kartička obsahuje důležité informácie o bezpečnosti, o ktorých musíte byť oboznámený pred liečbou Opsumitom. Noste túto kartičku vždy so sebou a ukážte ju každému ošetrujícímu lékaři. SK	Pokud zaznamenáte kteroukoli z těchto známek, ihned informujte svého lékaře. Pokud máte jakékoli otázky týkající se Vaší léčby, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.	Je důležité, abyste ihned svému předepisujícímu lékaři hlásili každé otěhotnění nebo nežádoucí účinek, které se mohou objevit během léčby přípravkem Opsumit. Léčebné centrum: Jméno předepisujícího lékaře: Telefonní číslo předepisujícího lékaře: 7121623	Karta pacienta Opsumit macitentan Tato karta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které potřebujete znát, pokud se léčíte přípravkem Opsumit. Tuto kartu noste stále s sebou a ukažte ji každému lékaři, který Vám bude poskytovat lékařskou péči. CS
---	---	---	---	--	--

Těhotenství

Přípravek Opsumit může narušit vývoj plodu.

Proto nesmíte přípravek Opsumit užívat, pokud

jste těhotná a také nesmíte během užívání

přípravku Opsumit otěhotnět. Navíc, pokud trpíte

plicní arteriální hypertenzí, může těhotenství

vážně zhoršit příznaky nemoci.

Antikoncepce

Během užívání přípravku potřebujete používat

spolehlivou metodu antikoncepce. Všechny

případné otázky určitě prodiskutujte se svým

lékařem.

Před zahájením léčby přípravkem Opsumit

a každý další měsíc léčby si musíte nechat

udělat těhotenský test, i když si myslíte,

že nejste těhotná.

Tak jako jiné léky z této skupiny může mít

přípravek Opsumit vliv na játra. Váš lékař

provede krevní testy před zahájením léčby

přípravkem Opsumit a potom během léčby,

aby ověřil, jestli Vaše játra pracují správně.

Známky toho, že Vaše játra nemusí pracovat

správně, zahrnují:

- pocit na zvracení (nauzea)

- zvracení

- horečku (vysokou teplotu)

- bolest žaludku (břicha)

- žloutenku (zežloutnutí kůže nebo bělma očí)

- tmavou moč

- svědění kůže

- letargii nebo únavu (neobvyklou únavu nebo

- vyčerpání)

- syndrom podobný chřipce (bolest kloubů a svalů

- s horečkou)

Tehotenstvo

Opsumit může poškodit vývoj plodu. Preto

nesmiete užívať Opsumit, ak ste tehotná a tiež

nesmiete otehotniť, ak užívate Opsumit. Navyac,

ak máte pľúcnu artériovú hypertenziu, tehotenstvo

môže vážne zhoršiť príznaky vašej choroby.

Antikoncepcia

Počas liečby Opsumitom potrebujete spoľahlivú

antikoncepciu. S každou otázkou sa neváhajte

obrátiť na svojho lekára.

Pred začiatkom liečby Opsumitom a každý

nasledujúci mesiac si musíte urobiť tehotenský

test, a to aj vtedy, ak si myslíte, že nie ste

tehotná.

Podobne ako ostatné lieky z tejto skupiny,

Opsumit môže mať vplyv na pečeň. Pred

začiatkom liečby a počas liečby Opsumitom vám

váš lekár vykoná krvné testy, aby zistil či vaša

pečeň pracuje správne.

Prejavy toho, že vaša pečeň nepracuje správne,

môžu byť:

- nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

- vracanie

- horúčka (vysoká telesná teplota)

- bolesti žalúdka (brucha)

- žltacka (žltnutie kože a očných bielkov)

- tmavý moč

- svrbenie kože

- letargia alebo únava (neobvyklá únava alebo

- vyčerpanie)

- syndróm podobný chrípke (bolesti kĺbov, svalov,

- horúčka)