

Karta pacienta Rivaroxaban Medreg 2,5 mg Rivaroxaban Medreg 10 mg Rivaroxaban Medreg 15 mg Rivaroxaban Medreg 20 mg Túto kartu noste vždy so sebou Túto kartu ukážte pred liečbou každému lekárovi alebo zubnému lekárovi Rivaroxaban	Čo mám vedieť o Rivaroxabane Medreg? Rivaroxaban Medreg zriedzuje krv, čím u Vás zabráňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín. Rivaroxaban Medreg sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, nikdy nevynchajte dávku. Rivaroxaban Medreg nesmiete prestať užívať bez toho, aby ste sa najprv neporadili so svojim lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť. Predtým ako začnete užívať Rivaroxaban Medreg, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.	Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Rivaroxaban Medreg. Kedy mám vyhľadať pomoc môjho lekára? Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Rivaroxaban Medreg, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, Rivaroxaban Medreg nezačnite užívať bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojim lekárom. Okamžite informujte lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:	bolest opuch alebo zdravotné ťažkosti bolest hlavy, závrat alebo slabosť nezvyčajná tvorba podliatin, kváčanie z nosa, kváčanie z ďasien, rezne rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania menštruálne krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne krv v moči, ktorý môže mať mat ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina	Ako mám Rivaroxaban Medreg užívať? Na zabezpečenie optimálnej ochrany, Rivaroxaban Medreg • 2,5 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla • 10 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla • 15 mg sa musí užívať s jedlom • 20 mg sa musí užívať s jedlom
--	---	--	--	--

 Užívam antikoagulačnú liečbu Rivaroxabanom Medreg (rivaroxabán) Meno: Hmotnosť: Adresa: Iné lieky / ochorenia: Dátum narodenia: | V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte: Meno lekára: Telefón lekára: Pečiatka lekára: | Informujte, prosím, aj: Meno: Telefón: Vzťah k pacientovi: | Informácia pre zdravotníckych pracovníkov: Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Rivaroxabanu Medreg. | XXXXX |

Informační karta pro pacienta Rivaroxaban Medreg 2,5 mg Rivaroxaban Medreg 10 mg Rivaroxaban Medreg 15 mg Rivaroxaban Medreg 20 mg Tuto kartu noste vždy při sobě. Kartu ukažte každému lékaři nebo zubnímu lékaři ještě před ošetřením. Rivaroxaban	Co musím vědět o přípravku Rivaroxaban Medreg? Připravek Rivaroxaban Medreg ovlivňuje srážlivost krve a brání tak tvorbě nebezpečných krevních sraženin. Připravek Rivaroxaban Medreg se musí vždy užívat přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Aby byla zajištěna optimální prevence tvorby krevních sraženin, nikdy nevynechávejte žádnou dávku. Bez předchozí konzultace se svým lékařem nikdy neprestávejte užívat přípravek Rivaroxaban Medreg, neboť by se mohlo zvýšit riziko tvorby krevních sraženin ve Vašem těle. Než začnete užívat přípravek Rivaroxaban Medreg, informujte svého lékaře o všech jiných lécích, které užíváte, v nedávné době jste užíval(a), nebo které se chystáte užívat. Kdy svého lékaře žádat o radu? Jestliže užíváte přípravek snižující srážlivost krve, jako je Rivaroxaban Medreg, je důležité, abyste si byl(a) vědom(a) jeho možných nežádoucích účinků. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je krvácení. Jestliže víte, že Vám hrozí riziko krvácení, bez porady s lékařem nezačínejte přípravek Rivaroxaban Medreg užívat. Svého ošetřujícího lékaře ihned informujte, jestliže se u Vás objeví příznaky nebo známky krvácení, jako například:	bolest otok nebo nepřiměřený pocit bolest hlavy, závrat nebo slabost neobvyklé modřiny, krvácení z nosu, krvácení z dásní, rány, které dlouho krvácejí menstruační nebo vaginální krvácení silnější než obvykle krev v moči, která může být růžové nebo hnědé zbarvená, červená nebo černá stolice vykašlávání krve nebo zvracení krve nebo zvratky, které vypadají jako kávová sedlina Jak se přípravek Rivaroxaban Medreg užívá? Aby byla zajištěna optimální ochrana, přípravek Rivaroxaban Medreg - 2,5 mg se může užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle - 10 mg se může užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle - 15 mg se musí užívat s jídlem - 20 mg se musí užívat s jídlem	Užívám antikoagulační léčbu přípravkem Rivaroxaban Medreg (rivaroxaban) Jméno: Hmotnost: Adresa: Jiné léky/nemocnění: Datum narození:	V naléhavém případě prosím informujte: Jméno lékaře: Telefonní číslo lékaře: Razítko lékaře:	Rovněž informujte: Jméno: Telefonní číslo: Příbuzenský vztah:	Informace pro ošetřujícího lékaře: • Hodnoty INR nemají být používány, neboť nejsou spolehlivým ukazatelem antikoagulační aktivity přípravku Rivaroxaban Medreg.
--	--	---	--	---	--	---