

# Karta detského pacienta

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Toto dieťa sa v súčasnosti lieči ULTOMIRISOM® a môže mať zníženú prirodzenú odolnosť proti infekciám, najmä proti meningokokovým infekciám, ktoré zahŕňajú meningitídu (zápal mozgových blán) a otravu krvi (známu ako sepsa). Ak spozorujete, že dieťa má niektorý z prejavov a príznakov uvedených na tejto karte, ktoré môžu naznačovať závažnú infekciu, okamžite volajte lekára dieťaťa.

TU MÔŽETE  
UMIESTNIŤ  
FOTOGRAFIU  
VÁŠHO  
DIEŤAŤA.

**Meningitída** sa môže stať život ohrozujúca v priebehu niekoľkých hodín.<sup>1</sup>

Ak sa objavia **AKÉKOL'VEK** prejavy alebo príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak sa nemôžete spojiť s ošetrujúcim lekárom vášho dieťaťa, okamžite zoberte dieťa na pohotovosť a ukážte zdravotníckemu personálu túto kartu. Aj keď vaše dieťa prestalo užívať ULTOMIRIS®, uchovajte si túto kartu pri sebe po dobu 8 mesiacov od poslednej dávky ULTOMIRISU®. Riziko meningokokovej infekcie môže u vášho dieťaťa pretrvávať až 8 mesiacov po poslednej dávke ULTOMIRISU®.

Meno pacienta: \_\_\_\_\_

Kontaktné informácie rodiča/zákonného zástupcu: \_\_\_\_\_

Meno lekára: \_\_\_\_\_

Kontaktné informácie lekára: \_\_\_\_\_

---

# Karta detského pacienta

## PRÍZNAKY MENINGITÍDY A SEPTIKÉMIE U DOJČIAT A DETÍ:<sup>2,3</sup>

### ČASTÉ PREJAVY A PRÍZNAKY:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Horúčka, studené ruky a chodidlá                           | <input type="checkbox"/> Nezvyčajný plač, stonanie                                 |
| <input type="checkbox"/> Stuhnutá šija, odpor proti jasnému svetlu (svetloplachosť) | <input type="checkbox"/> Napätá, vypuklá fontanela (obvykle mäkké miesto na hlave) |
| <input type="checkbox"/> Zrýchlené dýchanie alebo chrochtanie                       | <input type="checkbox"/> Kŕče/záchvaty   |
| <input type="checkbox"/> Bledá, škvrnitá koža, škvrvny/vyrážky                      | <input type="checkbox"/> Závažná bolesť svalov                                     |
| <input type="checkbox"/> Odmietanie jedla a vracanie                                | <input type="checkbox"/> Závažná bolesť hlavy                                      |
| <input type="checkbox"/> Podráždenosť, nevôľa pri opatrovaní                        | <input type="checkbox"/> Zmätenosť   |
| <input type="checkbox"/> Ospalosť, ochablosť, nereagovanie na podnety               | <input type="checkbox"/> Podráždenosť  |

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Tomuto pacientovi bola predpísaná liečba ULTOMIRISOM®. ULTOMIRIS® je protilátka, ktorá inhibuje aktiváciu koncového komplementu. Kvôli mechanizmu účinku používanie ULTOMIRISU® zvyšuje náchylnosť pacienta na meningokokové infekcie (*Neisseria meningitidis*). Pred začatím liečby má byť tento pacient zaočkovaný proti meningokokovým infekciám alebo dostať antibiotiká, môže však byť stále náchylný na meningokokové infekcie alebo iné všeobecné infekcie. Je dôležité, aby ste pozorne monitorovali výskyt skorých príznakov meningokokovej infekcie, okamžite vyhodnotili, či je podozrenie na infekciu, a v prípade potreby začali liečbu antibiotikami. U niektorých pacientov sa vyskytli reakcie na infúziu po podaní ULTOMIRISU®. Časté celkové poruchy alebo reakcie v mieste podania infúzie zahŕňajú pyrexiu, ochorenie podobné chrípke, únavu, zimnicu a asténiu. Viac informácií o ULTOMIRIS® nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

V prípade pochybností ohľadom bezpečnosti volajte na: +421 2 20833 600

### HLÁSENIE PODOZRENÍ NA VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ak sa u vás vyskytne akékoľvek podozrenie na vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa lieku. Podozrenie na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky lieku nájdete na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch/. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete tiež hlásiť do spoločnosti Swixx Biopharma s. r. o., Bratislava, Slovensko, lokálnemu partnerovi Alexionu, e-mail: [medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com](mailto:medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com).

### Odkazy

1. Meningitis in babies and children under five. Meningitis Now website. <https://www.meningitisnow.org/meningitis-explained/signs-and-symptoms/meningitis-babies-and-children-under-five/> Accessed 08 September, 2020.
2. Signs and symptoms of meningitis in babies and toddlers. Meningitis Now website. <https://www.meningitisnow.org/meningitis-explained/signs-and-symptoms/signs-and-symptoms-babies-and-toddlers/> Accessed 08 September, 2020.
3. Meningitis symptoms in children. Meningitis Now website. Available at: <https://www.meningitisnow.org/meningitis-explained/signs-and-symptoms/signs-and-symptoms-children/> (Accessed: 08 September 2020).

