

Karta pacienta

WELIREG®



(belzutifan)

- Neužívajte WELIREG na von Hippel-Lindau-ovu chorobu, ak ste tehotná.
- Ak ste tehotná a potrebujete liečbu pre karcinóm z renálnych buniek (renal cell carcinoma, RCC), porozprávajte sa o použití WELIREGU so svojím lekárom.
- WELIREG môže ublížiť dieťaťu a môže spôsobiť spontánny potrat. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
- Váš lekár vám urobí tehotenský test predtým, ako začnete užívať WELIREG.
- Počas užívania WELIREGU nesmiete otehotnieť.

Kontrola počatia (antikoncepcia)

- Ak ste žena v plodnom veku:
 - metódy kontroly počatia, ktoré obsahujú hormóny – ako sú antikoncepčné tablety, injekcie alebo transdermálne (kožné) náplaste – nemusia počas užívania WELIREGU dostatočne účinkovať;
 - počas užívania WELIREGU a minimálne po dobu 1 týždňa po vašej poslednej dávke musíte:
 - používať účinnú formu nehormonálnej kontroly počatia (antikoncepcia) alebo
 - zaistiť, aby váš mužský partner používal prezervatív.
- Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o metódach kontroly počatia, ktoré pre vás môžu byť vhodné počas užívania WELIREGU.
- Ak počas liečby otehotniete alebo si myslíte, že ste mohli otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Viac informácií nájdete v písomnej informácii
pre používateľa WELIREGU obsahujúcej infor-
mácie pre pacienta.

Dôležité kontaktné informácie

Meno lekára

.....

Tel. č. do ambulancie

.....

Tel. č. mimo ordinačných hodín

.....

Moje meno

.....



