
Pacient [Meno/Identifikačné číslo]

Meno ošetrojúceho lekára

Telefónne číslo ošetrojúceho lekára (počas ordinačnej dobe)

Telefónne číslo ošetrojúceho lekára v naliehavých prípadoch (po ordinačnej dobe)

Núdzové kontaktné údaje najbližšieho príbuzného

Dátum prvej dávky epkoritamabu

Verzia 1.0 Júl 2023; Schválené ŠÚKL: November/2023

SK-EPCOR-230001
abbvie

▼ Karta pacienta

Túto kartu majte stále pri sebe. Ukážte ju každému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý sa podieľa na vašej zdravotnej starostlivosti vrátane hospitalizácie.

Informujte každého zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa podieľa na vašej zdravotnej starostlivosti, že užívate Tepkinly® (epkoritamab).

Ak sa u vás po liečbe epkoritamabom objavia akékoľvek vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho ošetrojúceho lekára alebo zdravotnú sestru.

Buďte opatrní pri šoférovaní, bicyklovaní alebo obsluhu ťažkých alebo potenciálne nebezpečných strojov. Ak máte niektorý z príznakov opísaných na tejto karte, je potrebné sa týmto činnostiam vyhýbať.

▼ *Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky (NÚ) môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku, a to spoločnosti AbbVie s.r.o. na safety-sk@abbvie.com alebo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Tel: +421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia NÚ je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení NÚ: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.*

Informácie pre pacientov

Epkoritamab môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky.

Ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov ihneď kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc:

- Horúčka (38°C alebo vyššia)
- Závraty alebo točenie hlavy
- Zimnica
- Rýchly srdcový tep
- Problémy s dýchaním
- Bolesť hlavy
- Problémy s rozprávaním alebo písaním
- Ospalosť
- Zmätenosť/dezorientácia
- Svalová slabosť
- Epileptické záchvaty
- Strata pamäte

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Tento pacient je liečený epkoritamabom, bišpecifickou protilátkou pôsobiacou na T-bunky.
- Po liečbe epkoritamabom sa môže vyskytnúť syndróm uvoľnenia cytokínov (CRS) a syndróm súvisiaci s poliekovou aktiváciou imunitných efektorových buniek (ICANS), ktoré môžu byť predstavovať závažnú komplikáciu, ak nie sú okamžite liečené. CRS sa môže objaviť niekoľko hodín alebo dní po podaní epkoritamabu, zvyčajne po prvej plnej dávke v prvom cykle. ICANS sa môže objaviť niekoľko dní alebo týždňov po podaní epkoritamabu.
- **Pre ďalšie informácie ihneď kontaktujte ošetrojúceho lekára pacienta (kontaktné údaje nájdete na druhej strane).**