

Písomná informácia pre používateľa

CYCLO 3 FORT tvrdé kapsuly

suchý extrakt listnatca trnitého, hesperidín metylchalkón, kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Cyclo 3 Fort a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cyclo 3 Fort
3. Ako užívať Cyclo 3 Fort
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cyclo 3 Fort
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Cyclo 3 Fort a na čo sa používa

Cyclo 3 Fort je kombináciou troch liečiv: extraktu z listnatca trnitého, hesperidín metylchalkónu a kyseliny askorbovej.

Cyclo 3 Fort patrí do skupiny liekov nazývanej liečivá stabilizujúce vlásoknice (liečivá s účinkom na kardiovaskulárny systém).

Tento liek má posilňujúci a ochranný účinok na cievy (zvyšuje pružnosť žíl a odolnosť vlásoknic a znižuje priepustnosť žíl).

Cyclo 3 Fort je určený na liečbu dospelých pacientov.

Cyclo 3 Fort sa používa na liečbu prejavov chronickej žilovej a lymfatickej nedostatočnosti, akými sú napríklad bolesti nôh, pocit ťažkých nôh, opuchy, parestézia (pocit mravčenia), kŕče v lýtkovom svale.

Cyclo 3 Fort je vhodný aj na symptomatickú liečbu (liečbu subjektívnych ťažkostí) hemoroidov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cyclo 3 Fort

Neužívajte Cyclo 3 Fort

- ak ste alergický na liečivá (extrakt z listnatca trnitého, hesperidín metylchalkón a/alebo kyselinu askorbovú (vitamín C)) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte poruchu hromadenia železa (talasémia, hemochromatóza, sideroplastická anémia) z dôvodu prítomnosti kyseliny askorbovej (vitamínu C) v lieku.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Cyclo 3 Fort, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak sa u vás objaví hnačka: zastavte liečbu a povedzte to svojmu lekárovi (pozrite si časť 4. Možné vedľajšie účinky).
- pri poruchách krvného obehu v žilách: ak sa nepríjemný pocit a/alebo krehkosť ciev nezlepšili po dvoch týždňoch liečby, obráťte sa na svojho lekára.
- pri hemoroidálnych atakoch: podávanie tohto lieku nie je náhradou za špecifickú liečbu iných ochorení v oblasti análneho otvoru. Ak hemoroidálne poruchy po niekoľkých dňoch liečby pretrvávajú, je nevyhnutné, aby ste sa obrátili na svojho lekára.

Kyselina askorbová (vitamín C) môže ovplyvniť výsledky laboratórnych vyšetrení, ako je napr. stanovenie hladiny glukózy v krvi, bilirubínu, aktivity transamináz, laktátu a iných látok.

Deti a dospelí

Nevzťahuje sa.

Iné lieky a Cyclo 3 Fort

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Cyclo 3 Fort a jedlo, nápoje a alkohol

Nevzťahuje sa.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Cyclo 3 Fort počas tehotenstva a liek sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevzťahuje sa.

Cyclo 3 Fort obsahuje oranžovú žlt'

Tento liek obsahuje oranžovú žlt' FCF (E110). Tá môže spôsobiť alergické reakcie.

3. Ako užívať Cyclo 3 Fort

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

- pri poruchách krvného obehu v žilách: 2 až 3 tvrdé kapsuly denne.
- pri hemoroidálnych atakoch: 4 až 5 tvrdých kapsúl denne.

Tento liek sa má užívať ústami.

Tvrde kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapíť malým množstvom vody.

Použitie u detí a dospelých

Nevzťahuje sa.

Ak užijete viac lieku Cyclo 3 Fort, ako máte

Nadmerné dávky kyseliny askorbovej (vitamínu C) (zložka lieku Cyclo 3 Fort) môžu spôsobiť málokrvnosť z dôvodu zvýšeného rozpadu červených krviniek u jedincov s nedostatkom G6PD (enzým glukóza-6-fosfátdehydrogenáza). Obráťte sa na svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Cyclo 3 Fort

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Cyclo 3 Fort

Nevzťahuje sa.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejaví u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť, sú:

- Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 - hnačka, niekedy závažná, ktorá po vysadení liečby rýchlo odoznie (pozrite si časť 2 Upozornenia a opatrenia),
 - bolesť brucha.
- Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 - insomniá (ťažkosti so spánkom), dyspepsia (funkčná porucha trávenia), nevoľnosť, erytém (sčervenanie pokožky), pruritus (svrbenie), svalové kŕče, bolesť v končatine (v rukách a/lebo chodidlách).
- Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 - nervozita, pocit točenia sa, periférny chlad (chladné ruky a/alebo chodidlá), bolesť žíl (citlivosť žíl), porucha tráviaceho traktu, aftózna stomatitída (zápal v ústnej dutine s prítomnosťou pluzgierikov), zvýšená hladina alanínaminotransferázy (zvýšenie hladiny biologického parametra pečene).
- Neznáme (častotť sa nedá stanoviť z dostupných údajov):
 - bolesť žalúdka.
 - makulopapulárna vyrážka (sčervenanie kože) a žihľavka (opuchnuté červené škvrny spojené so svrbením).
 - kolitída (zápal hrubého čreva), ktorá sa upraví po ukončení liečby.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospelých

Nevzťahuje sa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prilohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Cyclo 3 Fort

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Cyclo 3 Fort obsahuje

- Liečivá sú: 150 mg suchého extraktu listnatca trnitého, 150 mg hesperidín metylchalkónu, 100 mg kyseliny askorbovej (vitamín C) v jednej tvrdej kapsule.
- Ďalšie zložky sú: mastenec, stearát horečnatý, hydrofóbny koloidný oxid kremičitý, makrogol 6000.
Zloženie tela kapsuly: chinolínová žlt' (E104), oranžová žlt' FCF (E110), oxid titaničitý (E171) a želatína (pozrite si časť 2: Cyclo 3 Fort obsahuje oranžovú žlt' FCT (E110)).

Ako vyzerá Cyclo 3 Fort a obsah balenia

Tento liek sa dodáva v tvrdých kapsulách s nepriehľadným žltým telom a nepriehľadným oranžovým vrchnákom.

Veľkosť balenia: 20, 30 alebo 180 tvrdých kapsúl v blistrovom balení.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PIERRE FABRE MEDICAMENT
Les Cauquillous
81500 Lavaur
Francúzsko

Výrobca:

Pierre Fabre Medicament Production,
Site PROGIPHARM
Rue du lycée
45500 Gien, Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2022.