

Písomná informácia pre používateľa

Diosmin Kappler 500 mg filmom obalené tablety mikronizovaný diozmín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1. Čo je Diosmin Kappler a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diosmin Kappler
3. Ako užívať Diosmin Kappler
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Diosmin Kappler
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Diosmin Kappler a na čo sa používa

Diosmin Kappler patrí medzi vazoprotektívá; jeho liečivo, mikronizovaný diozmín, patrí do skupiny látok nazývaných bioflavonoidy. Zvyšuje tonus žil a odolnosť kapilár. Diosmin Kappler znižuje výskyt opuchu a má protizápalové účinky.

Diosmin Kappler je indikovaný dospelým na liečbu:

- prejavov a príznakov chronického ochorenia žil, ako je bolest, pocit ťažkých nôh, nočné kŕče, opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku poruchy výživy a odolnosti tkaniva) dolných končatín.
- príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia (hemoroidy), ako je bolest, krvácanie a opuch v oblasti konečníka.

Ak sa do 6 týždňov liečby chronického ochorenia žil alebo do 7 dní liečby akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia liekom Diosmin Kappler nebudec cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diosmin Kappler

NEUŽÍVAJTE Diosmin Kappler

- ak ste alergický na diozmín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Diosmin Kappler, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Chronické ochorenie žil

Ak sa váš stav počas liečby zhorší, čo sa môže prejaviť ako zápal kože alebo žíl, stvrdnutie tkaniva pod kožou, silná bolest, kožné vredy alebo nezvyčajné príznaky, ako náhly opuch jednej alebo oboch nôh, okamžite informujte svojho lekára.

Liečba Diosminom Kappler je najúčinnejšia, ak je sprevádzaná vyváženým životným štýlom:

- je potrebné sa vyhýbať pobytu na slnku a dlhodobému státiu,
- udržiavať vhodnú telesnú hmotnosť,
- nosenie špeciálnych pančúc môže zlepšiť u niektorých pacientov cirkuláciu krvi.

Diosmin Kappler nepomôže zmeniť opuch dolných končatín, ak je opuch spôsobený ochorením srdca, obličiek alebo pečene.

Akútne stav hemoroidálneho ochorenia

Ak máte akútnu hemoroidu, môžete Diosmin Kappler užívať len obmedzený čas 15 dní. Ak príznaky počas tejto doby neustúpia, kontaktujte svojho lekára.

Ak sa počas liečby stav zhorší, napr. ak spozorujete zvýšené krvácanie z konečníka, krv v stolici alebo máte obavy z krvácajúcich hemoroidov, kontaktujte svojho lekára.

Liečba Diosminom Kappler nie je náhradou za špecifickú liečbu iných ochorení konečníka.

Deti a dospevajúci

Použitie u detí a dospevajúcich sa neodporúča.

Iné lieky a Diosmin Kappler

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Doteraz nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Tehotenstvo a dojčenie

Bezpečnosť užívania Diosminu Kappler počas tehotenstva a dojčenia sa nestanovila. Preto sa jeho použitie v týchto obdobiah neodporúča.

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Diosmin Kappler nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viest' vozidlá a obsluhovať stroje.

Diosmin Kappler obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Diosmin Kappler obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Diosmin Kappler

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Chronické ochorenie žíl

Odporučaná denná dávka je 2 tablety, ktoré sa môžu užiť ako jedna dávka alebo v 2 oddelených

dávkach.

Tento liek musíte užívať najmenej 4 až 5 týždňov než sa dostaví očakávané zlepšenie.

Akútny stav hemoroidálneho ochorenia

Odporúčaná denná dávka v prvých 4 dňoch liečby je 6 tablet (podávaných ako 3 tablety dvakrát denne).

Počas ďalších 3 dní je odporúčaná denná dávka 4 tablety (podávané ako 2 tablety dvakrát denne). Následne je odporúčaná dávka pri udržiavacej liečbe 2 tablety denne (podávané ako 1 tabletu dvakrát denne).

Spôsob podávania

Diosmin Kappler sa má užívať s jedlom. Tabletu prehltnite a zapite tekutinou.

Ak užijete viac Diosminu Kappler, ako máte

Ak ste užili viac tablet, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Diosmin Kappler

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hlásené vedľajšie účinky zahŕňajú:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- hnačka
- ťažkosti pri trávení
- nevoľnosť
- vracanie

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- zápal hrubého čreva (kolitída)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- bolest' hlavy
- pocit nepohody (malátnosť)
- pocit točenia hlavy (závrat)
- vyrážka
- svrbenie
- žihľavka (urtikária)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- bolest' brucha
- opuch tváre, pier a očných viečok (edém)
- náhly opuch tkániv, ako je tvár, pery, jazyk alebo hrdlo, čo môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním (angioedém)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Diosmin Kappler

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vztahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale (blistri) na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Diosmin Kappler obsahuje

- Liečivo je mikronizovaný diozmín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg mikronizovaného diozmínu.
- Ďalšie zložky sú: želatína, sodná soľ karboxymetylškrobu A, mikrokryštalická celulóza (E460), mastenec, stearát horečnatý, obal'ovacia zmes Opadry OY-L28900 biela (skladá sa z monohydrátu laktózy, hypromelózy, oxidu titaničitého (E171) a makrogolu 4000), žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172)

Ako vyzerá Diosmin Kappler a obsah balenia

Ružovkasto oranžové, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, na jednej strane s vyrazeným "D500".

Diosmin Kappler je dostupný v baleniach obsahujúcich 120, 150 a 180 filmom obalených tablet v PVC-PVDC/hliníkových blistroch.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Kappler Pharma Consult GmbH
Fonyoder Str. 18
89340 Leipheim
Nemecko

Výrobca

Laboratorios Cinfa, S.A. (Huarte), Carretera Olaz-Chipi 10, Polígono Industrial Areta, 31620 Huarte (Navarra), Španielsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Česká republika
Chorvátsko
Slovensko

Diosmin Kappler
Duodin
Diosmin Kappler 500 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2022.