

Formulár o ukončení liečby liekom TYRUKO (natalizumab)



Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti.

Tento formulár si pozorne prečítajte v čase ukončenia liečby liekom TYRUKO. Postupujte podľa pokynov v tomto formulári, aby ste boli plne informovaný a pochopili riziko PML (progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie) pretrvávajúce ešte 6 mesiacov po ukončení liečby natalizumabom.-

Pred začatím liečby liekom TYRUKO ste mali dostať od vášho lekára Kartu pre pacienta. Túto Kartu pre pacienta uchovávať 6 mesiacov po ukončení liečby, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie o PML.

PML je zriedkavá infekcia mozgu, ktorá sa vyskytla u pacientov liečených liekom TYRUKO, a ktorá môže spôsobiť ťažké postihnutie alebo smrť. PML bola hlásená do 6 mesiacov po ukončení liečby natalizumabom.- K prejavom patria:

- psychické zmeny a zmeny v sústredení sa,
- zmeny v správaní,
- slabosť na jednej strane tela,
- problémy so zrakom,
- nové neurologické príznaky, ktoré sú pre vás neobvyklé.

Príznaky PML môžu byť podobné relapsu roztrúsenej sklerózy. Preto, ak si myslíte, že sa vám roztrúsená skleróza zhoršuje, alebo ak ste si všimli akékoľvek nové príznaky do 6 mesiacov po ukončení liečby liekom TYRUKO, je veľmi dôležité, aby ste o tom čo najskôr informovali lekára.

V priebehu 6 mesiacov po ukončení liečby liekom TYRUKO vás lekár bude sledovať a rozhodne, kedy máte absolvovať vyšetrenie MR (magnetická rezonancia). Vo všeobecnosti, vyšetrenie MR budete naďalej absolvovať každých 3 – 6 mesiacov, ak máte jednu z nasledujúcich kombinácií rizikových faktorov pre PML:

- Máte protilátky proti JC vírusu, ste liečený natalizumabom viac ako 2 roky a kedykoľvek pred začatím liečby liekom TYRUKO ste užívali imunosupresívum (liek, ktorý znižuje aktivitu imunitného systému vášho tela).
- Pred začatím liečby liekom TYRUKO ste nikdy nedostávali imunosupresívnu liečbu, ale ste liečený natalizumabom viac ako 2 roky a máte vysoký index protilátok proti JC vírusu (zvýšené množstvo protilátok v krvi).

Ak nepatríte ani do jednej z uvedených skupín, budete naďalej absolvovať bežné vyšetrenia MR, ako určí váš lekár.

Ak máte v súvislosti s uvedenými informáciami nejaké otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Ak nemáte Kartu pre pacienta, ktorú ste dostali na začiatku liečby liekom TYRUKO, požiadajte svojho lekára o novú kartu. Kartu majte pri sebe, aby ste si mohli pripomenúť dôležité informácie o bezpečnosti, najmä príznaky, ktoré sa môžu u vás rozvinúť a ktoré by mohli naznačovať PML. Ak je to vhodné, Kartu pre pacienta ukážte vášmu partnerovi alebo opatrovateľovi.

[Meno pacienta, podpis a dátum podpisu pacienta, meno, podpis a dátum podpisu lekára].

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho

lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Oddelenie farmakovigilancie

Sekcia vigilancie

Kvetná 11, 825 08 Bratislava

tel.: + 421 2 507 01 206

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v

časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na

elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

V hlásení, prosím, uveďte aj názov lieku a číslo šarže, ktorá bola pacientovi podaná.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Sandoz d.d.- organizačná zložka;

e-mail: neziaduca.udalost.slovensko@sandoz.com

Dátum schválenia ŠÚKL: máj 2025