

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **Acamprosát Viatris 333 mg gastrorezistentné tablety**

akamprozát vápenatý

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Acamprosát Viatris a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acamprosát Viatris
3. Ako užívať Acamprosát Viatris
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Acamprosát Viatris
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Acamprosát Viatris a na čo sa používa**

Acamprosát Viatris je liek pôsobiaci na centrálny nervový systém (mozog a miechu). Acamprosát Viatris sa používa na liečbu závislosti od alkoholu. Napomáha v udržaní abstinencie u pacientov závislých od alkoholu.

Acamprosát Viatris vám v kombinácii s poradenstvom pomôže nepiť alkohol. Pôsobí na chemické zmeny, ku ktorým došlo v mozgu počas rokov, keď ste pili alkohol. Nepredchádza škodlivým účinkom kontinuálneho nadmerného užívania alkoholu.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Acamprosát Viatris**

**Neužívajte Acamprosát Viatris, ak:**

- ste alergický na akamprozát alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- dojčíte,
- máte zníženú funkciu obličiek.

**Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Acamprosát Viatris, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Acamprosát Viatris sa neodporúča užívať:

- ak ste pacient mladší ako 18 rokov alebo starší ako 65 rokov,
- ak máte závažné ochorenie obličiek.

Ak pijete priveľa alkoholu, vaše telo a najmä váš nervový systém si navykne na účinky alkoholu. Ak potom náhle prestanete piť alkohol, môžete spozorovať niektoré nepríjemne príznaky, známe ako

abstinenčné príznaky. Liečbu Acamprosatom Viatris je potrebné začať ihneď od začiatku obdobia abstinencie.

Keďže pacienti závislí od alkoholu tiež často trpia depresiou a hrozí nebezpečenstvo samovražedných myšlienok, odporúča sa sledovať príznaky depresie a myšlienky na samovraždu.

### **Iné lieky a Acamprosat Viatris**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Acamprosat Viatris sa často podával pacientom súbežne s inými liekmi na liečbu abstinenčných príznakov alebo na udržanie abstinencie. Doposiaľ nie je známe, že by Acamprosat Viatris ovplyvňoval účinok iných liekov, ak vám však boli predpísané diuretiká (lieky na odvodnenie), poraďte sa so svojím lekárom.

### **Acamprosat Viatris a alkohol**

Pitie alkoholu počas užívania Acamprosatu Viatris nevyvoláva nevoľnosť. Napriek tomu však vôbec nepite alkohol počas liečby Acamprosatom Viatris. Už ak si dáte iba malé množstvo alkoholu, riskujete zlyhanie vašej liečby a môžete sa znova vrátiť k nadmernému pitiu alkoholu.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

#### Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skúsenosti s liečbou počas tehotenstva sú obmedzené. Tehotné ženy by preto mali užívať akamprozát iba vtedy, ak lekár zhodnotí, že prínos liečby prevažuje nad možným rizikom pre plod.

#### Dojčenie

Neužívajte Acamprosat Viatris ak dojčíte, pretože nie je známe, či tento liek preniká do materského mlieka.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Acamprosat Viatris nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

### **Acamprosat Viatris obsahuje sodík**

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

## **3. Ako užívať Acamprosat Viatris**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### Dávkovanie

*Dospelí vo veku 18 - 65 rokov*

- ak vážite 60 kg a viac, odporúčaná dávka je 6 tabliet denne s jedlom: 2 tablety ráno, 2 tablety na obed a 2 tablety večer,
- ak vážite menej ako 60 kg, odporúčaná dávka sú 4 tablety denne s jedlom: 2 ráno, 1 na obed a 1 večer.

#### Trvanie liečby

Acamprosat Viatris sa odporúča užívať jeden rok.

### Spôsob podávania

Tabletu prehltnite vcelku. Nežujte alebo nelámate tabletu, nakoľko to môže poškodiť jej gastrorezistentný obal.

### **Ak užijete viac Acamprosatu Viatris, ako máte**

Ak užijete priveľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostné oddelenie nemocnice. Môžu sa u vás vyskytnúť príznaky hnačky ako sú častá riedka alebo vodnatá stolica, kŕče v bruchu, bolesť brucha, horúčka, nevoľnosť alebo vracanie.

### **Ak zabudnete užiť Acamprosát Viatris**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť jednu dávku, užite ju ihneď, ako si spomeniete a ďalšiu dávku užite v obvyklom čase.

### **Ak prestanete užívať Acamprosát Viatris**

Predtým, ako prestanete užívať tablety, porozprávajte sa so svojím lekárom a riaďte sa jeho radami.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, prestaňte užívať akamprozát a **ihneď sa obráťte na svojho lekára**:

**Veľmi zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- závažné alergické reakcie spôsobujúce vyrážky, svrbenie a žihľavku (urtikáriu) na koži, opuch tváre, pier, jazyka alebo inej časti tela (angioedém) alebo dýchavičnosť, problémy s dýchaním s vyrážkou, opuch, chrčanie a pocit na omdlenie (anafylaktická reakcia)

**Iné vedľajšie účinky zahŕňajú:**

**Veľmi časté** (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- hnačka

**Časté** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- bolesť brucha
- nevoľnosť (nauzea)
- vracanie
- plynatosť v žalúdku alebo črevách (nadúvanie)
- ťľakatá červená kožná vyrážka
- zníženie sexuálnej túžby (libida)

**Menej časté** (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- zvýšenie sexuálnej túžby (libida)

**Neznáme** (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

- pľuzgierovitá vyrážka charakterizovaná škvrnami na koži, vyplnenými tekutinou (vezikulobulózny výsev)

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

### **5. Ako uchovávať Acamprosat Viatris**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

### **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

#### **Čo Acamprosat Viatris obsahuje**

Liečivo je akamprozát vápenatý. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 333 mg akamprozátu vápenatého zodpovedajúceho 300 mg akamprozátu.

Ďalšie zložky sú glycerol-dibehenát, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, koloidný oxid kremičitý a stearát horečnatý. Obal obsahuje hypromelózu, kopolymér kyseliny metakrylovej s etylakrylátom (1:1) 30 % disperzia (obsahujúci laurylsíran sodný, polysorbát 80), mastenec, propylénglykol.

#### **Ako vyzerá Acamprosat Viatris a obsah balenia**

Acamprosat Viatris gastrorezistentné tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, obalené tablety, na oboch stranách bez označenia a s priemerom približne 10 mm.

Acamprosat Viatris je dostupný v blistrových baleniach po 84, 168 a vo viacpočetnom balení po 168 tabliet obsahujúcich 2 balenia, každé po 84 tabliet alebo 504 tabliet obsahujúcich 6 balení, každé po 84 tabliet.

Acamprosat Viatris je tiež dostupný v HDPE fľaši obsahujúcej 250 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

#### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii**

Viatris Limited

Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Írsko

#### **Výrobca**

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom Mylan útca 1, Maďarsko

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories  
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a v Spojenom kráľovstve (Severnom Írsku) pod nasledovnými názvami:**

Slovenská republika	Acamprosát Viatris 333 mg
Švédsko	Akamprosát Viatris
Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)	Acamprosate 333 mg gastro-resistant tablets

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2026.**