

Písomná informácia pre používateľa

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml
Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml
Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml
roztok pre rozprašovač

salbutamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Názov tohto lieku je jeden z nasledujúcich:

- Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml
- Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml
- Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml

Vo zvyšnej časti písomnej informácie sa váš liek nazýva Salbutamol Noridem.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Salbutamol Noridem a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Salbutamol Noridem
3. Ako používať Salbutamol Noridem
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Salbutamol Noridem
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Salbutamol Noridem a na čo sa používa

Salbutamol Noridem obsahuje liečivo nazývané salbutamol. Patrí do skupiny liekov nazývaných rýchlo pôsobiace bronchodilatanciá.

- Bronchodilatanciá pomáhajú dýchacím cestám vo vašich pľúcach zostať otvorené. Vďaka tomu je pre vzduch jednoduchšie dostať sa dnu a von.
- Pomáhajú zmierniť pocit tiesne na hrudi, sipot a kašeľ.

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml: Táto nízka dávka je určená len na použitie u detí a dojčiat na liečbu závažných záchvatov astmy, kedy je potrebné vdychovanie vysokých dávok salbutamolu.

Salbutamol Noridem sa používa na liečbu problémov s dýchaním u ľudí s astmou a inými ochoreniami hrudníka. Zvyčajne sa podáva ľuďom, ktorí trpia týmito stavmi pomerne závažne. Salbutamol Noridem sa podáva aj na liečbu závažných záchvatov astmy.

Salbutamol Noridem je tekutina obsiahnutá v ampulke. Tekutina sa vkladá do prístroja nazývaného rozprašovač (nebulizátor). Tento prístroj vytvára jemnú hmlu, ktorú vdychujete cez tvárovú masku.

V závislosti od závažnosti astmy vám lekár môže predpísať Salbutamol Noridem buď samostatne, alebo ako doplnok k nepretržitej základnej liečbe jedným alebo viacerými inými liekmi, ako sú napríklad inhalačné (vdychované) kortikosteroidy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Salbutamol Noridem

Nepoužívajte Salbutamol Noridem:

- ak ste alergický na salbutamólium-sulfát (liečivo) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Salbutamol Noridem, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak je vaša astma aktívna (napríklad máte časté príznaky alebo opätovné vzplanutia, ako je dýchavičnosť sťažujúca rozprávanie, jedenie alebo spánok, kašeľ, sipot, pocit tiesne na hrudníku alebo obmedzená fyzická schopnosť). Musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi, ktorý môže začať alebo zvýšiť liečbu na kontrolu vašej astmy, napríklad inhalačným kortikosteroidom.

- máte vysoký krvný tlak.
- máte cukrovku.
- máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.
- máte v anamnéze problémy so srdcom, ako je nepravidelný alebo rýchly srdcový tep, závažné zlyhanie srdca alebo bolesť na hrudníku (angína).
- používate iný roztok pre rozprašovač, napríklad ipratrópium-bromid – uistite sa, že sa hmla nedostane do vašich očí. Tomu sa dá predísť použitím náustku namiesto tvárovej masky alebo okuliarov.
- užívate xantínové deriváty (napríklad teofylín) alebo steroidy na liečbu astmy.
- užívate tablety na odvodnenie (diuretiká), ktoré sa niekedy používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového ochorenia.
- ste užili iné lieky používané na uvoľnenie upchatého nosa (napríklad efedrín alebo pseudoefedrín) alebo iné lieky na liečbu astmy.

V súvislosti s vysokými terapeutickými dávkami salbutamolu bola hlásená choroba známa ako laktátová acidóza, a to najmä u pacientov liečených na akútny bronchospazmus (pozri časti 3 a 4). Zvýšenie hladiny laktátu môže viesť k dýchavičnosti a k zrýchlenému a prehĺbenému dýchaniu (hyperventilácii), aj keď sa váš sipot môže zlepšiť. Čo najskôr informujte svojho lekára, ak máte pocit, že váš liek neúčinkuje tak dobre ako zvyčajne (napríklad potrebujete vyššie dávky na zmiernenie problémov s dýchaním alebo váš inhalátor neposkytuje úľavu na aspoň 3 hodiny) a potrebujete rozprašovač používať častejšie, ako vám odporučil lekár.

Ak používate Salbutamol Noridem viac ako dvakrát týždenne na liečbu príznakov astmy, nepočítajúc preventívne použitie pred cvičením, naznačuje to zlú kontrolu astmy a môže to zvýšiť riziko závažných záchvatov astmy (zhoršenia astmy), ktoré môžu mať vážne komplikácie a môžu byť život ohrozujúce alebo dokonca smrteľné. Mali by ste sa čo najskôr obrátiť na svojho lekára, aby prehodnotil liečbu vašej astmy.

Ak denne používate liek proti zápalu pľúc, napr. „inhalačný (vdychovaný) kortikosteroid“, je dôležité, aby ste ho používali naďalej pravidelne, aj keď sa cítite lepšie.

Použitie salbutamolu môže niekedy spôsobiť zníženie hladiny draslíka v krvi, najmä ak súbežne užívate určité iné lieky. Ak vám hrozí toto riziko, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie testy na dôkladnejšie sledovanie vašej krvi.

Ak sa vaše dýchanie alebo sipot zhoršia ihneď po použití tohto lieku, okamžite ho prestaňte používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.

Iné lieky a Salbutamol Noridem

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Týka sa to aj rastlinných liekov.

Predovšetkým informujte svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika, ak užívate:

- lieky na nepravidelný alebo rýchly srdcový tep.
- iné lieky na astmu.

- lieky, ktoré znižujú hladinu glukózy v krvi (antidiabetiká).

Nezabudnite si tento liek vziať so sebou, ak idete do nemocnice.

Salbutamol Noridem a jedlo a nápoje

Salbutamol Noridem môžete používať kedykoľvek počas dňa, s jedlom alebo bez neho.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek.

Salbutamol Noridem sa môže používať počas tehotenstva, ak to váš lekár považuje za potrebné.

Športovci

Použitie salbutamolu môže spôsobiť pozitívny výsledok v testoch vykonávaných počas antidopingových kontrol.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Salbutamol pravdepodobne neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať nástroje alebo stroje.

Nemali by ste viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, kým používate rozprašovač, pretože ten vytvára hmlu, ktorú vdychujete.

Salbutamol Noridem obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v ampulke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako používať Salbutamol Noridem

Salbutamol Noridem sa má používať podľa potreby, nie pravidelne.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Používanie tohto lieku

- **tekutinu nepodávajte injekčne ani neprehltajte.** Salbutamol Noridem sa má vdychovať len pomocou vášho rozprašovača.
- **dbajte na to, aby sa tekutina alebo hmla produkovaná rozprašovačom nedostala do vašich očí.** Môžete si nasadiť okuliare alebo ochranné okuliare, aby ste ich ochránili.
- váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám majú ukázať, ako tento liek používať.
- každá malá plastová nádobka (ampulka) obsahuje tekutinu.
- tekutina sa vloží do rozprašovača. Ten vytvára jemnú hmlu, ktorú vdychujete cez tvárovú masku alebo náustok.
- používajte svoj rozprašovač v dobre vetranej miestnosti, pretože časť hmly sa uvoľní do vzduchu a môžu ju vdýchnuť ostatní.

Dospelí, deti vo veku 12 rokov a staršie a deti vo veku 4 – 11 rokov

- Zvyčajná úvodná dávka je 2,5 mg až štyrikrát denne. V prípade potreby sa zvyšuje na 5 mg až štyrikrát denne.

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml: Táto nízkodávková lieková forma nie je vhodná na liečbu dospelých, ale je vhodná pre deti a dojčatá.

Dojčatá a deti: 50 až 150 mikrogramov salbutamolu/kg (t. j. 0,1 až 0,3 ml/kg lieku Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml vo forme rozprašovania), pričom sa vo všeobecnosti nemá prekročiť 5 mg salbutamolu vo forme rozprašovania u batoliat starších ako 18 mesiacov až 2 roky (t. j. štyri jednorazové dávky lieku Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml alebo jedna jednorazová dávka lieku Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml vo forme rozprašovania) a 2,5 mg salbutamolu u dojčiat a batoliat

mladších ako 18 mesiacov (t. j. dve jednorazové dávky lieku Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml alebo jedna jednorazová dávka lieku Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml vo forme rozprašovania).

Použitie vašich ampuliek

1. Vaše ampulky sú zabalené v nepriehľadnom ochrannom vrecku. Neotvárajte ochranné vrecko, kým ich nepotrebuje použiť.
2. Otvorte ochranné vrecko. Pás ampuliek držte v jednej ruke a druhou rukou uchopte poslednú ampulku v rade.
3. Otočte ampulku smerom dole a od seba.
4. Zvyšné ampulky vložte späť do ochranného vrečka. Na vrecko si napíšte dátum likvidácie na vyhradené miesto ako pripomienku. Dátum likvidácie je 3 mesiace od dátumu, kedy ste ochranné vrecko otvorili. Otvorené vrecko vložte späť do škatuľky.
5. Uchopte hornú časť ampulky, ktorú ste práve oddelili. Otvorte ampulku.
6. Otvorený koniec ampulky vložte do nádoby rozprašovača a pomaly ju stláčajte. Uistite sa, že sa celý obsah vyprázdni do rozprašovača.
7. Zostavte rozprašovač a použite ho podľa pokynov.

Riedenie vašich ampuliek

- **neriedte obsah ampulky, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár.**
- ak vám lekár povedal, aby ste roztok zriedili, vyprázdňte obsah ampulky do nádoby rozprašovača.
- pridajte také množstvo sterilného fyziologického roztoku, aké vám povedal lekár.
- nasadte vrchnák na nádobku rozprašovača a jemne pretrepte, aby sa obsah premiešal.

Ak je riedenie nevyhnutné, má sa použiť iba sterilný fyziologický roztok.

Rozprašovanie by vo všeobecnosti nemalo presiahnuť 10 až 20 minút.

Technika používania, ktorú používa pacient, sa má pravidelne kontrolovať.

Po použití

Po rozprašovaní sa nepoužitý roztok zostávajúci v nádobke prístroja musí zlikvidovať.

Čistenie a údržba zariadenia sa vykoná podľa odporúčaní výrobcu.

Jednodávkové nádoby neobsahujú žiadne konzervačné látky; musia sa použiť ihneď po otvorení.

Na každé rozprašovanie sa musí použiť nová jednodávková nádoba. Obsah čiastočne otvorených alebo poškodených jednodávkových nádobiek sa nesmie podať.

Ak použijete viac lieku Salbutamol Noridem, ako máte

Ak použijete viac lieku, ako máte, čo najskôr sa poraďte s lekárom.

Môžu sa objaviť nasledujúce účinky:

- vaše srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne
- cítite sa roztrasene
- ste hyperaktívny

Tieto účinky zvyčajne odznejú v priebehu niekoľkých hodín.

Ak zabudnete použiť Salbutamol Noridem

- Ak zabudnete na dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete.
- Ak je však už čas na nasledujúcu dávku, vynechajte zabudnutú dávku.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Salbutamol Noridem

Neprestaňte používať Salbutamol Noridem bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

Ak máte pocit, že účinok tohto lieku nie je pre vás dostatočný

Ak sa vám zdá, že váš liek neúčinkuje tak dobre ako zvyčajne, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. Váš problém s hrudníkom sa môže zhoršovať a môžete potrebovať iný liek. Neužívajte dodatočné množstvo lieku Salbutamol Noridem, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Ak sa vaše ťažkosti s dýchaním (sipot) zhoršia ihneď po použití tohto lieku, okamžite ho prestaňte používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri tomto lieku sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:

Alergické reakcie (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Ak u vás nastane alergická reakcia, prestaňte používať Salbutamol Noridem a ihneď vyhľadajte lekára. Prejavy alergickej reakcie zahŕňajú: opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, svrbivú vyrážku, pocit na odpadnutie a závraty a kolaps.

Ak trpíte ochorením srdca, oznámte to svojmu lekárovi alebo OKAMŽITE choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice, ak pocítite bolesť na hrudníku alebo akékoľvek príznaky zhoršenia vášho ochorenia srdca.

Poradte sa so svojím lekárom čo najskôr, ak:

- máte pocit, že vaše srdce bije rýchlejšie alebo silnejšie ako zvyčajne (palpitácie). Toto je zvyčajne neškodné a zvyčajne to prestane po tom, ako liek nejaký čas používate.
 - môžete mať pocit, že váš srdcový tep je nepravidelný alebo že vám srdce vynecháva úder.
- Tieto vedľajšie účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nich, čo najskôr sa poradte so svojím lekárom. **Neprestaňte používať tento liek, pokiaľ vám to lekár neodporučí.**

Laktátová acidóza (častosť je neznáma)

- zvýšená hladina kyseliny mliečnej v krvi (prejavuje sa rýchlym dýchaním, dýchavičnosťou, hoci cítite zlepšenie sipotu, pocitom chladu, bolesťou brucha, nevoľnosťou a vracaním). V takom prípade prerušte liečbu liekom Salbutamol Noridem a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré sa môžu tiež objaviť pri tomto lieku:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- tras končatín (nôh a rúk),
- zvýšená srdcová frekvencia,
- bolesť hlavy.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- podráždenie úst a hrdla,
- svalové kŕče.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- nízka hladina draslíka v krvi,
- zvýšený prietok krvi do končatín (periférna dilatácia).

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- nervozita,
- agitácia (nepokoj),
- poruchy srdcového rytmu (arytmie),
- podobne ako pri iných inhalačne podávaných liekoch, sa po inhalácii lieku môže objaviť kašeľ alebo zvýšená dýchavičnosť. V takom prípade prerušte liečbu a kontaktujte svojho lekára, aby zvážil inú liečbu.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospelých

Navyše boli u detí hlásené veľmi zriedkavé nežiaduce udalosti psychiatrických porúch/porúch správania týkajúce sa nervozity a agitácie (nepokoja), ako aj svrbenie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Salbutamol Noridem

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Ampulky uchovávať vo vonkajšom obale a vrecku na ochranu pred svetlom.

Po otvorení ochranného vrecka:

- poznačte si dátum otvorenia.
- pripočítajte k tomuto dátumu 3 mesiace. Toto bude dátum „použiť do“.
- zapíšte dátum „použiť do“ do miesta určeného na vrecku.
- nepoužívajte žiadne nepoužité ampulky zostávajúce v danom vrecku po dátume „použiť do“ a vráťte ich do lekárne na likvidáciu.

Ak vrecko nebolo otvorené, nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli, štítkoch a vrecku po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Ak vám bolo povedané, aby ste prestali používať tento liek, vráťte akékoľvek nepoužité balenia lieku Salbutamol Noridem do lekárne na likvidáciu.

Zlikvidujte všetky čiastočne použité, otvorené alebo poškodené jednodávkové obaly.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Salbutamol Noridem obsahuje

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml

- Liečivo je salbutamólium-sulfát. Každá 2,5 ml ampulka obsahuje 1,25 mg salbutamolu (vo forme salbutamólium-sulfátu).
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekcie a kyselina sírová (na úpravu pH).

Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml

- Liečivo je salbutamólium-sulfát. Každá 2,5 ml ampulka obsahuje 2,5 mg salbutamolu (vo forme salbutamólium-sulfátu).
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekcie a kyselina sírová (na úpravu pH).

Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml

- Liečivo je salbutamólium-sulfát. Každá 2,5 ml ampulka obsahuje 5 mg salbutamolu (vo forme salbutamólium-sulfátu).
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekcie a kyselina sírová (na úpravu pH).

Ako vyzerá Salbutamol Noridem a obsah balenia

Liek Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml roztok pre rozprašovač je balený v pásoch po 5 alebo 6 ampuliek, v závislosti od veľkosti balenia, ktoré sú zabalené v nepriehľadnom hliníkovom ochrannom vrecku. Každá škatuľka obsahuje 30 alebo 60 ampuliek.

Liek Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml roztok pre rozprašovač je balený v pásoch po 5 alebo 6 ampuliek, v závislosti od veľkosti balenia, ktoré sú zabalené v nepriehľadnom hliníkovom ochrannom vrecku. Každá škatuľka obsahuje 30 alebo 60 ampuliek.

Liek Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml roztok pre rozprašovač je balený v pásoch po 5 alebo 6 ampuliek, v závislosti od veľkosti balenia, ktoré sú zabalené v nepriehľadnom hliníkovom ochrannom vrecku. Každá škatuľka obsahuje 30 alebo 60 ampuliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Noridem Enterprises Limited

Makariou & Evagorou 1, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cyprus

Výrobca

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry

21st km National Road Athens – Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Belgicko	Salbutamol Noridem 1,25 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 2,5 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 5 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler
Cyprus	Brodilaten 1,25 mg/2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 2,5 mg/2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 5,0 mg/2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
Česká republika	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Dánsko	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Fínsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml sumutinliuos Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml sumutinliuos Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml sumutinliuos
Francúzsko	SALBUTAMOL NORIDEM 1,25 mg/2,5 mL Solution pour inhalation par nébuliseur SALBUTAMOL NORIDEM 2,5 mg/2,5 mL Solution pour inhalation par nébuliseur SALBUTAMOL NORIDEM 5,0 mg/2,5 mL Solution pour inhalation par nébuliseur
Grécko	Brodilaten 1,25 mg / 2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 2,5 mg / 2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 5,0 mg / 2,5 mL Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
Holandsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml verneveloplossing Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml verneveloplossing

Írsko	Brodilaten 1.25 mg / 2.5 mL Nebuliser solution
	Brodilaten 2.5 mg / 2.5 mL Nebuliser solution
	Brodilaten 5.0 mg / 2.5 mL Nebuliser solution
Maďarsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml oldat porlasztásra
	Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml oldat porlasztásra
	Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml oldat porlasztásra
Nemecko	Salbutamol Noridem 1,25 mg Lösung für einen Vernebler
	Salbutamol Noridem 2,5 mg Lösung für einen Vernebler
	Salbutamol Noridem 5 mg Lösung für einen Vernebler
Nórsko	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
Poľsko	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
Portugalsko	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
Rakúsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler
	Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler
	Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler
Rumunsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg soluție pentru nebulizator
	Salbutamol Noridem 2,5 mg soluție pentru nebulizator
	Salbutamol Noridem 5 mg soluție pentru nebulizator
Slovenská republika	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml
	Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml
	Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml
Španielsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
	Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
	Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
Švédsko	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
Taliansko	Salbutamolo Noridem
	Salbutamolo Noridem
	Salbutamolo Noridem

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2026.