

Písomná informácia pre používateľa

Lecicarbon Pediatricí pacienti

0,250 g/0,340 g čapíky

hydrogenuhlíčitán sodný/dihydrogenfosforečnan sodný

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Lecicarbon Pediatricí pacienti a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lecicarbon Pediatricí pacienti
3. Ako používať Lecicarbon Pediatricí pacienti
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lecicarbon Pediatricí pacienti
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Lecicarbon Pediatricí pacienti a na čo sa používa

Lecicarbon Pediatricí pacienti je vhodný na liečbu zápchy spôsobenej rôznymi príčinami (napr. strava s nízkym obsahom vlákniny, nedostatok fyzickej aktivity a ochorenia vyžadujúce si ľahšie vyprázdenie čriev).

Lecicarbon Pediatricí pacienti možno použiť aj na vyprázdenie čriev pred operáciou alebo diagnostickými úkonmi v konečníku.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lecicarbon Pediatricí pacienti

Nepoužívajte Lecicarbon Pediatricí pacienti

- ak ste alergický (precitlivený) na hydrogenuhlíčitán sodný, dihydrogenfosforečnan sodný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- v prípadoch nepriechodnosti čriev (ileus).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Lecicarbon Dospelí, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

V prípade toxického megakolónu (patologické rozšírenie konca hrubého čreva z rôznych príčin) sa má liek použiť len s výslovným súhlasom ošetrojúceho lekára.

Iné lieky a Lecicarbon Pediatricí pacienti

Lecicarbon Pediatricí pacienti môžete používať aj v čase užívania iných liekov.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekárske predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lecicarbon Pediatricí pacienti a jedlo a nápoje

Nevyžadujú sa žiadne osobitné opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo:

Lecicarbon Pediatricí pacienti môžete používať počas tehotenstva až po konzultácii s vaším ošetrovúcim lekárom.

Dojčenie:

Lecicarbon Pediatricí pacienti môžete používať počas dojčenia.

Plodnosť:

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch lieku Lecicarbon Pediatricí pacienti na ľudskú plodnosť. Účinky na samčiu a samičiu plodnosť neboli hodnotené v štúdiách na zvieratách.

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lecicarbon Pediatricí pacienti nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Je potrebné však pamätať na to, že nástup účinku (defekácia) sa očakáva 15 až 30 minút po podaní.

Lecicarbon Pediatricí pacienti obsahuje (3-sn-fosfatidyl)cholín (zo sójového oleja, lecitínov)

Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek.

3. Ako používať Lecicarbon Pediatricí pacienti

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade potreby zaveďte jeden čapík do análneho otvoru (konečníka), pokiaľ vám nebolo odporúčané inak. V prípade potreby možno podanie po 30 - 60 minútach zopakovať.

Pred použitím lieku Lecicarbon Pediatricí pacienti je potrebné čapík vybrať z obalu, a to oddelením jedného čapíka od stripu v mieste perforácie. Uchopte plastové okraje obidvoch rukami a obal roztrhnite. Zaveďte čapík do análneho otvoru (konečníka). Vsúvanie sa uľahčí, ak sa čapík najprv ponorí do vody. Na zabránenie okamžitého vytlačenia čapíka môže byť potrebné pritlačiť k sebe obe polovice zadočka.

Účinok nastupuje po 15 až 30 minútach.

Nepoužívajte olej ani vazelinu ako lubrikant.

Lecicarbon Pediatricí pacienti je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov. Lecicarbon Pediatricí pacienti nie je vhodný na použitie pre dospelých.

Dlhodobé používanie lieku Lecicarbon Pediatricí pacienti je bezpečné a čapíky nie sú návykové. V prípade dlhodobej zápchy je však vždy potrebné poradiť sa s lekárom.

Ak použijete viac lieku Lecicarbon Pediatricí pacienti, ako máte

Zvyčajná dávka je jeden čapík. V prípade potreby možno podanie po 30 - 60 minútach zopakovať. Pri prekročení tejto dávky vám nehrozí žiadne nebezpečenstvo, no podanie viac ako dvoch čapíkov nie je zmysluplné.

Ak zabudnete použiť Lecicarbon Pediatricí pacienti

Lecicarbon Pediatricí pacienti sa používa len v prípade potreby.

Ak prestanete používať Lecicarbon Pediatricí pacienti

Lecicarbon Pediatricí pacienti sa používa len v prípade potreby.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Lecicarbon Pediatricí pacienti zvyčajne nespôsobuje žiadne problémy (vedľajšie účinky). Zavedenie čapíka môže niekedy, v zriedkavých prípadoch, spôsobiť mierny pocit pálenia, ktorý rýchlo vymizne.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekárnika, lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Lecicarbon Pediatricí pacienti

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lecicarbon Pediatricí pacienti obsahuje

- Liečivá sú hydrogenuhličitan sodný a dihydrogenfosforečnan sodný.
- Ďalšie zložky sú sójový olej, lecitíny ([3-sn-fosfatidyl]cholín), pevný tuk a koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Ako vyzerá Lecicarbon Pediatricí pacienti a obsah balenia

Lecicarbon Pediatricí pacienti je homogénny čapík krémovej farby, podlhovastého tvaru; balený v blistroch z PVC/PE po päť kusov s vyrazeným číslom výrobnéj šarže a dátumom expirácie.

Je dostupný v originálnom balení obsahujúcom 10 čapíkov a v nemocničnom balení s 5 x 10 čapíkmi.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, 35088 Battenberg (Eder), Nemecko

Výrobca:

Haupt Pharma Livron S.A.S., 1 Rue Comte de Sinard, F-26250 Livron-Sur-Drôme, Francúzsko Tel.: +33-4-75 61 02 00, Fax: +33-4-75 61 02 10

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Luxembursko	Lecicarbon E/K
Nemecko	Lecicarbon E/K CO2-Laxans zwei/drei
Maďarsko	Lecicarbon Gyermek végbélkúp
Poľsko	Lecicarbon Junior
Slovenská republika	Lecicarbon Pediatrickí pacienti
Slovinsko	Lecicarbon za otroke 250 mg/340 mg svečke
Spojené kráľovstvo	Lecicarbon A/C Suppository

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2026.

Aké vlastnosti má Lecicarbon Pediatricí pacienti?

Oxid uhličitý (CO₂) je hlavnou zložkou plyných produktov metabolizmu, ktoré sa tvoria pri trávení črevného obsahu. Je to plyn, ktorý najviac spomedzi všetkých črevných plynov povzbudzuje vyprázdňovanie konečníka.

Lecicarbon Pediatricí pacienti odstraňuje zápchu na základe rovnakého princípu, výlučne dodávaním oxidu uhličitého, ktorý sa z čapíka po jeho zavedení do konečníka pomaly uvoľňuje vo forme drobných bubliniek. Nadbytočne produkovaný CO₂ podnecuje črevné pohyby a zvyčajne do 15 až 30 minút spustí proces vyprázdňovania, a to bez podráždenia, kŕčov alebo iných vedľajších účinkov.