

## Písomná informácia pre používateľa

### Balenie na začatie liečby:

**Apremilast Krka 10 mg filmom obalené tablety**  
**Apremilast Krka 20 mg filmom obalené tablety**  
**Apremilast Krka 30 mg filmom obalené tablety**

### Apremilast Krka 30 mg filmom obalené tablety

apremilast

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Apremilast Krka a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Apremilast Krka
3. Ako užívať Apremilast Krka
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Apremilast Krka
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

## 1. Čo je Apremilast Krka a na čo sa používa

### Čo je Apremilast Krka

Apremilast Krka obsahuje účinnú látku „apremilast“. Tá patrí do skupiny liekov nazývaných inhibitory fosfodiesterázy 4, ktoré pomáhajú znížiť zápal.

### Na čo sa Apremilast Krka používa

Apremilast Krka sa používa na liečbu dospelých s nasledujúcimi ochoreniami:

- **Aktívna psoriatická artritída** – ak nemôžete použiť iný liek nazývaný „antireumatický liek modifikujúci ochorenie“ (z angl. slova Disease-Modifying Antirheumatic Drugs, DMARD) alebo ak ste niektorý z týchto liekov vyskúšali a neúčinkoval u vás.
- **Stredne závažná až závažná chronická ložisková psoriáza** – ak nemôžete použiť jednu z nasledujúcich terapií alebo ak ste vyskúšali jednu z týchto terapií a neúčinkovala u vás:
  - fototerapia – liečba, pri ktorej sú niektoré oblasti kože vystavené ultrafialovému svetlu.
  - systémová terapia – liečba, ktorá má vplyv na celé telo nie len na jednu oblasť, ako napríklad liek „cyklosporín“, „metotrexát“ alebo „psoralen“.
- **Behçetova choroba (Behçet's disease, BD)** – na liečbu vredov v ústnej dutine, čo je častou ťažkosťou u ľudí s týmto ochorením.

Apremilast Krka sa používa na liečbu detí a dospievajúcich vo veku 6 rokov a starších a s hmotnosťou najmenej 20 kg s nasledujúcim ochorením:

- **Stredne závažná až závažná ložisková psoriáza** – ak váš lekár rozhodne, že je pre vás vhodné užívať systémovú liečbu, ako je Apremilast Krka.

## **Čo je psoriatická artritída**

Psoriatická artritída je zápalové ochorenie kĺbov, zvyčajne sprevádzané psoriázou, zápalovým ochorením kože.

## **Čo je ložisková psoriáza**

Psoriáza je zápalové ochorenie kože, ktoré môže spôsobiť začervenané, šupinaté, zhrubnuté, svrbivé a bolestivé ložiská na koži a môže tiež postihnúť vašu vlasovú pokožku a nechty.

## **Čo je Behçetova choroba**

Behçetova choroba je zriedkavý druh zápalového ochorenia, ktoré postihuje mnoho častí tela. Najčastejšou ťažkosťou sú vredy v ústnej dutine.

## **Ako Apremilast Krka pôsobí**

Psoriatická artritída, psoriáza a Behçetova choroba sú zvyčajne celoživotné ochorenia a v súčasnosti neexistuje žiadna liečba. Apremilast Krka pôsobí tým, že v tele znižuje aktivitu enzýmu nazývaného „fosfodiesteráza 4“, ktorá je zapojená do procesu zápalu. Znížením aktivity tohto enzýmu môže Apremilast Krka pomôcť kontrolovať zápal spojený so psoriatickou artritídou, psoriázou a Behçetovou chorobou, a tým zmiernovať prejavy a príznaky týchto ochorení.

U dospelých so psoriatickou artritídou vedie liečba Apremilastom Krka k zlepšeniu opuchnutých a bolestivých kĺbov a môže zlepšiť vaše celkové telesné funkcie.

U dospelých, detí a dospievajúcich so psoriázou vo veku od 6 rokov a s hmotnosťou najmenej 20 kg vedie liečba Apremilastom Krka k zmierneniu psoriatických kožných ložísk a iných kožných príznakov a prejavov ochorenia.

U dospelých s Behçetovou chorobou liečba Apremilastom Krka znižuje počet vredov v ústnej dutine a môže ich úplne zastaviť. Môže takisto zmierniť súvisiacu bolesť.

Bolo tiež preukázané, že Apremilast Krka zlepšuje kvalitu života u dospelých a pediatrických pacientov so psoriázou, dospelých pacientov so psoriatickou artritídou a dospelých pacientov s Behçetovou chorobou. To znamená, že dopad vášho zdravotného stavu na každodenné činnosti, vzťahy a ďalšie faktory by mal byť menší, ako tomu bolo pred liečbou.

## **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Apremilast Krka**

### **Neužívajte Apremilast Krka**

- ak ste alergický na apremilast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná.

### **Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Apremilast Krka, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

### **Depresia a pomýšľanie na samovraždu**

Ak trpíte depesiou, ktorá sa zhoršuje myšlienkami na samovraždu, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Apremilast Krka.

Vy alebo váš opatrovatel' musíte takisto ihneď povedať svojmu lekárovi o každej zmene v správaní

alebo zmene nálady, o pocitoch depresie a o každom pomýšľaní na samovraždu, ktoré sa môžu u vás vyskytnúť po užití Apremilast Krka.

### **Závažné ťažkosti s obličkami**

Ak máte závažné ťažkosti s obličkami, budete užívať inú dávku – pozri časť 3.

### **Ak máte podváhu**

Ak počas užívania Apremilastu Krka schudnete a nemali ste to v úmysle, obráťte sa na svojho lekára.

### **Ťažkosti s črevami**

Ak máte silnú hnačku, nevoľnosť alebo vraciate, obráťte sa na svojho lekára.

### **Deti a dospievajúci**

Neodporúča sa používať Apremilast Krka u detí, ktoré majú stredne závažnú až závažnú ložiskovú psoriázu a sú mladšie ako 6 rokov alebo vážia menej ako 20 kg, pretože sa v týchto vekových a hmotnostných skupinách neskúmal.

Neodporúča sa používať Apremilast Krka u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov v iných indikáciách, pretože bezpečnosť a účinnosť sa v tejto vekovej skupine nestanovili.

### **Iné lieky a Apremilast Krka**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu a rastlinných prípravkov. Je to preto, že Apremilast Krka môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré ďalšie lieky účinkujú. Niektoré iné lieky tiež môžu ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Apremilast Krka.

Predtým, ako užijete Apremilast Krka, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi najmä, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- rifampicín – antibiotikum používané na liečbu tuberkulózy
- fenytoín, fenobarbital a karbamazepín - lieky používané na liečbu záchvatov alebo epilepsie
- ľubovník bodkovaný – rastlinný liek na miernu úzkosť a depresiu

### **Tehotenstvo a dojčenie**

**Neužívajte Apremilast Krka, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná.**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Existuje len málo údajov o účinkoch Apremilastu Krka v tehotenstve. Počas užívania tohto lieku nesmiete otehotnieť a počas liečby Apremilastom Krka máte používať účinnú metódu antikoncepcie. Nie je známe, či tento liek prechádza do materského mlieka. Nemáte užívať Apremilast Krka počas dojčenia.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Apremilast Krka nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

### **Apremilast Krka obsahuje sodík**

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

### 3. Ako užívať Apremilast Krka

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### Akú dávku užívať

- Keď začnete prvýkrát užívať Apremilast Krka, dostanete „balenie na začatie liečby“, ktoré obsahuje dostatočný počet tabliet na celkovo dva týždne liečby.
- „Balenie na začatie liečby“ je jasne označené, aby sa zabezpečilo, že budete mať správne tablety v správny čas.
- Vaša liečba sa začne nižšou dávkou a postupne sa bude zvyšovať v priebehu prvého týždňa liečby (titračná fáza).
- „Balenie na začatie liečby“ bude tiež obsahovať dostatok tabliet na ďalší týždeň v odporúčanej dávke.
- Po dosiahnutí odporúčanej dávky dostanete vo svojich predpísaných baleniach len tablety s jednou silou.
- Túto fázu postupného zvyšovania dávky budete musieť prejsť iba raz, a to i v prípade, že budete opäť začínať s liečbou.

#### Dospelí

- Odporúčaná dávka Apremilastu Krka u dospelých pacientov je 30 mg dvakrát denne po dokončení titračnej fázy, ako je uvedené v tabuľke nižšie - jedna 30 mg dávka ráno a jedna 30 mg dávka večer, približne v 12-hodinovom odstupe, s jedlom alebo bez jedla. To predstavuje celkovú dennú dávku 60 mg.

| Deň                 | Ranná dávka                 | Večerná dávka               | Celková denná dávka |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. deň              | 10 mg (ružová)              | Neužívajte dávku            | 10 mg               |
| 2. deň              | 10 mg (ružová)              | 10 mg (ružová)              | 20 mg               |
| 3. deň              | 10 mg (ružová)              | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 30 mg               |
| 4. deň              | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 40 mg               |
| 5. deň              | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 30 mg (svetlohnedo fialová) | 50 mg               |
| 6. deň a ďalšie dni | 30 mg (svetlohnedo fialová) | 30 mg (svetlohnedo fialová) | 60 mg               |

Deti a dospievajúci vo veku 6 rokov a starší

- Dávka Apremilastu Krka bude závisieť od telesnej hmotnosti.

U pacientov s hmotnosťou od 20 kg do menej ako 50 kg: Odporúčaná dávka apremilastu je 20 mg dvakrát denne po dokončení titračnej fázy, ako je uvedené v tabuľke nižšie – jedna 20 mg dávka ráno a jedna 20 mg dávka večer, približne v 12-hodinovom odstupe, s jedlom alebo bez jedla. To predstavuje celkovú dennú dávku 40 mg.

|                     | Hmotnosť od 20 kg do menej ako 50 kg |                        |                     |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Deň                 | Ranná dávka                          | Večerná dávka          | Celková denná dávka |
| 1. deň              | 10 mg (ružová)                       | Neužívajte dávku       | 10 mg               |
| 2. deň              | 10 mg (ružová)                       | 10 mg (ružová)         | 20 mg               |
| 3. deň              | 10 mg (ružová)                       | 20 mg (oranžovo hnedá) | 30 mg               |
| 4. deň              | 20 mg (oranžovo hnedá)               | 20 mg (oranžovo hnedá) | 40 mg               |
| 5. deň              | 20 mg (oranžovo hnedá)               | 20 mg (oranžovo hnedá) | 40 mg               |
| 6. deň a ďalšie dni | 20 mg (oranžovo hnedá)               | 20 mg (oranžovo hnedá) | 40 mg               |

\* Neexistujú veľkosti balenia Apremilastu Krka, ktoré by umožňovali titráciu a udržiavaciu liečbu pre

pediatrických pacientov s hmotnosťou od 20 kg do menej ako 50 kg. Z tohto dôvodu nie je možné liečiť pediatrických pacientov s hmotnosťou od 20 kg do menej ako 50 kg Apremilastom Krka; namiesto toho sa majú použiť iné lieky s obsahom apremilastu, ktoré ponúkajú tieto veľkosti balenia.

*U pacientov s hmotnosťou najmenej 50 kg:* Odporúčaná dávka Apremilastu Krka je 30 mg dvakrát denne po dokončení titračnej fázy (rovnaká ako dávka u dospelých), ako je uvedené v tabuľke nižšie – jedna 30 mg dávka ráno a jedna 30 mg dávka večer, približne v 12-hodinovom odstupe, s jedlom alebo bez jedla. To predstavuje celkovú dennú dávku 60 mg.

|                     | Hmotnosť 50 kg alebo viac   |                             |                     |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Deň                 | Ranná dávka                 | Večerná dávka               | Celková denná dávka |
| 1. deň              | 10 mg (ružová)              | Neužívajte dávku            | 10 mg               |
| 2. deň              | 10 mg (ružová)              | 10 mg (ružová)              | 20 mg               |
| 3. deň              | 10 mg (ružová)              | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 30 mg               |
| 4. deň              | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 40 mg               |
| 5. deň              | 20 mg (oranžovo hnedá)      | 30 mg (svetlohnedo fialová) | 50 mg               |
| 6. deň a ďalšie dni | 30 mg (svetlohnedo fialová) | 30 mg (svetlohnedo fialová) | 60 mg               |

### Pacienti so závažným ochorením obličiek

Ak ste dospelý a máte závažné ochorenie obličiek, potom je odporúčaná dávka Apremilastu Krka 30 mg **raz denne (ranná dávka)**.

U detí a dospievajúcich vo veku 6 rokov a starších so závažnou poruchou funkcie obličiek je odporúčaná dávka Apremilastu Krka 30 mg jedenkrát denne (ranná dávka) pre pacientov s hmotnosťou najmenej 50 kg a 20 mg jedenkrát denne (ranná dávka) pre deti s hmotnosťou od 20 kg do menej ako 50 kg.

Váš lekár vám poradí, ako zvyšovať dávku, keď začínate užívať Apremilast Krka. Lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali len rannú dávku uvedenú v tabuľke vyššie, ktorá sa vás týka (u dospelých alebo u detí/dospievajúcich), a aby ste vynechali večernú dávku.

### Ako a kedy užívať Apremilast Krka

- Apremilast Krka je určený na perorálne použitie.
- Tablety prehltajte celé, najlepšie s vodou.
- Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
- Užite Apremilast Krka v približne rovnaký čas každý deň, jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer.

Ak sa váš stav nezlepší po šiestich mesiacoch liečby, obráťte sa na svojho lekára.

### Ak užijete viac Apremilastu Krka, ako máte

Ak užijete viac Apremilastu Krka, ako máte, obráťte sa na svojho lekára alebo choďte ihneď do nemocnice. Vezmite si so sebou balenie lieku a túto písomnú informáciu.

### Ak zabudnete užiť Apremilast Krka

- Ak vynecháte dávku Apremilastu Krka, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak sa blíži čas pre nasledujúcu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

### **Ak prestanete užívať Apremilast Krka**

- Pokračujte v užívaní Apremilastu Krka až dovtedy, kým vám váš lekár nepovie, aby ste prestali.
- Neprestaňte užívať Apremilastu Krka bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

#### **Závažné vedľajšie účinky – depresie a myšlienky na samovraždu**

Povedzte ihneď svojmu lekárovi o každej zmene v správaní alebo zmene nálady, o pocitoch depresie a o myšlienkach na samovraždu alebo o samovražednom správaní (je to menej časté).

#### **Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)**

- hnačka
- nevoľnosť
- bolesť hlavy
- infekcie horných dýchacích ciest, ako je prechladnutie, nádcha, infekcie prínosových dutín

#### **Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)**

- kašeľ
- bolesť chrbta
- vracanie
- pocit únavy
- bolesť žalúdka
- strata chuti do jedla
- časté pohyby čriev
- problémy so spánkom (nespavosť)
- poruchy trávenia alebo pálenie záhy
- zápal a opuch priedušiek vo vašich pľúcach (bronchitída)
- prechladnutie (nazofaryngitída)
- depresia
- migréna
- tenzná (tlaková) bolesť hlavy

#### **Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)**

- vyrážka
- žihľavka (urtikária)
- úbytok hmotnosti
- alergická reakcia
- krvácanie do čriev alebo žalúdka
- samovražedné myšlienky alebo správanie
- úzkosť
- zmeny nálady

#### **Neznáme vedľajšie účinky (častotť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)**

- závažná alergická reakcia (môže zahŕňať opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže viesť k ťažkostiam s dýchaním alebo prehltním)

Ak máte 65 rokov alebo viac, môže vám hroziť vyššie riziko komplikácií vo forme silnej hnačky, nevoľnosti alebo vracania. Ak začnete mať závažné ťažkosti s črevami, poraďte sa so svojím lekárom.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Apremilast Krka**

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Apremilast Krka obsahuje**

- Liečivo je apremilast. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg, 20 mg alebo 30 mg apremilastu.
- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú:  
Jadro tablety: manitol (E421), celulóza, mikrokryštalická, kroskarmelóza, sodná soľ (Pozri časť 2 „Apremilast Krka obsahuje sodík“) a stearát horečnatý (E470b).  
Obalová vrstva: polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastenec, oxid železitý, červený (E172); oxid železitý, žltý (E172) - *len pre 20 mg a 30 mg* a oxid železitý, čierny (E172) – *len pre 30 mg*.

### **Ako vyzerá Apremilast Krka a obsah balenia**

#### Apremilast Krka 10 mg filmom obalené tablety

Filmom obalené tablety (tablety) sú ružové, okrúhle, bikonvexné, s označením “10” na jednej strane tablety.

Rozmer tablety: priemer približne 6 mm.

#### Apremilast Krka 20 mg filmom obalené tablety

Filmom obalené tablety (tablety) sú oranžovo hnedé, okrúhle, bikonvexné, s označením “20” na jednej strane tablety.

Rozmer tablety: priemer približne 8 mm.

#### Apremilast Krka 30 mg filmom obalené tablety

Filmom obalené tablety (tablety) sú svetlohnedo fialové, okrúhle, bikonvexné, s označením “30” na jednej strane tablety.

Rozmer tablety: priemer približne 10 mm.

Apremilast Krka 30 mg filmom obalené tablety je dostupný v baleniach obsahujúcich 14, 56, 168 alebo 196 filmom obalených tabliet v blistri.

### Balenie na začatie liečby:

Každé balenie 27 filmom obalených tabliet obsahuje:

- 4 filmom obalené tablety Apremilastu Krka 10 mg

- 4 filmom obalené tablety Apremilastu Krka 20 mg
- 19 filmom obalených tabliet Apremilastu Krka 30 mg

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

### Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko  
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, Cuxhaven 27472, Nemecko

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:**

| Názov členského štátu | Názov lieku                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovensko             | Apremilast Krka 30 mg filmom obalené tablety<br>Balenie na začatie liečby:<br>Apremilast Krka 10 mg filmom obalené tablety<br>Apremilast Krka 20 mg filmom obalené tablety<br>Apremilast Krka 30 mg filmom obalené tablety                                                                         |
| Nemecko               | Apremilast TAD 30 mg Filmtabletten<br>Balenie na začatie liečby:<br>Apremilast TAD 10 mg + 20 mg + 30 mg Filmtabletten                                                                                                                                                                             |
| Španielsko            | Apremilast Krka 30 mg comprimidos recubiertos con película EFG<br>Balenie na začatie liečby:<br>Apremilast Krka 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG<br>Apremilast Krka 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG<br>Apremilast Krka 30 mg comprimidos recubiertos con película EFG |
| Fínsko                | Apremilast Krka 30 mg kalvopäällysteiset tabletit<br>Balenie na začatie liečby:<br>Apremilast Krka 10 mg kalvopäällysteiset tabletit<br>Apremilast Krka 20 mg kalvopäällysteiset tabletit<br>Apremilast Krka 30 mg kalvopäällysteiset tabletit                                                     |
| Írsko                 | Apremilast Krka 30 mg film-coated tablets<br>Balenie na začatie liečby:<br>Apremilast Krka 10 mg film-coated tablets<br>Apremilast Krka 20 mg film-coated tablets<br>Apremilast Krka 30 mg film-coated tablets                                                                                     |
| Taliansko             | Apremilast Krka                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Švédsko               | Apremilast Krka 30 mg filmdragerade Tabletter<br>Balenie na začatie liečby:<br>Apremilast Krka 10 mg filmdragerade tabletter<br>Apremilast Krka 20 mg filmdragerade tabletter<br>Apremilast Krka 30 mg filmdragerade tabletter                                                                     |

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2026.**

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ([www.sukl.sk](http://www.sukl.sk)).