

Písomná informácia pre používateľa

Meropenem SaneXcel 500 mg Meropenem SaneXcel 1 000 mg prášok na injekčný/infúzny roztok meropeném

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Meropenem SaneXcel a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Meropenem SaneXcel
3. Ako sa Meropenem SaneXcel podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Meropenem SaneXcel
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Meropenem SaneXcel a na čo sa používa

Meropenem SaneXcel patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie. Tento liek usmrcuje iba citlivé baktérie.

Meropenem SaneXcel sa používa u dospelých a detí vo veku od 3 mesiacov na liečbu nasledujúcich infekcií:

- infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc)
- infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou
- komplikované infekcie močových ciest
- komplikované infekcie v brušnej dutine
- infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode
- komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
- akútna bakteriálna infekcia mozgu (meningitída).

Meropenem SaneXcel sa môže používať na liečbu pacientov s nedostatkom určitého typu bielych krviniek (neutropéniou) s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.

Meropenem SaneXcel sa môže používať na liečbu bakteriálnej infekcie krvi, ktorá môže súvisieť s ktoroukoľvek infekciou uvedenou vyššie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Meropenem SaneXcel

Nepoužívajte Meropenem SaneXcel

- ak ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Meropenemu SaneXcel (uvedených v časti 6),
- ak ste mali závažnú alergickú (hypersenzitívnu) reakciu (napr. opuch tváre a krku, závažnú kožnú reakciu) na iné betalaktámové antibiotiká (ako sú penicilíny, cefalosporíny) alebo alergickú (hypersenzitívnu) reakciu na karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na meropeném.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Meropenem SaneXcel, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru:

- ak máte zdravotné problémy s pečeňou alebo obličkami,
- ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku,
- ak ste mali alergickú reakciu na akékoľvek antibiotikum, najmä na karbapenémy, penicilín alebo iné betalaktámové antibiotiká.

Môže sa u vás objaviť pozitívny výsledok testu (Coombsov test), ktorý poukazuje na prítomnosť protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa s vami o tom porozpráva.

Môžu sa u vás objaviť prejavy a príznaky závažných kožných reakcií, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy, liekovej reakcie s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS), multiformného erytému a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4). Ak sa tak stane, ihneď sa obráťte na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, aby mohli liečiť príznaky.

Počas alebo po použití meropenému sa u vás môže objaviť závažná alebo dlhotrvajúca hnačka. Ak sa tak stane, ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Môže to byť prejav zápalu čriev (kolitída spojená s antibiotickou liečbou alebo pseudomembranózna kolitída), ktorý sa môže vyskytnúť po liečbe antibiotikami. Lieky, ktoré spomaľujú pohyb čriev (peristaltiku), sa nemajú podávať.

Môžu sa u vás objaviť reakcie z precitlivenosti vedúce ku Kounisovmu syndrómu (akútny alergický kŕč koronárnych tepien zasobujúcich srdcový sval krvou), čo môže viesť k infarktu myokardu (pozri časť 4).

Počas liečby meropenémom boli zriedkavo hlásené záchvaty (kŕče) (pozri časť 4).

Ak spozorujete nevysvetliteľnú bolesť svalov, citlivosť svalov alebo slabosť a/alebo tmavé sfarbenie moču, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Môže to byť prejav rozpadu svalov (nazývaného rabdomyolýza), ktorý môže viesť k problémom s obličkami.

Problémy s pečeňou

Ak spozorujete zožltnutie kože a očných bielok, svrbenie kože, tmavo sfarbený moč alebo svetlo sfarbenú stolicu, povedzte to svojmu lekárovi. Môže to byť prejav problémov s pečeňou, ktoré musí váš lekár vyšetriť.

Váš lekár bude počas liečby meropenémom sledovať funkciu vašej pečene vzhľadom na riziko poškodenia pečene (pozri časť 4).

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, pred použitím Meropenemu SaneXcel sa poraďte so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Iné lieky a Meropenem SaneXcel

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Je to preto, že Meropenem SaneXcel môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré lieky účinkujú, a niektoré lieky môžu mať vplyv na Meropenem SaneXcel.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- probenecid (používa sa na liečbu dny).
- kyselina valproová (používa sa na liečbu epilepsie). Meropenem SaneXcel sa nemá používať, pretože môže znížiť účinok kyseliny valproovej.
- antikoagulanciá užívané ústami (používajú sa na liečbu alebo prevenciu krvných zrazenín).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tehotenstvo

Je dôležité, aby ste pred podaním meropenému oznámili svojmu lekárovi, že ste tehotná alebo že plánujete otehotnieť. Počas tehotenstva sa odporúča vyhnúť používaniu meropenému. Váš lekár rozhodne, či máte meropeném používať.

Dojčenie

Je dôležité, aby ste pred podaním meropenému oznámili svojmu lekárovi, že dojčíte alebo že plánujete dojčiť. Malé množstvo tohto lieku môže prechádzať do materského mlieka a to môže ovplyvniť dieťa. Váš lekár preto rozhodne, či máte počas dojčenia používať meropeném.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Podávanie meropenému je však spájané s bolesťou hlavy a mravením alebo pichaním v koži (parestézia). Ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môže tiež spôsobiť mimovoľné pohyby svalov, ktoré vedú k rýchlemu a nekontrolovateľnému traseniu tela (kŕčom). Tento stav je zvyčajne sprevádzaný stratou vedomia. Nevedzte vozidlá ani neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok.

Meropenem SaneXcel obsahuje sodík

Meropenem SaneXcel 500 mg: Tento liek obsahuje 46 mg sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v každej 500 mg dávke. To sa rovná 2,3 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

Meropenem SaneXcel 1 000 mg: Tento liek obsahuje 92 mg sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v každej 1 000 mg dávke. To sa rovná 4,6 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

Musí sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. Ak máte ochorenie vyžadujúce sledovanie príjmu sodíka, informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

3. Ako sa Meropenem SaneXcel podáva

Meropenem SaneXcel vám budú podávať výlučne zdravotnícki pracovníci. Váš lekár rozhodne o tom, akú dávku tohto lieku máte dostať každý deň a ako dlho bude liečba trvať.

Použitie u dospelých a dospelievajúcich

- Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od miesta, kde sa infekcia v tele nachádza a od závažnosti infekcie. Váš lekár rozhodne, akú dávku potrebujete.
- Dávka pre dospelých je zvyčajne v rozmedzí od 500 mg (miligramov) do 2 g (gramov). Dávku zvyčajne dostanete trikrát denne. Ak však vaše obličky nepracujú správne, môžete dávku dostávať menej často.

Použitie u detí

- Dávka pre deti vo veku od 3 mesiacov do 11 rokov sa určuje podľa veku a telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka je 10 mg až 40 mg Meropenemu SaneXcel na každý kilogram (kg) telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa zvyčajne podáva trikrát denne. Deťom s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg sa podáva rovnaká dávka ako dospelým.

Ako používať Meropenem SaneXcel

- Meropenem SaneXcel vám podajú vo forme injekcie alebo infúzie do veľkej žily (intravenózne použitie).
- Meropenem SaneXcel vám podá váš lekár alebo zdravotná sestra.
- Tento liek sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú iné lieky.
- Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút alebo môže byť v rozmedzí od 15 do 30

- minút. Váš lekár vám povie, ako vám podajú Meropenem SaneXcel.
- Zvyčajne sa injekcie podávajú každý deň v rovnakom čase.

Ak vám podali viac Meropenemu SaneXcel, ako mali

Meropenem SaneXcel vám podá lekár alebo zdravotná sestra, takže je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku. Ak však máte obavy, že ste dostali príliš veľkú dávku Meropenemu SaneXcel, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.

Ak vynecháte dávku Meropenemu SaneXcel

Meropenem SaneXcel vám podá lekár alebo zdravotná sestra, takže je nepravdepodobné, že by ste dávku vynechali. Ak však máte obavy, že ste dávku vynechali, ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Meropenem SaneXcel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné alergické reakcie

Ak sa u vás vyskytne závažná alergická reakcia, **ihneď informujte lekára alebo zdravotnú sestru**. Môžete potrebovať bezodkladné lekárske ošetrovanie. Prejavu môžu zahŕňať náhly nástup:

- závažnej vyrážky, svrbenia kože alebo žihľavky,
- opuchu tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela,
- dýchavičnosti, sipotu alebo sťaženého dýchania,
- bolesti na hrudi, dýchavičnosti, nevoľnosti, vracania a točenia hlavy (Kounisov syndróm),
- závažných kožných reakcií, ktoré zahŕňajú
 - závažné reakcie z precitlivenosti zahrňujúce horúčku, kožnú vyrážku a zmeny v krvných testoch hodnotiacich funkciu pečene (zvýšené hladiny pečeňových enzýmov) a zvýšenie počtu niektorých typov bielych krviniek (eozinofília) a zväčšené lymfatické uzliny. Toto môžu byť prejavu syndrómu z precitlivenosti postihujúceho viaceré orgány, ktorý je známy ako syndróm DRESS.
 - závažné červené šupinaté vyrážky, hrbolčeky na koži obsahujúce hnis, pľuzgiere alebo olupovanie kože, ktoré môžu byť spojené s vysokou horúčkou a bolesťami kĺbov.
 - závažné kožné vyrážky, ktoré sa môžu prejaviť na trupe ako červenasté kruhové škvrny, často s pľuzgiermi uprostred, olupovaním kože, vredmi v ústach, hrdle, nose, na pohlavných orgánoch a očiach a môže im predchádzať horúčka a príznaky podobné chrípke (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo závažnejšia forma (toxická epidermálna nekrolýza).

Poškodenie červených krviniek (častot' výskytu nie je známa)

Príznaky zahŕňajú:

- dýchavičnosť, ktorej výskyt je neočakávaný,
- červené alebo hnedé sfarbenie moču.

Ak spozorujete čokoľvek z vyššie uvedeného, **ihneď vyhľadajte lekára**.

Rozpad svalov

- nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť a/alebo tmavé sfarbenie moču.

Ak spozorujete tieto prejavy alebo príznaky, **ihneď vyhľadajte lekára**.

Problémy s pečeňou (častot' výskytu nie je známa)

- zožltnutie kože a očných bielok, svrbenie kože, tmavo sfarbený moč alebo svetlo sfarbená stolica.

Ak spozorujete tieto prejavy alebo príznaky, **ihneď vyhľadajte lekára.**

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- bolesť brucha (žalúdka),
- pocit na vracanie (nevoľnosť),
- vracanie,
- hnačka,
- bolesť hlavy,
- kožná vyrážka, svrbivá koža,
- bolesť a zápal,
- zvýšený počet krvných doštičiek vo vašej krvi (zistené krvným testom),
- zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- zmeny krvi. Zahŕňajú znížené počty krvných doštičiek (čo môže spôsobovať zvýšenú náchylnosť k tvorbe modrín), zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek, zníženie počtu iných bielych krviniek a zvýšenie množstva látky nazývanej bilirubín. Váš lekár vám môže z času na čas robiť krvné testy.
- zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukazujú, ako pracujú vaše obličky.
- pocit trpnutia (mravčenie).
- infekcie v ústach alebo v pošve, ktoré sú spôsobené kvasinkami (kandidóza).
- zápal čreva s hnačkou.
- bolesť žil v mieste podávania Meropenemu SaneXcel.
- iné zmeny krvi. Príznaky zahŕňajú časté infekcie, vysokú teplotu a bolesť hrdla. Váš lekár vám môže z času na čas robiť krvné testy.
- náhly nástup závažnej vyrážky, pľuzgierov alebo olupovania kože. Môže byť sprevádzané vysokou horúčkou a bolesťami kĺbov.
- znížené hladiny draslíka v krvi (čo môže spôsobovať slabosť, svalové kŕče, mravčenie a poruchy srdcového rytmu).

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- záchvaty.
- náhla dezorientácia a zmätenosť (delírium).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Meropenem SaneXcel

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Meropenem SaneXcel po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku injekčnej liekovky po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neotvorená liekovka: Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Po rekonštitúcii: Chemická a fyzikálna stabilita po otvorení pred použitím bola preukázaná počas 1 hodiny pri teplote 25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska, pokiaľ spôsob otvorenia/rekonštitúcie/riedenia nevylučuje riziko mikrobiálnej kontaminácie, sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.

Neuchovávajte v chladničke.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Meropenem SaneXcel obsahuje

Meropenem SaneXcel 500 mg: Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému, čo zodpovedá 500 mg meropenému.

Meropenem SaneXcel 1 000 mg: Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému, čo zodpovedá 1 000 mg meropenému.

Ďalšia zložka je uhličitan sodný.

Ako vyzerá Meropenem SaneXcel a obsah balenia

Meropenem SaneXcel je biely až svetložltý prášok na injekčný alebo infúzny roztok v injekčnej liekovke. Každé balenie obsahuje 10 injekčných liekoviek a písomnú informáciu pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

J.J. Bishop Health a.s.
Rybná 682/14, Staré Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Výrobca

Anfarm Hellas S.A.
61st Km National Road Athens-Lamia
Schimatari Viotias 320 09
Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Česká republika:	Meropenem SaneXcel
Poľsko:	Meropenem SaneXcel
Slovenská republika:	Meropenem SaneXcel 500 mg Meropenem SaneXcel 1 000 mg

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2026.

Poučenie/zdravotná osveta

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Nemajú žiaden účinok proti infekciám spôsobeným vírusmi.

Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na liečbu antibiotikami. Jedným z najčastejších dôvodov je to, že baktérie spôsobujúce infekciu sú rezistentné (odolné) voči užívanému antibiotiku. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa množiť aj napriek užívaniu antibiotík.

Baktérie sa môžu stať rezistentnými voči antibiotikám z mnohých dôvodov. Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znížiť pravdepodobnosť, že sa baktérie stanú voči nim rezistentnými.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Úplné informácie o dávkovaní, upozorneniach a opatreniach, pokynoch na rekonštitúciu lieku pred podaním atď. si, prosím, prečítajte v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Injekcia

Meropeném, ktorý sa má použiť na intravenóznú bolusovú injekciu, sa má rekonštituovať v sterilnej vode na injekcie. Množstvo tekutiny je uvedené v tabuľke nižšie:

Tabuľka rekonštitúcie

Dávka Meropenemu SaneXcel	Množstvo „vody na injekcie“ potrebné na rekonštitúciu	Koncentrácia
500 mg	10 ml	50 mg/ml
1 g	20 ml	50 mg/ml
1,5 g	30 ml	50 mg/ml
2 g	40 ml	50 mg/ml

Infúzia

Na intravenóznú infúziu sa majú injekčné liekovky s meropenémom priamo rekonštituovať s 0,9 % infúznym roztokom chloridu sodného alebo s 5 % infúznym roztokom glukózy (koncentrácie infúzných roztokov meropenému sú v rozsahu od 1 mg/ml do 20 mg/ml).

Tabuľka rekonštitúcie

Dávka Meropenemu SaneXcel	Množstvo „0,9 % infúzneho roztoku NaCl“	Koncentrácia
500 mg	25 – 500 ml	20 – 1 mg/ml
1 g	50 – 1 000 ml	20 – 1 mg/ml
Dávka Meropenemu SaneXcel	Množstvo „5 % infúzneho roztoku glukózy“	Koncentrácia
500 mg	25 – 500 ml	20 – 1 mg/ml
1 g	50 – 1 000 ml	20 – 1 mg/ml

Každá injekčná liekovka je len na jednorazové použitie.

Pri príprave a podávaní roztoku sa majú používať štandardné aseptické techniky.

Roztok sa má pred použitím pretrepať.

Používajte iba číry a bezfarebný roztok, prakticky bez častíc.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Ako pripraviť tento liek

1. Umyte si ruky a dôkladne ich osušte. Pripravte si čistú pracovnú plochu.
2. Vyberte injekčnú liekovku Meropenemu SaneXcel z obalu. Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum expirácie. Skontrolujte, či je injekčná liekovka neporušená a či nie je poškodená.
3. Odstráňte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku uschnúť.
4. Novú sterilnú ihlu nasadíte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez toho, aby ste sa dotkli jej koncov.
5. Do injekčnej striekačky natiahnite odporúčané množstvo sterilnej „vody na injekcie“. Množstvo tekutiny, ktoré potrebujete, je uvedené v tabuľke vyššie:

Upozornenie: Ak je predpísaná dávka Meropenemu SaneXcel viac ako 1 g, budete musieť použiť viac ako 1 injekčnú liekovku Meropenemu SaneXcel. Potom môžete natiahnuť tekutinu z injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.

6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnete stred sivej gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekcie do injekčnej liekovky alebo injekčných liekoviek Meropenemu SaneXcel.
7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre pretrepávajte približne 5 sekúnd alebo dovedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte gumovú zátku uschnúť.
8. S piestom injekčnej striekačky úplne zatlačeným do injekčnej striekačky zasuniete ihlu opäť cez sivú gumovú zátku. Potom injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku musíte držať a injekčnú liekovku obrátiť hore dnom.
9. Hrot ihly udržiavajte v tekutine, potiahnite piest a všetku tekutinu z injekčnej liekovky natiahnite do injekčnej striekačky.
10. Ihlu a injekčnú striekačku vyberte z injekčnej liekovky a prázdnu injekčnú liekovku odložte na bezpečné miesto.
11. Injekčnú striekačku držte vo zvislej polohe tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte po injekčnej striekačke tak, aby všetky bublinky v tekutine vystúpili k hornému okraju injekčnej striekačky.
12. Odstráňte všetok vzduch z injekčnej striekačky jemným zatlačením piestu, kým všetok vzduch nevytlačíte.
13. Použité ihly a infúzne hadičky zlikvidujte vhodným spôsobom.

Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať cez krátku kanylu alebo kanylu venflon, alebo cez injekčný port alebo centrálny žilový katéter.

Podávanie Meropenemu SaneXcel cez krátku kanylu alebo kanylu venflon

1. Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhodte do nádoby na ostré predmety.
2. Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým tampónom a nechajte ho uschnúť. Otvorte viečko na kanyle a pripojte injekčnú striekačku.
3. Pomaly stláčajte piest injekčnej striekačky, aby sa antibiotikum podávalo rovnomerne počas približne 5 minút.
4. Keď skončíte s podávaním antibiotika a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite injekčnú striekačku a použite preplach.
5. Zatvorte viečko kanyly a injekčnú striekačku opatrne vyhodte do nádoby na ostré predmety.

Podávanie Meropenemu SaneXcel cez injekčný port alebo centrálny žilový katéter

1. Odstráňte uzáver portu alebo katétra, koniec očistite alkoholovým tampónom a nechajte uschnúť.
2. Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest injekčnej striekačky, aby sa antibiotikum podávalo rovnomerne počas približne 5 minút.
3. Po ukončení podávania antibiotika vytiahnite injekčnú striekačku a použite preplach.
4. Na centrálny žilový katéter nasadíte nový čistý uzáver a injekčnú striekačku opatrne vyhodte do nádoby na ostré predmety.