

Písomná informácia pre používateľa

Selexipag Teva 200 mikrogramov
Selexipag Teva 400 mikrogramov
Selexipag Teva 600 mikrogramov
Selexipag Teva 800 mikrogramov
Selexipag Teva 1 000 mikrogramov
Selexipag Teva 1 200 mikrogramov
Selexipag Teva 1 400 mikrogramov
Selexipag Teva 1 600 mikrogramov
filmom obalené tablety

selexipag

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Selexipag Teva a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Selexipag Teva
3. Ako užívať Selexipag Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Selexipag Teva
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Selexipag Teva a na čo sa používa

Selexipag Teva je liek, ktorý obsahuje liečivo selexipag. Pôsobí na krvné cievy podobným spôsobom ako prirodzená látka prostacyklín, teda uvoľňuje a rozširuje ich.

Selexipag Teva sa používa na dlhodobú liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie (*pulmonary arterial hypertension*, PAH) u dospelých pacientov nedostatočne kontrolovaných liekmi na PAH iného typu, známymi ako antagonisty endotelínového receptora a inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Selexipag Teva sa môže užívať aj samostatne, ak tieto lieky nie sú pre pacienta vhodné.

PAH je vysoký krvný tlak v cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc (pľúcne tepny). U ľudí s PAH sa tieto tepny zužujú, preto musí srdce pracovať silnejšie, aby nimi prečerpalo krv. To môže spôsobovať u ľudí pocit únavy, závraty, dýchavičnosť alebo ďalšie príznaky.

Tento liek účinkuje podobným spôsobom ako prirodzená látka prostacyklín, to znamená, že rozširuje pľúcne tepny a znižuje ich tuhosť. Uľahčuje tak srdcu prečerpávať krv pľúcnymi tepnami. Selexipag Teva znižuje tlak v pľúcnych tepnách, zmierňuje príznaky PAH a spomaľuje postup ochorenia PAH.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Selexipag Teva

Neužívajte Selexipag Teva

- ak ste alergický na selexipag alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte ťažkosti so srdcom, ako sú:
 - zlé prekrvenie srdcového svalu (ťažká forma koronárneho ochorenia srdca alebo nestabilná angina pectoris); príznaky môžu zahŕňať bolesť na hrudníku,
 - srdcový infarkt v priebehu posledných šiestich mesiacov,
 - slabé srdce (dekompenzované srdcové zlyhanie), ktoré nie je pod dôsledným lekársnym dohľadom,
 - závažný nepravidelný srdcový rytmus,
 - porucha srdcových chlopní (vrodená alebo získaná), ktorá má za následok slabú činnosť srdca (bez súvislosti s pľúcnou hypertenziou),
- ak ste v priebehu posledných 3 mesiacov prekonalí cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu) alebo inú príhodu, ktorá znížila prívod krvi do mozgu (napr. tranzitórny ischemický atak),
- ak užívate gemfibrozil (liek používaný na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Selexipag Teva, obráťte sa na svojho pľúcneho lekára alebo zdravotnú sestru, ak

- užívate lieky na vysoký krvný tlak,
- máte nízky krvný tlak spojený s príznakmi, ako sú závraty,
- ste v poslednom čase stratili významné množstvo krvi alebo tekutín napr. v dôsledku ťažkej hnačky alebo vracania,
- máte problémy so štítnou žľazou,
- máte závažné problémy s obličkami alebo podstupujete dialýzu,
- máte alebo ste mali závažné problémy so správnou funkciou pečene.

Ak spozorujete zmenu ktoréhokoľvek z uvedených prejavov alebo ochorení, **ihneď to oznámte svojmu lekárovi.**

Deti a dospievajúci

Nepodávajúte tento liek deťom mladším ako 18 rokov.

Starší pacienti

U pacientov starších ako 75 rokov sú obmedzené skúsenosti s použitím Selexipagu Teva. V tejto vekovej skupine má byť Selexipag Teva používaný s opatnosťou.

Iné lieky a Selexipag Teva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Užívanie iných liekov môže ovplyvniť účinok Selexipagu Teva.

Oznámte svojmu pľúcnemu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

- gemfibrozil (liek používaný na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi),
- klopidoogrel (liek používaný na zabránenie tvorby krvných zrazenín pri koronárnom ochorení srdca (stav, kedy krv nemôže prúdiť do srdca kvôli upchatiu ciev)),
- deferasirox (liek používaný na odstránenie železa z krvného obehu),
- teriflunomid (liek používaný na liečbu relaps-remitujúcej (charakterizovanej prudkým návratom príznakov ochorenia s následným zlepšením, kedy je pacient čiastočne alebo celkom bez príznakov ochorenia) formy sklerózy multiplex),
- karbamazepín (liek používaný na liečbu niektorých foriem epilepsie, bolesti nervov alebo na pomoc pri kontrole závažných porúch nálady, keď niektoré iné lieky nefungujú),

- fenytoín (liek používaný na liečbu epilepsie),
- kyselina valproová (liek používaný na liečbu epilepsie),
- probenecid (liek používaný na liečbu dny),
- flukonazol rifampicín alebo rifapentín (lieky používané na liečbu infekcií).

Tehotenstvo a dojčenie

Selexipag Teva sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia. Ak ste žena, ktorá môže otehotnieť, používajte účinnú antikoncepciu počas užívania Selexipagu Teva. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Selexipag Teva môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako bolesť hlavy a nízky krvný tlak (pozri časť 4), čo môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá; aj príznaky súvisiace s vaším ochorením môžu znížiť vašu schopnosť viesť vozidlá.

Selexipag Teva 600 mikrogramov obsahuje hliníkový lak allura červená AC (E 129)

To je farbivo, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

Selexipag Teva 1200 mikrogramov obsahuje hliníkový lak allura červená AC (E 129)

To je farbivo, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívať Selexipag Teva

Selexipag Teva má predpisovať iba lekár so skúsenosťami s liečbou pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý vám môže odporučiť zmenu dávky Selexipagu Teva.

Ak máte problémy s pečeňou, ktorá nepracuje správne, alebo užívate iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý vám môže odporučiť užívanie nižšej dávky Selexipagu Teva dvakrát denne alebo užívanie iba jedenkrát denne.

Ak máte poruchu zraku alebo trpíte na akýkoľvek typ slepoty, požiadajte druhú osobu o pomoc pri užívaní Selexipagu Teva počas titračného obdobia (proces postupného zvyšovania dávky).


Stanovenie vašej správnej dávky

Ak vám lekár predpíše 200 mikrogramové tablety

Na začiatku liečby bude väčšina pacientov užívať **200 mikrogramovú tabletu ráno a druhú 200 mikrogramovú tabletu večer, s odstupom približne 12 hodín**. Odporúča sa začať liečbu večer. Váš lekár vám bude dávať pokyny na postupné zvyšovanie dávky. Tento postup sa volá titrácia. Umožňuje vášmu telu prispôbiť sa novému lieku. Cieľom titrácie je dosiahnuť najvhodnejšiu dávku. Bude to najvyššia dávka, ktorú viete tolerovať, a môže to byť maximálne 1 600 mikrogramov ráno a večer.

Prvé balenie tabliet, ktoré dostanete, bude obsahovať svetložlté 200 mikrogramové tablety. Váš lekár vám povie, aby ste dávku postupne zvyšovali, zvyčajne každý týždeň, ale interval zvyšovania dávky môže byť aj dlhší.

V každom kroku si pridáte jednu 200 mikrogramovú tabletu k vašej rannej dávke a druhú 200 mikrogramovú tabletu k večernej dávke. **Prvú zvýšenú dávku sa odporúča užiť večer.** Nižšie uvedený diagram znázorňuje počet tabliet, ktoré máte užiť **každé ráno** a **každý večer** počas prvých 4 krokov.




Ak vám lekár povie, že si máte ďalej zvýšiť dávku, pridáte si jednu 200 mikrogramovú tabletu k rannej dávke a jednu 200 mikrogramovú tabletu k večernej dávke v každom novom kroku. Prvú zvýšenú dávku sa odporúča užiť večer.

Ak vám lekár dá pokyn k ďalšiemu zvýšeniu dávky, čím sa dostanete k 5. kroku, môžete užiť jednu zelenú 800 mikrogramovú tabletu a jednu svetložltú 200 mikrogramovú tabletu ráno a jednu zelenú 800 mikrogramovú tabletu a jednu 200 mikrogramovú tabletu večer.

Maximálna dávka Selexipagu Teva je 1 600 mikrogramov ráno a 1 600 mikrogramov večer. Každý pacient však nedosiahne túto dávku, pretože rôzni pacienti vyžadujú rôzne dávky.

Nižšie uvedený diagram znázorňuje počet tabliet, ktoré máte užiť každé ráno a každý večer v každom kroku, počnúc 5. krokom.



Použitie príručky titrácie počas titrácie

Dostanete titračné balenie, ktoré obsahuje príručku titrácie a písomnú informáciu pre používateľa. Príručka titrácie obsahuje informácie o postupe titrácie a môžete si do nej zaznamenávať počet tabliet, ktoré užívate každý deň.

Nezabudnite si do vášho titračného denníka zaznamenať počet tabliet, ktoré užívate každý deň. Titračný krok zvyčajne trvá asi 1 týždeň. Ak vám lekár dá pokyn k predĺženiu titračného kroku na viac ako 1 týždeň, ďalšie stránky denníka vám umožnia zaznamenať si počet užítých tabliet. **Počas titrácie pravidelne informujte svojho pľúcneho lekára alebo zdravotnú sestru.**

Ak vám lekár predpíše 100 mikrogramové tablety


Selexipag Teva nie je dostupný v sile 100 mikrogramov, preto v prípade potreby tejto sily lieku sa majú použiť iné lieky s obsahom selexipagu 100 mikrogramov dostupné na trhu.

Prechod na nižšiu dávku pre vedľajšie účinky

Počas titrácie sa môžu u vás objaviť vedľajšie účinky, ako sú bolesť hlavy, hnačka, pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), bolesť čeluste, bolesť svalov, bolesť nôh, bolesť kĺbov alebo sčervenanie tváre (pozri časť 4). Ak tieto vedľajšie účinky ťažko znášate, poraďte sa so svojím lekárom, ako ich máte zvládať alebo ako ich liečiť. Sú možnosti liečby, ktoré vám môžu pomôcť zmierniť tieto vedľajšie účinky. Napríklad lieky proti bolesti ako paracetamol môže pomôcť v liečbe bolesti a bolesti hlavy.

V prípade, že vedľajšie účinky sa nedajú liečiť alebo sa postupne nezlepšujú pri dávke, ktorú užívate, lekár môže upraviť dávku znížením počtu svetložltých tabliet, ktoré užívate, o jednu ráno a o jednu večer. Nižšie uvedený diagram znázorňuje prechod na nižšiu dávku. Urobte tak len vtedy, ak vám to povie váš lekár.

Titrácia s 200 mikrogramovými tabletami



Ak sú vedľajšie účinky po prechode na nižšiu dávku zvládnuteľné, lekár môže rozhodnúť o zotrvaní na tejto dávke. Ďalšie informácie pozri v časti Udržiavacia dávka.

Udržiavacia dávka

Najvyššia dávka, ktorú viete tolerovať počas titrácie, bude vaša udržiavacia dávka. Vaša udržiavacia dávka je dávka, ktorú musíte naďalej pravidelne užívať.

Lekár vám predpíše tablety vhodnej sily (síl) na vašu udržiavaciu dávku. **Vďaka tomu budete môcť namiesto niekoľkých tabliet užívať jednu tabletu ráno a jednu večer.**

Úplný opis vzhľadu tabliet Selexipag Teva vrátane farieb a označenia pozri v časti 6 tejto písomnej informácie.

Počas liečby môže váš lekár upraviť udržiavaciu dávku podľa potreby.

Ak sa u vás kedykoľvek i po dlhodobom užívaní rovnakej dávky vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré neviete tolerovať alebo ktoré majú vplyv na vaše každodenné činnosti, obráťte sa na svojho lekára, pravdepodobne bude nutné dávku znížiť. Lekár vám môže predpísať nižšiu dávku. nepoužité tablety zlikvidujte podľa pokynov v časti 5.

Selexipag Teva užívajte jedenkrát ráno a jedenkrát večer po 12 hodinách.

Tablety užívajte s jedlom, aby ste liek ľahšie znášali. Obal tablety poskytuje ochranu. Tablety prehltajte celé a zapite pohárom vody. Tablety nedel'te ani nedrvt'e.

Ak užijete viac Selexipagu Teva, ako máte

Ak užijete viac tabliet, ako ste mali, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak zabudnete užiť Selexipag Teva

Ak zabudnete užiť Selexipag Teva, užite dávku ihneď, ako si spomeniete, potom pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Ak je takmer čas na užitie ďalšej dávky (do 6 hodín, ako by ste ju za normálnych okolností mali užiť), zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v užívaní svojho lieku vo zvyčajnom čase. **Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.**

Ak prestanete užívať Selexipag Teva

Náhle ukončenie liečby Selexipagom Teva môže viesť k zhoršeniu vašich príznakov. Neprestávajte užívať Selexipag Teva, ak vám to nepovie lekár. Lekár vám môže povedať, aby ste dávku znižovali postupne, kým liek úplne nevysadíte.

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu prestali užívať Selexipag Teva na dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni (ak ste vynechali 3 dávky ráno a 3 dávky večer alebo 6 a viac po sebe idúcich dávok), **ihneď kontaktujte svojho lekára, môže byť potrebné dávku upraviť, aby sa zabránilo vedľajším účinkom.** Váš lekár môže rozhodnúť o obnovení liečby s nižšou dávkou, postupným zvyšovaním na predchádzajúcu udržiavaciu dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky môžete zaznamenať nielen počas titračného obdobia, keď sa vám zvyšuje dávka, ale aj neskôr pri dlhodobom užívaní tej istej dávky.

Ak spozorujete opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže viesť k ťažkostiam s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém), povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

Ak spozorujete niektorý z týchto vedľajších účinkov: bolesť hlavy, hnačku, pocit nevoľnosti (nauzeu), nevoľnosť (vracanie), bolesť čeluste, bolesť svalov, bolesť nôh, bolesť kĺbov alebo sčervenanie tváre, ktoré neviete zvládnuť alebo sa nedajú liečiť, povedzte to svojmu lekárovi, dávka, ktorú užívate, je možno pre vás príliš vysoká a možno bude potrebné ju znížiť.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- bolesť hlavy
- nával tepla (sčervenanie tváre)
- nauzea a vracanie (pocit nevoľnosti a nevoľnosť)
- hnačka
- bolesť čeluste, bolesť svalov, bolesť kĺbov, bolesť nôh
- nazofaryngitída (upchatý nos)

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- anémia (znížený počet červených krviniek)
- hypertyreóza (zvýšená činnosť štítnej žľazy)
- znížená chuť do jedla
- zníženie telesnej hmotnosti
- hypotenzia (nízky tlak krvi)
- bolesť žalúdka vrátane tráviacich ťažkostí
- bolesť
- zmeny v niektorých výsledkoch krvných testov vrátane krvného obrazu alebo funkcie štítnej žľazy

- vyrážky vrátane žihľavky, môžu spôsobovať pocit pálenia alebo štípania a sčervenanie kože
- angioedém a jeho príznaky opísané na začiatku tejto časti

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- zvýšená srdcová frekvencia

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Selexipag Teva

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po “EXP.” Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Selexipag Teva 200, 600, 1000, 1200 mikrogramov

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Selexipag Teva 400, 800, 1400, 1600 mikrogramov

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Selexipag Teva obsahuje

Liečivo je selexipag.

- Selexipag Teva 200 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 400 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 600 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 800 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 800 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 1 000 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 1 000 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 1 200 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 1 200 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 1 400 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 1 400 mikrogramov selexipagu
- Selexipag Teva 1 600 mikrogramov: každá filmom obalená tableta obsahuje 1 600 mikrogramov selexipagu

Ďalšie zložky jadra tablety sú manitol, kukuričný škrob, čiastočne substituovaná hydroxypropylcelulóza, hydroxypropylcelulóza, stearát horečnatý.

200 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, uhličitan vápenatý, žltý oxid železitý (E 172).

400 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, uhličitan vápenatý, červený oxid železitý (E 172).

600 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, uhličitan vápenatý, čierny oxid železitý (E172), hliníkový lak allura červená AC, (E 129), hliníkový lak indigokarmínu (E 132).

800 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, žltý oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172), hliníkový lak indigokarmínu (E 132).

1 000 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, uhličitan vápenatý, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172).

1 200 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, uhličitan vápenatý, čierny oxid železitý (E 172), hliníkový lak allura červená AC (E 129), hliníkový lak indigokarmínu (E 132).

1 400 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, uhličitan vápenatý, žltý oxid železitý (E 172).

1 600 mikrogramov: Filmový obal obsahuje hypromelózu 2910, hydroxypropylcelulózu, mastenec, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), uhličitan vápenatý, čierny oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Selexipag Teva a obsah balenia

Selexipag Teva 200 mikrogramov je okrúhla svetložltá filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “2” na jednej strane.

Selexipag Teva 400 mikrogramov je okrúhla červená filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “4” na jednej strane.

Selexipag Teva 600 mikrogramov je okrúhla svetlofialová filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “6” na jednej strane.

Selexipag Teva 800 mikrogramov je okrúhla zelená filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “8” na jednej strane.

Selexipag Teva 1 000 mikrogramov je okrúhla oranžová filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “10” na jednej strane.

Selexipag Teva 1 200 mikrogramov je okrúhla tmavofialová filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “12” na jednej strane.

Selexipag Teva 1 400 mikrogramov je okrúhla tmavožltá filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “14” na jednej strane.

Selexipag Teva 1 600 mikrogramov je okrúhla hnedá filmom obalená tableta s priemerom 7 mm a s označením “16” na jednej strane.

Veľkosti balení

Selexipag Teva 200 mikrogramov

Škatule po 60, 140, 60x1, 140x1 filmom obalených tabliet.

Škatule po 60 alebo 140 filmom obalených tabliet (titračné balenie).

Selexipag Teva 400 mikrogramov, 600 mikrogramov, 800 mikrogramov, 1 000 mikrogramov,

1 200 mikrogramov, 1 400 mikrogramov, 1 600 mikrogramov

Škatule po 60, 60x1, filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larissa Industrial Area, P.O. Box 3012, Larissa, 41 500, Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Česká republika	Selexipag Teva
Holandsko	Selexipag Teva 200 (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600) microgram, filmomhulde tabletten
Francúzsko	SELEXIPAG TEVA 200 (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600) microgrammes, comprimé pelliculé
Nemecko	Selexipag-ratiopharm 200 (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600) Mikrogramm Filmtabletten
Nórsko	Selexipag Teva
Poľsko	Selexipagum Teva
Portugalsko	Selexipag Teva
Rakúsko	Selexipag ratiopharm 200 (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600) Mikrogramm Filmtabletten
Slovenská republika	Selexipag Teva 200 (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600) mikrogramov
Španielsko	Selexipag Teva 200 (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600) mcg comprimidos recubiertos con película EFG
Švédsko	Selexipag Teva
Taliansko	SELEXIPAG TEVA

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2026.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk).

PRÍRUČKA TITRÁCIE – TITRAČNÉ BALENIE

Strana 1

Selexipag Teva

filmom obalené tablety

selexipag

Príručka titrácie

Začatie liečby liekom Selexipag Teva 200 mikrogramov

Pred začatím liečby si prečítajte priloženú písomnú informáciu pre používateľa.

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý vám môže odporučiť zmenu dávky Selexipag Teva 200 mikrogramov. Ak užívate iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý vám môže odporučiť užívanie Selexipag Teva 200 mikrogramov iba jedenkrát denne.

Strana 2

Obsah

Ako máte Selexipag Teva 200 mikrogramov užívať?4
Ako máte zvyšovať dávku?6
Aké sú kroky?.....8
Kedy máte znížiť dávku?.....10
Znižovanie dávky.....12

Strana 3

Keď prejdete na udržiavaciu dávku14
Ak zabudnete užiť Selexipag Teva 200 mikrogramov.....16
Ak prestanete užívať Selexipag Teva 200 mikrogramov.....17
Titračný denník18

Strana 4

Ako máte Selexipag Teva 200 mikrogramov užívať?

Liek Selexipag Teva 200 mikrogramov sa užíva každé ráno a každý večer na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie, tiež nazývanej PAH.

Začiatková dávka Selexipagu Teva 200 mikrogramov je 200 mikrogramov **jedenkrát ráno a jedenkrát večer**.

Prvá tableta Selexipagu Teva 200 mikrogramov sa má užiť večer. Každá dávka sa má zapíť pohárom vody, najlepšie počas jedla.

Strana 5

Liečba liekom Selexipag Teva 200 mikrogramov má 2 fázy:

Titrácia dávky

V prvých týždňoch budete spolupracovať s lekárom, aby ste našli pre vás správnu dávku lieku Selexipag Teva 200 mikrogramov. Lekár vám môže zvýšiť začiatkovú dávku na vyššie dávky Selexipag Teva 200 mikrogramov. Lekár vám môže znížiť dávku na nižšiu. Tento proces sa nazýva titrácia. Umožňuje vášmu telu postupne sa prispôbiť lieku.

Udržiavanie liečby

Keď lekár nájde pre vás správnu dávku, budete túto dávku pravidelne užívať. Táto dávka sa nazýva udržiavacia dávka.

Strana 6

Ako máte zvyšovať dávku?

Začnete s dávkou 200 mikrogramov ráno a večer a po konzultácii so svojím lekárom dávku zvýšite na

Strana 7

Každý pacient s PAH je iný. **Všetci neskončia na rovnakej udržiavacej dávke.** Niektorí pacienti môžu mať udržiavaciu dávku 200 mikrogramov

nasledujúcu dávku.


Prvá zvýšená dávka sa má užiť večer. Každý krok zvyčajne trvá asi 1 týždeň. Nájsť pre vás správnu dávku môže trvať aj niekoľko týždňov.

Cieľom je dosiahnuť najvhodnejšiu dávku na vašu liečbu.

Táto dávka bude vaša udržiavacia dávka

ráno a večer, zatiaľ čo niektorí dosiahnu najvyššiu dávku 1 600 mikrogramov ráno a večer. Iní môžu dosiahnuť udržiavaciu dávku niekde medzi tým. Dôležité je to, že dosiahnete dávku, ktorá je najvhodnejšia na vašu liečbu.

Strana 8



Strana 9

Strana 10

↓ Kedy máte znížiť dávku?

Tak ako so všetkými liekmi, aj s liekom Selexipag Teva 200 mikrogramov sa môžu pri zvyšovaní dávky objaviť vedľajšie účinky.

Obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky. Je dostupná liečba, ktorá vám môže pomôcť zmierniť ich.

Najčastejšie vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb), ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívaní Selexipagu Teva 200 mikrogramov, sú:

- bolesť hlavy • hnačka • pocit nevoľnosti • vracanie • bolesť čeluste • bolesť svalov • bolesť nôh • bolesť kĺbov • sčervenanie tváre

Úplný zoznam vedľajších účinkov pozri podrobnejšie v písomnej informácii pre používateľa.

Strana 11


Ak nedokážete znášať vedľajšie účinky ani potom, ako sa ich váš lekár alebo zdravotná sestra pokúsili zmierniť liečbou, môžu vám odporučiť znížiť dávku.

Ak vám lekár povie, aby ste si znížili dávku, užívajte o jednu 200 mikrogramovú tabletu menej ráno a o jednu menej večer.

Znížiť dávku si máte len po konzultácii s lekárom, ktorý vás na PAH lieči. Tento proces postupného znižovania vám pomôže určiť pre vás správnu dávku, nazývanú udržiavacia dávka.

Strana 12

Strana 13



Strana 14

Keď prejdete na udržiavaciu dávku

Najvyššia dávka, ktorú viete počas titrácie tolerovať, bude vašou **udržiavacou dávkou**. Udržiavacia dávka je dávka, ktorú máte naďalej pravidelne užívať. Lekár vám môže ako udržiavaciu dávku predpísať zodpovedajúcu **silu v jednej tablete**.

Vďaka tomu budete užívať len jednu tabletu ráno a jednu večer namiesto niekoľkých tabliet v každej dávke.

Strana 15

Napríklad, ak vaša najvyššia tolerovaná dávka počas titrácie bola 1 200 mikrogramov jedenkrát ráno a jedenkrát večer:



Počas liečby môže váš lekár upraviť udržiavaciu dávku podľa potreby.

Strana 16

Ak zabudnete užiť Selexipag Teva 200 mikrogramov

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, a potom pokračujte v užívaní vo zvyčajnom čase. Pokiaľ však do užitia ďalšej dávky zostáva menej ako 6 hodín, vynechanú dávku preskočte a pokračujte v užívaní lieku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Strana 17

Ak prestanete užívať Selexipag Teva 200 mikrogramov

Neprestávajte užívať Selexipag Teva 200 mikrogramov, ak vám to neodporučí lekár. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu prestali užívať Selexipag Teva 200 mikrogramov dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni (ak ste vynechali 6 po sebe idúcich dávok), **ihneď kontaktujte svojho lekára, ktorý vás na PAH lieči, pretože môže byť potrebné upraviť vám dávku, aby sa zabránilo vedľajším účinkom.**

Lekár vám môže obnoviť liečbu s nižšou dávkou a postupne ju zvyšovať na vašu predchádzajúcu udržiavaciu dávku.

Strana 18

Titračný denník

Strana 19

Nezabúdajte pravidelne komunikovať so svojim lekárom, ktorý vás lieči na PAH.

Pozorne si prečítajte pokyny v písomnej informácii pre používateľa.

Nasledujúce strany denníka vám pomôžu udržiavať si prehľad o počte tabliet užitých ráno a večer počas titrácie.

Zapisujte si do nich počet tabliet užitých ráno a večer.

Každý krok zvyčajne trvá asi 1 týždeň, pokiaľ vám lekár nedá iné pokyny. Ak sú titračné kroky u vás dlhšie ako 1 týždeň, denník obsahuje ďalšie strany na zaznamenávanie dávok.



Na sledovanie prvých týždňov liečby, keď užívate len 200 mikrogramové tablety, použite strany 20 až 27 (1. – 4. krok)



Ak vám boli predpísané 200 aj 800 mikrogramové tablety, použite strany 30 až 37 (5. – 8. krok).

Zapíšte si pokyny svojho lekára:

Tel. číslo a e-mail do ordinácie lekára:

Tel. číslo do lekárne:

Poznámky:

Strana 20

Týždeň: 1

Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): DD/MM/RRRR

Dátum: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8
Ráno	200 mikrogramov	0						
Večer	200 mikrogramov							

Prvé podanie lieku Selexipag Teva má prebehnúť večer.

Strana 21

Týždeň: _____

Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): DD/MM/RRRR

Dátum: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8
Ráno	200 mikrogramov							
Večer	200 mikrogramov							

Prvé užitie zvýšenej dávky Selexipagu Teva sa má užiť večer.

Strana 22

Týždeň: _____

Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): DD/MM/RRRR

Dátum: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8
Ráno	200 mikrogramov							
Večer	200 mikrogramov							

Strana 23

Týždeň: _____

Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): DD/MM/RRRR

Dátum: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8
Ráno	200 mikrogramov							
Večer	200 mikrogramov							

Preskočte na stranu 28, ak vám lekár predpíše 800 mikrogramové tablety

Strana 24

Týždeň		Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a):							
Dátum:									
Ráno									
Večer									
Preskočte na stranu 28, ak vám lekár predpíše 800 mikrogramové tablety									

Strana 25

Týždeň		Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a):							
Dátum:									
Ráno									
Večer									
Preskočte na stranu 28, ak vám lekár predpíše 800 mikrogramové tablety									

Strana 26

Týždeň		Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a):							
Dátum:									
Ráno									
Večer									
Preskočte na stranu 28, ak vám lekár predpíše 800 mikrogramové tablety									


Strana 27

Týždeň		Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a):							
Dátum:									
Ráno									
Večer									
Preskočte na stranu 28, ak vám lekár predpíše 800 mikrogramové tablety									

Strana 28

Nasledujúce strany denníka použite, keď vám lekár predpíše k 200 mikrogramovým tabletám 800 mikrogramové tablety.

Na stranách denníka zaznačte, že ste užili **jednu** 800 mikrogramovú tabletu každý deň ráno a večer s predpísaným množstvom 200 mikrogramových tabliet.



Strana 29

Nezabudnite pravidelne komunikovať so svojím lekárom.

Zapíšte si pokyny svojho lekára:

Tel. číslo a e-mail do ordinácie lekára:

Tel. číslo do lekárne:

Poznámky:

Strana 30

Týždeň		Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a):							
Dátum:									
Ráno									
		1	1	1	1	1	1	1	1
Večer									
		1	1	1	1	1	1	1	1

Strana 31

Týždeň		Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užili ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a):							
Dátum:									
Ráno									
		1	1	1	1	1	1	1	1
Večer									
		1	1	1	1	1	1	1	1

Strana 32

Strana 33

Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	

Strana 34

Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	

Strana 35

Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	

Strana 36

Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	

Strana 37

Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	Týždeň: _____ Do horného ľavého rohu napíšte číslo týždňa liečby. Do nižšie uvedených okienok každý deň zapíšte, koľko tabliet ste užíli ráno a večer. So svojím lekárom som hovoril(a): <u>DD/MM/RRRR</u> Dátum: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☀️</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">200 mikrogramov</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">🌙</td> <td style="text-align: center;">800 mikrogramov</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	☀️	200 mikrogramov								☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1	🌙	200 mikrogramov								🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
☀️	200 mikrogramov																																																																								
☀️	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	
🌙	200 mikrogramov																																																																								
🌙	800 mikrogramov	1	1	1	1	1	1	1																																																																	

Strana 38

Poznámky	
-----------------	--

Strana 39

--	--

Strana 40

--	--