

Čo mám vedieť o lieku ENKIA?

Rivaroxabán riedi krv, čím u vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.

- ◆ ENKIA sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín nikdy nevynechajte dávku.
- ◆ Liek ENKIA nesmiete prestať užívať bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.

- ◆ Predtým, ako začnete užívať liek ENKIA, povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.

- ◆ Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom informujte svojho lekára, že užívate liek ENKIA.

Kedy mám vyhľadať pomoc svojho lekára?

Pri užívaní lieku na riedenie krvi, akým je rivaroxabán, je dôležité byť si vedomý jeho možných vedľajších účinkov. Najčastejším vedľajším

účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, liek ENKIA nezačnite užívať bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- ◆ bolesť
- ◆ opuch alebo pocit nepohodlia
- ◆ bolesť hlavy, závrat alebo slabosť
- ◆ nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, pri ktorých zastavenie krvácania trvá dlhší čas

- ◆ menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne
- ◆ krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica
- ◆ vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina

Ako mám liek ENKIA užívať?

Na zabezpečenie optimálnej ochrany liekom ENKIA:

- ◆ 2,5 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla
- ◆ 15 mg sa musí užívať s jedlom
- ◆ 20 mg sa musí užívať s jedlom

31198653



KARTA
PACIENTA

ENKIA® 2,5 mg
filmom obalené tablety
(políčko na zaškrtnutie
predpísanej dávky)

ENKIA® 15 mg
filmom obalené tablety
(políčko na zaškrtnutie
predpísanej dávky)

ENKIA® 20 mg
filmom obalené tablety
(políčko na zaškrtnutie
predpísanej dávky)

- ◆ Túto kartu noste vždy so sebou
- ◆ Túto kartu ukážte pred ošetrením každému lekárovi alebo zubnému lekárovi

Užívam antikoagulačnú liečbu liekom ENKIA® (rivaroxabán)

Meno:.....

Adresa:.....

.....

Dátum narodenia:..... Hmotnosť:.....

Iné lieky/ochorenia:

.....

.....

.....

V naľehavom prípade kontaktujte:

Meno lekára:.....

Telefón lekára:.....

Pečiatka lekára:.....

Informujte aj:

Meno:.....

Telefón:.....

Vzťah k pacientovi:.....

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov:

- ♦ Hodnoty INR sa nemajú používať, pretože nie sú spoľahlivým ukazovateľom antikoagulačnej aktivity rivaroxabánu.