

▲ Zilbrysq (zilukoplan) je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.

Túto kartu majte pri sebe po celý čas liečby a 2 mesiace po poslednej dávke lieku Zilbrysq. Riziko meningokokovej infekcie môže pretrvávajúť niekoľko týždňov po poslednej dávke Zilbrysq.

Ukážte túto KARTU PACIENTA všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa podieľajú na Vašej zdravotnej starostlivosti, ako aj nemocničnej starostlivosti, a lekárnikovi pri výdaji lieku.

KARTA PACIENTA

TÚTO KARTU PACIENTA NOSTE VŽDY PRI SEBE.

Zilbrysq môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu meningokokovej infekcie. Meningokoková infekcia sa prejavuje infekciou výstelky mozgu a miechy (mozgových blán) nazývanú meningitída. Môže ísť aj o infekciu krvi nazývanú septikémia. Ak sa tieto infekcie včas nerozpoznajú a neliečia, môžu sa rýchlo stať život ohrozujúcimi alebo smrteľnými.

Ak máte akékoľvek príznaky meningokokovej infekcie, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo pohotovosť.

Ak sa nemôžete dovolať svojmu lekárovi, vyhľadajte pohotovosť alebo urgentnú starostlivosť.

Ak máte niektorý z uvedených príznakov meningokokovej infekcie, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo pohotovosť:

- Bolesť hlavy s ďalšími príznakmi:
 - nevoľnosť alebo vracanie
 - stuhnutie krku alebo chrbta
 - horúčka
- citlivosť očí na svetlo,
- zmätenosť/ospanlivosť,
- bolesti svalov s príznakmi podobnými chrípke.
- horúčka s vyrážkou alebo bez nej,

Ak máte akékoľvek príznaky meningokokovej infekcie, ihneď vyhľadajte svojho lekára.

Ak sa meningokokové infekcie nerozpoznajú a včasne neliečia, môžu sa rýchlo stať život ohrozujúcimi alebo smrteľnými.

Okamžite vyšetrite pacienta. V prípade podozrenia na meningokokovú infekciu sa majú prijať vhodné opatrenia, ako je liečba antibiotikami a prerušenie liečby zilukoplanom, až kým sa nevytlúči meningokoková infekcia.

Dôležité bezpečnostné informácie pre zdravotníckych pracovníkov

Tomuto pacientovi bol predpísaný zilukoplan, inhibítor zložky C5 komplementu, ktorý môže zvýšiť náchylnosť pacienta na meningokokové infekcie spôsobené *Neisseria meningitidis*.

Viac informácií nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC), ktorý je dostupný na adrese www.sukl.sk.

Ak má pacient akékoľvek prejavy alebo príznaky meningokokovej infekcie, čo najskôr kontaktujte uvedeného predpisujúceho lekára zilukoplanu.

Ak máte podozrenie na výskyt meningokokovej infekcie u tohto pacienta, čo najskôr kontaktujte predpisujúceho lekára (kontaktné údaje uvedené nižšie).

Meno a priezvisko pacienta

Meno predpisujúceho lekára

Tel. číslo predpisujúceho lekára:

Pohotovostné kontaktné číslo:

**Dátum začiatku liečby liekom Zilbrysq:
Informácie o očkovaní proti meningokokom**

Názov vakcíny	Séroskopina vakcíny	Číslo dávky	Dátum	Základná očkovacia schéma/ posilňovacia dávka	Podaná antibiotická profylaxia, ak sa liečba liekom Zilbrysq začala menej ako 2 týždne po očkovaní
					☐ Neuplatňuje sa ☐ Áno, dátum začiatku
					☐ Neuplatňuje sa ☐ Áno, dátum začiatku
					☐ Neuplatňuje sa ☐ Áno, dátum začiatku
					☐ Neuplatňuje sa ☐ Áno, dátum začiatku