

EURneffy®

(nosový sprej s adrenalínom)

Ako rozpoznať závažnú alergickú reakciu

EURneffy® použite ihneď pri prvých príznakoch závažnej alergickej reakcie po vystavení alergénu, pričom príznaky môžu byť takéto:

- svrbenie kože,
- vyvýšená vyrážka (ako vyrážka po popôrhnutí žihľavou),
- sčervenanie,
- opuch pier, hrdla, jazyka, rúk a nôh,
- sipot,
- zachrípnutie,
- dýchavičnosť,
- nevoľnosť,
- vracanie,
- žalúdočné kŕče,
- strata vedomia,
- strach,
- zrýchlený tep srdca,
- záchvaty,
- hnačka (riedka stolica),
- strata kontroly nad močovým mechúrom.

U mladších detí môžu byť príznaky ťažko rozpoznateľné, ďalšie informácie nájdete v Písomnej informácii pre používateľa. Vždy používajte EURneffy podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.



NEVÁHAJTE s použitím, pretože závažnosť príznakov sa môže rýchlo meniť.

Uistite sa, že vy, vaše dieťa, vaša rodina, opatrovatelia, spolupracovníci a učitelia vedia, ako a kedy používať EURneffy®.




EURneffy je dostupné v dvoch silách, pre pacientov vo veku od 4 rokov.

1 mg pre pacientov s hmotnosťou 15 - 30 kg
a 2 mg pre pacientov s hmotnosťou 30 kg
alebo väčšou.

Uchovávanie a zaobchádzanie

Každé jednorazové balenie lieku EURneffy® obsahuje jednu dávku adrenalínu a dodáva sa v blistrovom balení s návodom na podanie.

Vždy noste so sebou 2 balenia EURneffy® pre prípad, že budete potrebovať druhú dávku.



EURneffy® nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. V prípade náhodného zmrazenia nosový sprej nebude fungovať. Nechajte nosový sprej rozmrazovať aspoň jednu hodinu; nepoužívajte, ak je obsah stále zmrazený alebo nie je úplne rozmrazený. Zmrazenie nemá vplyv na dátum expirácie lieku.



Nezabudnite pravidelne kontrolovať dátum expirácie a vymeňte si EURneffy® pred dátumom expirácie.

EURneffy®

(nosový sprej s adrenalínom)

Príručka pre správne použitie pre pacientov a opatrovateľov


Cieľom tejto príručky je poradiť vám, ako postupovať v prípade závažnej alergickej reakcie alebo anafylaxie. Pacienti aj opatrovatelia si majú túto príručku prečítať, aby dokázali rozpoznať príznaky alergickej reakcie a aby vedeli, ako bezpečne a účinne podať nosový sprej EURneffy®.



1. Chyťte


Nosový sprej držte tak, ako je to znázornené na obrázku. Nosový sprej držte tak, aby sa palec nachádzal na spodnej časti piestu a prsty na oboch stranách špičky.

Za piest NEŤHAJTE ani naň NETLAČTE. NEVYKONÁVAJTE testovanie ani skúšobné rozprašovanie; každý nosový sprej obsahuje len jednu dávku.



2. Vložte

Zasúvajte špičku nosového spreja do nosovej dierky, kým sa prstami nedotknete nosa. Špičku držte rovno nasmerovanú k čelu.



3. Stlačte

Pevne stlačte piest, kým nezapadne a sprej nevystrekne do nosovej dierky.

Sprej NENAKLÁŇAJTE na vnútornú ani vonkajšiu stenu nosa.

Po použití EURneffy®

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc pre dôkladné monitorovanie anafylaktickej reakcie a v prípade, že je potrebná ďalšia liečba. Ak nemôžete zavolať vy, požiadajte niekoho, aby zavolał za vás.

Pri používaní EURneffy®

V prípade potreby si pacienti môžu ľahnúť so zdvihnutými nohami, ale ak sa im v tejto polohe ťažko dýcha, môžu si sadnúť. Pacientov v bezvedomí je potrebné uložiť na bok do stabilizovanej polohy, aby sa zabránilo duseniu. Ak príznaky neustúpia, mali by ste, ak je to možné, zostať s inou osobou, kým nepríde rýchla lekárská pomoc.

Monitorovanie príznakov pacienta

Ak sa príznaky po približne 10 minútach naďalej zhoršujú alebo sa opakujú, alebo ak dôjde k akejkoľvek chybe pri podávaní, použite nový nosový sprej EURneffy® na podanie druhej dávky do ROVNAKEJ nosovej dierky ako prvá dávka a urýchlene zavolajte záchrannú službu.



Čo je EURneffy®?

EURneffy® je nosový sprej s adrenalínom pre dospelých a deti vo veku od 4 rokov a s telesnou hmotnosťou 15 kg alebo väčšou na núdzovú liečbu závažných alergických reakcií vrátane anafylaxie (náhlej, závažnej a niekedy život ohrozujúcej alergickej reakcie) spôsobenej bodnutím alebo uštipnutím hmyzom, potravinami, liekmi a inými alergénmi (látky, ktoré spôsobujú alergiu), ako aj idiopatickej anafylaxie (príčina anafylaxie nie je známa) alebo anafylaxie spôsobenej cvičením.

Edukčné materiály pre EURneffy®, vrátane kópie písomnej informácie pre používateľa a návodu na použitie sú k dispozícii online na www.EURneffy.eu a www.sukl.sk

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru. Týka sa to aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia vigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.: +421 2 507 01 206

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke

www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

**Použite EURneffy®
hneď, ako spozorujete
príznaky závažnej
alergickej reakcie.**

ALK