Písomná informácia pre používateľa

Ruxolitinib MSN 5 mg tablety
Ruxolitinib MSN 15 mg tablety
Ruxolitinib MSN 20 mg tablety
ruxolitinib

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Informácie v tejto písomnej informácii sú určené pre vás alebo vaše dieťa – ale v písomnej informácii sa bude uvádzať len “vy”.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ruxolitinib MSN a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ruxolitinib MSN
3. Ako užívať Ruxolitinib MSN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ruxolitinib MSN
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ruxolitinib MSN a na čo sa používa

Ruxolitinib MSN obsahuje liečivo ruxolitinib.

Ruxolitinib MSN sa používa na liečbu dospelých pacientov so zväčšenou slezinou alebo s príznakmi spojenými s myelofibrózou, zriedkavou formou rakoviny krvi.

Ruxolitinib MSN sa používa aj na liečbu dospelých pacientov s polycytémiou vera, ktorí sú rezistentní alebo netolerujú hydroxyureu.

Ruxolitinib MSN sa používa aj na liečbu:
- detí vo veku od 28 dní a starších a dospelých s akútnou imunologickou reakciou štepu proti hostiteľovi (GvHD, *graft-versus-host disease*),
- detí vo veku od 6 mesiacov a starších a dospelých s chronickou GvHD.

Existujú dve formy GvHD: skorá forma nazývaná akútna GvHD, ktorá sa zvyčajne vyvinie krátko po transplantácii a môže postihovať kožu, pečeň a tráviaci trakt a forma nazývaná chronická GvHD, ktorá sa vyvíja neskôr, zvyčajne týždne až mesiace po transplantácii. Chronickou GvHD môže byť postihnutý takmer každý orgán.

Ako Ruxolitinib MSN pôsobí
Zväčšenie sleziny je typický znak myelofibrózy. Myelofibróza je porucha kostnej drene, pri ktorej je kostná dreň nahradená jazvovitým tkanivom. Abnormálna kostná dreň nemôže ďalej tvoriť dostatok normálnych krvných buniek a následkom toho sa slezina výrazne zväčšuje. Blokovaním pôsobenia určitých enzýmov (nazývajú sa Janusove kinázy (JAK)), môže Ruxolitinib MSN zmenšiť veľkosť

sleziny u pacientov s myelofibrózou a zmierniť príznaky ako je horúčka, nočné potenie, bolesti kostí a úbytok telesnej hmotnosti u pacientov s myelofibrózou. Ruxolitinib MSN môže pomôcť znížiť riziko závažných krvných a cievnych komplikácií.

Polycytémia vera je porucha kostnej drene, pri ktorej dreň tvorí priveľa červených krviniek. V dôsledku zvýšenia množstva červených krviniek krv hustne. Ruxolitinib MSN prináša úľavu od prejavov, zmenšuje objem sleziny a znižuje množstvo červených krviniek tvoriacich sa u pacientov s polycytémiou vera selektívnym blokovaním enzýmov, ktoré sa nazývajú Janusove kinázy *(Janus Associated Kinases* - JAK1 a JAK2), a tak potenciálne znižuje riziko závažných krvných alebo cievnych komplikácií.

Imunologická reakcia štepu proti hostiteľovi je komplikácia, ku ktorej dochádza po transplantácii, keď špecifické bunky (T bunky) v štepe darcu (napr. kostná dreň) nerozpoznajú hostiteľské bunky/orgány a napadnú ich. Selektívnym blokovaním enzýmov nazývaných Janusove kinázy (JAK1 a JAK2) Ruxolitinib MSN zmierňuje prejavy a príznaky akútnej a chronickej formy imunologickej reakcie štepu proti hostiteľovi, čo vedie k zlepšeniu ochorenia a prežitiu transplantovaných buniek.

Ak máte akúkoľvek otázku o pôsobení Ruxolitinib MSN alebo prečo bol tento liek predpísaný vám, opýtajte sa vášho lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ruxolitinib MSN

Dôsledne dodržujte všetky pokyny vášho lekára. Môžu sa líšiť od všeobecných údajov uvedených v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Ruxolitinib MSN
- ak ste alergický na ruxolitinib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť 2„Tehotenstvo, dojčenie a antikoncepcia“).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Ruxolitinib MSN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:
- máte akúkoľvek infekciu. Pred začatím liečby Ruxolitinibom MSN môže byť potrebné najprv liečiť vašu infekciu.
- ste už niekedy prekonali tuberkulózu alebo ste boli v blízkom kontakte s niekým, kto mal tuberkulózu. Váš lekár vám možno urobí testy na zistenie prítomnosti tuberkulózy alebo iných infekcií.
- ste niekedy mali hepatitídu B.
- máte ťažkosti s obličkami alebo máte alebo ste niekedy mali problémy s pečeňou, pretože váš lekár vám možno bude musieť predpísať inú dávku Ruxolitinib MSN.
- ste niekedy mali rakovinu, obzvlášť rakovinu kože.
- máte alebo ste mali problémy so srdcom.
- máte 65 rokov a viac. Pacienti vo veku 65 rokov a starší môžu mať zvýšené riziko srdcových problémov, vrátane infarktu myokardu a niektorých typov rakoviny.
- ste fajčiar alebo ste fajčili v minulosti.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi počas liečby s liekom Ruxolitinib MSN ak:
- sa u vás objaví horúčka, zimnica alebo iné príznaky infekcie.
- sa u vás objaví chronický kašeľ s krvavo zafarbeným hlienom, horúčka, nočné potenie a úbytok telesnej hmotnosti (toto môžu byť prejavy tuberkulózy).
- sa u vás objaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, alebo ak u vás niekto z vášho okolia spozoruje tieto príznaky: zmätenosť alebo ťažkosti pri rozmýšľaní, strata rovnováhy alebo

problémy s chôdzou, nešikovnosť, problémy pri hovorení, úbytok sily alebo slabosť na jednej strane vášho tela, zahmlené videnie alebo strata zraku. Toto môžu byť znaky závažnej infekcie mozgu a váš lekár môže odporučiť ďalšie kontroly a sledovanie.
- sa u vás objavia bolestivé kožné vyrážky a pľuzgiere (toto sú prejavy pásového oparu).
- máte akékoľvek zmeny na koži. Môžu vyžadovať ďalšie pozorovanie, pretože boli hlásené určité typy kožných nádorov (nemelanómových).
- sa u vás vyskytne náhla dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudníku alebo bolesť v hornej časti chrbta, opuch nohy alebo ruky, bolesť alebo citlivosť nôh alebo začervenanie a zmena farby na nohe alebo ruke, keďže to môžu byť prejavy krvných zrazenín v žilách.

Deti a dospievajúci
Tento liek nie je určený na používanie u detí alebo dospievajúcich vo veku do 18 rokov, ktorí majú ochorenie myelofibrózu alebo polycytémiu vera, pretože sa neskúmal v tejto vekovej skupine.

Na liečbu imunologickej reakcie štepu proti hostiteľovi sa Ruxolitinib MSN môže použiť u pacientov vo veku 28 dní a starších.

Iné lieky a Ruxolitinib MSN
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Počas liečby Ruxolitinibom MSN nikdy nezačnite užívať nový druh lieku bez toho, aby ste sa poradili s lekárom, ktorý vám Ruxolitinib MSN predpísal. Toto platí aj pre lieky na lekársky predpis, lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, rastlinné lieky a lieky používané v alternatívnej medicíne.

Zvlášť dôležité je, aby ste spomenuli lieky obsahujúce ktorékoľvek z nasledujúcich liečiv, pretože váš lekár možno bude musieť upraviť dávku Ruxolitinib MSN:
- Niektoré lieky, ktoré sa používajú pri liečbe infekcií:
  - lieky na liečbu hubových infekcií (ako napr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, flukonazol a vorikonazol)
  - antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií (ako klaritromycín, telitromycín, ciprofloxacín alebo erytromycín)
  - lieky používané na liečbu vírusových infekcií, vrátane HIV infekcie/AIDS (ako napr. amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) lieky na liečbu hepatitídy C (boceprevir, telaprevir).
- Liek na liečbu depresie (nefazodón).
- Lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) a pocitu tlaku, ťažoby alebo bolesti na hrudníku (chronickej angíny pectoris) (mibefradil alebo diltiazem).
- Liek proti páleniu záhy (cimetidín).
- Liek určený na liečbu ochorenia srdca (avasimib).
- Lieky používané na zastavenie záchvatov alebo kŕčov (fenytoín, karbamazepín alebo fenobarbital a iné antiepileptiká).
- Lieky používané na liečbu tuberkulózy (TBC) (rifabutín alebo rifampicín).
- Liek rastlinného pôvodu používaný na liečbu depresie (Ľubovník bodkovaný (*Hypericum perforatum*)).

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z uvedeného týka, obráťte sa na svojho lekára.

Tehotenstvo, dojčenie a antikoncepcia
Tehotenstvo

- Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
- Neužívajte Ruxolitinib MSN počas tehotenstva (pozri časť 2 „Neužívajte Ruxolitinib MSN“).

Dojčenie
- Počas liečby Ruxolitinibom MSN nedojčite (pozri časť 2 „Neužívajte Ruxolitinib MSN“). Poraďte sa so svojím lekárom.

Antikoncepcia
- Užívanie Ruxolitinib MSN sa neodporúča ženám, ktoré by mohli otehotnieť a ktoré nepoužívajú antikoncepciu. Poraďte sa s lekárom o vhodných opatreniach na zabránenie otehotneniu počas liečby Ruxolitinibom MSN.
- Ak otehotniete počas užívania Ruxolitinib MSN, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ak cítite po užití lieku Ruxolitinib MSN závrat, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Ruxolitinib MSN obsahuje laktózu a sodík
Ruxolitinib MSN obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Ruxolitinib MSN

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Skôr ako začnete liečbu a počas liečby Ruxolitinibom MSN vám váš lekár urobí krvné testy, aby zistil najvhodnejšiu dávku a aby vyhodnotil ako reagujete na liečbu a či má Ruxolitinib MSN nežiaduci účinok. Váš lekár možno bude musieť upraviť dávku alebo zastaviť liečbu. Váš lekár bude starostlivo sledovať, či máte príznaky alebo prejavy infekcie pred začatím a počas liečby Ruxolitinib MSN.

Myelofibróza
- Dospelí: Odporúčaná začiatočná dávka je 5 až 20 mg dvakrát denne. Maximálna dávka je 25 mg dvakrát denne u dospelých.

Polycytémia vera
- Dospelí: Odporúčaná začiatočná dávka je 10 mg dvakrát denne. Maximálna dávka je 25 mg dvakrát denne u dospelých.

Imunologická reakcia štepu proti hostiteľovi
- Deti vo veku od 6 do menej ako 12 rokov: Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg dvakrát denne.
- Deti vo veku od 12 rokov a staršie a dospelí
- : Odporúčaná začiatočná dávka je 10 mg dvakrát denne.

Perorálny roztok je dostupný pod iným obchodným názvom, ak máte ťažkosti s prehĺtaním celej tablety, a pre deti mladšie ako 6 rokov.

Užívajte Ruxolitinib MSN každý deň v rovnakom čase, buď s jedlom, alebo bez jedla.

Váš lekár vám vždy presne povie, koľko tabliet lieku Ruxolitinib MSN máte užívať.

Pokračujte v liečbe pokiaľ vám lekár nepovie, že máte liečbu ukončiť.

Ak užijete viac Ruxolitinib MSN, ako máte
Ak ste náhodne užili viac Ruxolitinib MSN ako vám lekár predpísal, okamžite kontaktujte lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Ruxolitinib MSN
Ak vynecháte dávku lieku Ruxolitinib MSN, vezmite si najbližšiu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov Ruxolitinib MSN je slabých alebo miernych a vo všeobecnosti vymiznú po niekoľkých dňoch až týždňoch liečby.

Myelofibróza a polycytémia vera

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Ak sa u vás pred užitím ďalšej plánovanej dávky vyskytnú nasledujúce závažné vedľajšie účinky, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- akékoľvek prejavy krvácania do žalúdka alebo čriev, ako napr. čierna alebo krvavá stolica alebo vracanie krvi
- nečakané podliatiny a/alebo krvácanie, nezvyčajná únava, lapanie po dychu pri cvičení alebo pri oddychu, nezvyčajne bledá pokožka alebo časté infekcie - možné príznaky porúch krvi
- bolestivé vyrážky na koži s pľuzgiermi - možné príznaky pásového oparu (*herpes zoster*)
- horúčka, zimnica alebo iné príznaky infekcie
- nízky počet červených krviniek (*anémia*), nízky počet bielych krviniek (*neutropénia*) alebo nízky počet krvných doštičiek (*trombocytopénia*)

Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):
- akékoľvek prejavy krvácania do mozgu, ako napr. náhle zmeny vedomia, pretrvávajúca bolesť hlavy, znecitlivenie, mravčenie, slabosť alebo paralýza (strata schopnosti pohybu)

Ďalšie vedľajšie účinky
Ďalšie možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- vysoká hladina cholesterolu alebo tukov v krvi (*hypertriglyceridémia*)
- nezvyčajné výsledky pečeňových testov
- závraty
- bolesť hlavy
- infekcie močových ciest
- nárast telesnej hmotnosti

- horúčka, kašeľ, ťažké alebo bolestivé dýchanie, sipot, bolesť na hrudi pri dýchaní - možné príznaky zápalu pľúc
- vysoký krvný tlak (*hypertenzia*), ktorý tiež môže byť príčinou závratov alebo bolesti hlavy
- zápcha
- vysoké hladiny lipázy v krvi

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- znížená hladina všetkých troch typov krvných buniek: červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek (*pancytopénia*)
- plynatosť (*flatulencia*)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- tuberkulóza
- opakovaný výskyt infekcie hepatitídy B (ktorá môže spôsobiť zožltnutie kože a očí, tmavohnedý moč, pravostrannú bolesť žalúdka, horúčku a pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť)

Imunologická reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD)

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné
Ak sa u vás pred užitím ďalšej plánovanej dávky vyskytnú nasledujúce závažné vedľajšie účinky, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- príznaky infekcie s horúčkou spojené s:
  - bolesť svalov, začervenanie kože a/alebo ťažkosti s dýchaním *(cytomegalovírusová infekcia*)
  - bolesť pri močení (infekcie močových ciest)
  - rýchly pulz, horúčka, zmätenosť a zrýchlené dýchanie (sepsa, čo je stav spojený s infekciou a rozsiahlym zápalom)
- časté infekcie, horúčka, zimnica, bolesť hrdla alebo vredy v ústach
- spontánne krvácanie alebo tvorba modrín - možné príznaky trombocytopénie, ktorá je spôsobená nízkym počtom krvných doštičiek

Ďalšie vedľajšie účinky
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- bolesť hlavy
- vysoký krvný tlak (*hypertenzia*)
- abnormálne výsledky krvného testu, vrátane:
  - vysoká hladina lipázy a/alebo amylázy
  - vysoká hladina cholesterolu
  - porucha funkcie pečene
  - zvýšená hladina svalového enzýmu v krvi (zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi)
  - zvýšená hladina kreatinínu, enzýmu, ktorý môže naznačovať, že vaše obličky nefungujú správne
  - nízky počet všetkých troch typov krvných buniek: červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek *(pancytopénia)*
- pocit nevoľnosti (nauzea)
- vyčerpanosť, únava, bledá koža - možné príznaky anémie, ktorá je spôsobená nízkym počtom červených krviniek

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- horúčka, bolesť svalov, bolesť alebo ťažkosti s močením, rozmazané videnie, kašeľ, prechladnutie alebo ťažkosti s dýchaním - možné príznaky infekcie BK vírusom
- nárast telesnej hmotnosti

- zápcha

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ruxolitinib MSN

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo blistri po „EXP“.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ruxolitinib MSN obsahuje
- Liečivo je ruxolitinib.
- Každá tableta Ruxolitinib MSN 5 mg obsahuje 5 mg ruxolitinibu.
- Každá tableta Ruxolitinib MSN 15 mg obsahuje 15 mg ruxolitinibu.
- Každá tableta Ruxolitinib MSN 20 mg obsahuje 20 mg ruxolitinibu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E 460), sodná soľ karboxymetylškrobu, hydroxypropylcelulóza (E 463a), povidón K30 (E 1201), koloidný bezvodý oxid kremičitý (E 551) a stearát horečnatý (E 470b).

Ako vyzerá Ruxolitinib MSN a obsah balenia
Ruxolitinib MSN 5 mg tablety sú biele až takmer biele okrúhle bikonvexné (obojstranné vypuklé) tablety, s „MR“ vyrazeným na jednej strane a „14“ vyrazeným na druhej strane.
Ruxolitinib MSN 15 mg tablety sú biele až takmer biele oválne bikonvexné (obojstranné vypuklé) tablety, s „MR“ vyrazeným na jednej strane a „12“ vyrazeným na druhej strane.
Ruxolitinib MSN 20 mg tablety sú biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné (obojstranné vypuklé) tablety, s „MR“ vyrazeným na jednej strane a „13“ vyrazeným na druhej strane.

Ruxolitinib MSN tablety sú dodávané v kalendárovom blistri obsahujúcom 56 tabliet alebo v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami obsahujúcom 56 × 1 tabletu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
MSN Labs Europe Limited
KW20A Corradino Park
Paola, PLA3000
Malta

Výrobca
Pharmadox Healthcare Limited
KW20A Kordin Industrial Park
Paola, PLA3000
Malta

MSN Labs Europe Limited
KW20A Corradino Park
Paola, PLA3000
Malta

Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod týmito názvami:

Holandsko:	Ruxolitinib MSN 5 mg tabletten
	Ruxolitinib MSN 15 mg tabletten
	Ruxolitinib MSN 20 mg tabletten
Poľsko:	Ruxolitinib MSN
Rumunsko:	Ruxolitinib MSN 5 mg comprimate
	Ruxolitinib MSN 15 mg comprimate
	Ruxolitinib MSN 20 mg comprimate
Česká republika:	Ruxolitinib MSN
Slovenská republika:	Ruxolitinib MSN 5 mg
	Ruxolitinib MSN 15 mg
	Ruxolitinib MSN 20 mg
Maďarsko:	Ruxolitinib MSN 5 mg tabletta
	Ruxolitinib MSN 15 mg tabletta
	Ruxolitinib MSN 20 mg tabletta
Chorvátsko:	Ruksolitinib MSN 5 mg tablete
	Ruksolitinib MSN 15 mg tablete
	Ruksolitinib MSN 20 mg tablete
Bulharsko:	Ruxolitinib MSN 5 mg tablets (EN)
	Руксолитиниб MSN 5 mg таблетки (BG)
Slovinsko:	Ruksolitinib MSN 5 mg tablete
	Ruksolitinib MSN 15 mg tablete
	Ruksolitinib MSN 20 mg tablete
Litva:	Ruxolitinib MSN 5 mg tabletės
	Ruxolitinib MSN 15 mg tabletės
	Ruxolitinib MSN 20 mg tabletės
Lotyšsko:	Ruxolitinib MSN 5 mg tabletes
	Ruxolitinib MSN 15 mg tabletes
	Ruxolitinib MSN 20 mg tabletes
Estónsko:	Ruxolitinib MSN

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2026.