Príručka pre pacientov liečených lizdexamfetamínom

Dôležité informácie pre pacientov o liečbe

POTENCIÁLNE RIZIKO NESPRÁVNEHO UŽÍVANIA STIMULAČNÝCH LIEKOV

Stimulačné lieky (stimulanciá) na lekársky predpis, ako je lizdexamfetamín alebo metylfenidát, sa často predpisujú na liečbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Rovnako ako pre všetky lieky, aj pre stimulanciá je dôležité ich správne užívanie. Ak sa neužívajú správne, môžu stimulanciá spôsobiť množstvo možných vedľajších účinkov, napr. ak sa užívajú vo vysokých dávkach alebo sa užívajú bez lekárskeho predpisu, môžu spôsobiť vážne zdravotné následky.

So stimulanciami na lekársky predpis je dôležité zaobchádzať zodpovedne. Nikdy sa nesmú predávať ani dávať iným ľuďom.

Nebezpečenstvo pri nesprávnom užívaní stimulancií

Nesprávne užívanie stimulancií môže zahŕňať **úmyselné odchýlenie sa od predpísaného užívania a poskytnutie lieku inej osobe:**

Úmyselné odchýlenie sa od predpísaného užívania

Nesprávne užívanie

Nesprávne užívanie znamená, že niekto zámerne neužíva liek podľa lekárskeho predpisu, napríklad užíva viac dávok vlastného lieku alebo neužíva predpísané dávky.

Zneužívanie

Zneužívanie znamená, že niekto zámerne užije vyššiu ako predpísanú dávku lieku. Môže to byť nebezpečné pre osobu užívajúcu lieky, ako aj pre ľudí okolo nej.

Poskytnutie lieku inej osobe

Poskytnutie lieku inej osobe popisuje situáciu, keď sa zmení zamýšľané použitie lieku predpísaného na liečbu zdravotného stavu pacienta. Napríklad, ak niekto poskytne svoje lieky na lekársky predpis alebo lieky na lekársky predpis svojho dieťaťa niekomu inému.

Ak vám boli predpísané stimulanciá, je potrebné ...

- čo najviac sa oboznámiť s liečbou stimulanciami
- uchovávať svoje lieky na bezpečnom mieste, aj keď ste v škole, na internáte alebo v práci
- vedieť, akú dávku máte užívať a ako často
- svoje stimulanciá užívať len tak, ako vám predpísal lekár
- sa uistiť, že nikto iný nepoužíva vaše stimulanciá. Dosiahnete to pravidelným počítaním kapsúl
- sa okamžite poradiť so svojím lekárom, ak máte obavy z čohokoľvek, čo súvisí s vaším liekom

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia vigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava

tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov.

Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Hlásením podozrení na nežiaduce účinky prispejete k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti lieku.

Túto príručku majú používať pacienti spolu s PIL liekov obsahujúcich lizdexamfetamín. Držitelia rozhodnutia o registrácii liekov obsahujúcich lizdexamfetamín sú uvedení v tabuľke na konci dokumentu.

Verzia: 1.0

Dátum schválenia ŠÚKL: 10/2026

Podozrenia na nežiaduce účinky môžete hlásiť aj držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku. Kontaktné údaje sú uvedené v tabuľke nižšie.

Názov lieku	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Kontakt
Livizux 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg tvrdé kapsuly	Egis Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 1106 Budapešť Maďarsko	EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, e-mail: registracia@egis.sk, tel.: +421 2 3240 9413
Lysmi 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg tvrdé kapsuly	Neuraxpharm Bohemia s r.o. Náměstí Republiky 1078/1 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika	NEURAXPHARM SLOVAKIA a.s. Sartorisova 21, 821 08 Bratislava, e-mail: pv-bohemia@neuraxpharm.com, tel.:+421 2 5542 5561

Tabuľka obsahuje zoznam liekov registrovaných v Slovenskej republike v čase schválenia tejto príručky. Pri predpisovaní lieku sa riaďte aktuálnym kategorizačným zoznamom a dostupnosťou liekov na trhu.