

Písomná informácia pre používateľa

Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety
Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety
Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety
amlodipín/valsartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Wamlox a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Wamlox
3. Ako užívať Wamlox
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Wamlox
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Wamlox a na čo sa používa

Tablety Wamloxa obsahujú dve liečivá, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto liečivá pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak.

- Amlodipín patrí do skupiny liečiv nazývaných „blokátory vápnikových kanálov“. Amlodipín bráni vstupu vápnika do steny krvných ciev, čím bráni zužovaniu krvných ciev.
- Valsartan patrí do skupiny liečiv nazývaných „blokátory receptorov angiotenzínu II“. Angiotenzín II sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev, čím zvyšuje tlak krvi. Valsartan pôsobí tak, že bráni účinku angiotenzínu II.

Znamená to, že obe tieto liečivá pomáhajú zastaviť zužovanie krvných ciev. Výsledkom je uvoľnenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

Wamlox sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorých krvný tlak sa dostatočne nezníži samotným amlodipínom alebo samotným valsartanom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Wamlox

Neužívajte Wamlox

- ak ste alergický na amlodipín alebo na akékoľvek iné blokátory vápnikových kanálov. Môže sa to prejavíť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkostami s dýchaním.
- ak ste alergický na valsartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak si myslíte, že môžete byť alergický, obráťte sa na svojho lekára pred užívaním Wamloxa.
- ak máte ťažké ochorenie pečene alebo žlčníka, napríklad biliárnu cirhózu alebo cholestázu.
- ak ste viac ako 3 mesiace tehotná. (Je lepšie vyhnúť sa užívaniu Wamloxa aj na začiatku tehotenstva, pozri časť „Tehotenstvo“).

- ak máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenziu).
- ak máte zúženú aortálnu chlopňu (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, pri ktorom srdce nedokáže zásobiť telo dostatkom krvi).
- ak máte zlyhávanie srdca po srdcovom infarkte.
- ak máte vysokú hladinu cukru v krvi a máte ochorenie diabetes (cukrovku) 2. typu (tiež nazývaný diabetes mellitus nezávislý od inzulínu) alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, neužite Wamlox a obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Wamlox, obráťte sa na svojho lekára:

- ak ste sa cítite zle (vracieť alebo máte hnačku).
- ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami.
- ak vám transplantovali obličku, alebo vám povedali, že máte zúžené obličkové tepny.
- ak máte ochorenie postihujúce nadobličky, nazývané „primárny hyperaldosteronizmus“.
- ak máte zlyhávanie srdca alebo ste mali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho lekára týkajúce sa začiatočnej dávky. Lekár vám možno tiež vyšetriť funkciu obličiek.
- ak vám lekár povedal, že máte zúženie srdcových chlopní (nazývané „aortálna alebo mitrálna stenóza“) alebo abnormálne zhrubnutie srdcového svalu (nazývané „obstrukčná hypertrofická kardiomyopatia“).
- ak sa u vás niekedy vyskytol opuch, najmä tváre a hrudla počas užívania iných liekov (vrátane inhibítorga enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ACE). Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, prestaňte užívať Wamlox, ihneď kontaktujte svojho lekára a už ho nikdy znova neužite.
- ak užívate niektorý z nasledovných liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:
 - inhibítorga ACE (napríklad enalapril, lisinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.
 - aliskirén.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Wamlox“.

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Wamlox.

Deti a dospelivajúci

Užívanie Wamloxa sa u detí a dospelivajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) neodporúča.

Iné lieky a Wamlox

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno bude potrebné ukončiť užívanie jedného z liekov.

Platí to najmä pre nižšie uvedené lieky:

- iné lieky používané na zníženie tlaku krvi, nazývané inhibítory ACE alebo aliskirén;
- diuretiká (typ liekov tiež nazývaný „tablety na odvodnenie“, ktoré zvyšujú tvorbu moču);
- lítium (liek na liečbu niektorých druhov depresie);
- draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka, nahradky solí obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka;
- niektoré druhy liekov proti bolesti nazývané nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) alebo selektívne inhibítory cyklooxygenázy 2 (inhibítory COX-2). Lekár vám môže vyšetriť aj funkciu obličiek;
- antikonvulzíva (napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón používané na liečbu epilepsie a niektorých kŕčových stavov);
- ľubovník bodkovany;
- nitroglycerín a iné nitráty alebo iné liečivá nazývané „vazodilatanciá“;

- lieky na liečbu HIV/AIDS (napr. ritonavir, indinavir, nelfinavir);
- lieky na liečbu hubových infekcií (napr. ketokonazol, itrakonazol);
- antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií, napr. rifampicín, erytromycín, klaritromycín, telitromycín);
- verapamil, diltiazem (lieky na liečbu srdcových ochorení);
- simvastatín (liek na zníženie vysokých hladín cholesterolu);
- dantrolén (infúzia proti závažným odchýlkam telesnej teploty);
- lieky používané na zabránenie odvrhnutia transplantovaného orgánu (cyklosporín, takrolimus).

Wamlox a jedlo a nápoje

Ludia užívajúci Wamlox nemajú jest' grapefruity a piť grapefruitovú šťavu. Grapefruit a grapefruitová šťava môžu zvýšiť hladinu lieciva amlodipínu v krvi, čo môže vyvolať nepredvídateľné zosilnenie účinku Wamloxa na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Lekár vám zvyčajne odporučí prestať užívať Wamlox predtým, ako otehotniete, alebo ihneď, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať namiesto Wamloxa iný liek. Wamlox sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva (prvé 3 mesiace) a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Amlodipín v malých množstvách prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Wamlox sa neodporúča matkám, ktoré dojčia. Ak chcete dojčiť, lekár vám môže vybrať inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poradťte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek u vás môže vyvolať závrat. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť sústredit' sa. Ak si nie ste istý, ako na vás bude tento liek pôsobiť, nevedťte vozidlá, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce sústredenie.

Wamlox obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Wamlox

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára. To vám pomôže dosiahnuť najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov.

Zvyčajná dávka Wamloxa je jedna tableta denne.

- Najvhodnejšie je užívať liek každý deň v rovnakom čase.
- Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.
- Wamlox môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Neužívajte Wamlox s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou.

Podľa toho, ako budete reagovať na liečbu, váš lekár môže navrhnúť vyššiu alebo nižšiu dávku. Neprekračujte predpísanú dávku.

Wamlox a starší ľudia (vo veku 65 rokov alebo viac)

Lekár má byť opatrný pri zvyšovaní vašej dávky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Wamloxu, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet Wamloxa, alebo ak niekoľko iný užije vaše tablety, ihneď sa poradte s lekárom.

Prebytočná tekutina sa môže nahromadiť vo vašich pľúcach (pľúcny edém), čo spôsobuje dýchavičnosť, ktorá sa môže prejavovať až 24 – 48 hodín po užití.

Ak zabudnete užiť Wamlox

Ak zabudnete užiť tento liek, užite ho hned, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom

čase. Ak je však už takmer čas na užitie ďalšej dávky, vyniechajte dávku, na ktorú ste zabudli.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vyniechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Wamlox

Ukončenie liečby Wamloxom môže spôsobiť zhoršenie vášho ochorenia. Neprestanete užívať svoj liek, pokial vám to neodporučí váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niekteré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú lekársku pomoc:

U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky (*môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 osôb*). **Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:**

Alergická reakcia s príznakmi ako vyrážky, svrbenie, opuch tváre, pier alebo jazyka, sťažené dýchanie, nízky krvný tlak (pocit slabosti, závrat).

Iné možné vedľajšie účinky Wamloxu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): chrípka; upchatý nos, bolest' hrdla a neprijemný pocit pri prehlitaní; bolesť hlavy; opuch ramien, rúk, nôh, členkov alebo chodidel; únava; asténia (slabosť); začervenanie a pocit tepla na tvári a/alebo hrdle.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): závrat; nutkanie na vracanie a bolest' brucha; sucho v ústach; ospalosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo chodidlach; pocit točenia; zrýchlený tep a búšenie srdca; závrat pri vstávaní; kašeľ, hnačka; zápcha; kožné vyrážky, začervenanie kože; opuch kĺbov, bolest' chrbta; bolest' v kĺboch.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): pocit úzkosti; zvonenie v ušiach (tinnitus); mdloby; vylučovanie väčšieho množstva moču ako zvyčajne alebo častejšie nutkanie na močenie; neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu; pocit ťažoby; nízky krvný tlak s príznakmi ako točenie hlavy; nadmerné potenie; kožné vyrážky na celom tele; svrbenie; svalové kŕče.

Ak vám niektorý z uvedených účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedľajšie účinky hlásené pri užívaní samotného amlodipínu alebo valsartanu, ktoré sa bud' nepozorovali pri Wamloxe, alebo sa pozorovali častejšie ako pri Wamloxe:

Amlodipín

Okamžite sa poradte s lekárom, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku:

- Náhly sipot, bolest' na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosť pri dýchaní.
- Opuch očných viečok, tváre alebo pier.
- Opuch jazyka a hrdla, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.

- Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevenson-Johnsonov syndróm, toxicá epidermálna nekrolýza) alebo iné alergické reakcie.
- Srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu.
- Zápal pankreasu (podžalúdková žlaza), ktorý môže spôsobiť silnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, že sa cítite veľmi zle.

Hlásené boli nasledovné vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte svojho lekára.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): závrat, ospalosť; búsenie srdca (vnímanie tlkotu srdca); začervenanie, opuch členkov (edém); bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť, tras, poruchy chuti, mdloby, strata vnímania bolesti; poruchy videnia, zhoršenie videnia, zvonenie v ušiach; nízky tlak krvi; kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída); tráviace ťažkosti, vracanie (nevoľnosť); vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, zmeny sfarbenia pokožky; ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení; neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolest/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov, bolest, celková nevoľnosť, bolestivosť svalov, svalové kŕče; nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): zmätenosť.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných došticek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek); zvýšený cukor v krvi (hyperglykémia); opuch d'asien, nadúvanie brucha (gastritída); poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie hladiny pečeňových enzymov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov; zvýšené napätie vo svaloch; zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou, citlivosť na svetlo.

Neznáme (časťosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): poruchy pohyblivosti ako tras, strnulý postoj, maskovitá tvár, pomalé pohyby a šuchtavá chôdza, ťažkosti s udržaním rovnováhy.

Valsartan

Neznáme (časťosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pokles počtu červených krviniek, horúčka, bolesť hrdla alebo bolestivé miesta v ústach následkom infekcií; krvácanie alebo vznik modrín bez zjavnej príčiny; vysoká hladina draslíka v krvi; abnormálne výsledky testov funkcie pečene; znížená funkcia obličiek a závažný pokles funkcie obličiek; opuch, najmä tváre a hrdla; bolestivosť svalov; vyrážky, fialovočervené škvurny; horúčka; svrbenie; alergická reakcia, pľuzgiere na koži (prejav ochorenia nazvaného bulózna dermatitída).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Wamlox

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Wamlox obsahuje

- Liečivá sú amlodipín a valsartan.
Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety:
Každá 5 mg/80 mg filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát) a 80 mg valsartanu.
Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety:
Každá 5 mg/160 mg filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát) a 160 mg valsartanu.
Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety:
Každá 10 mg/160 mg filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipínium-bezylát) a 160 mg valsartanu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, stearát horečnatý, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K25, laurylsíran sodný, manitol a koloidný bezvodý oxid kremičitý v jadre tablety a polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, mastenec, žltý oxid železitý (E172) vo filmovom obale. Pozri časť 2 „Wamlox obsahuje sodík“.

Ako vyzerá Wamlox a obsah balenia

Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety (tablety): tento liek je dostupný ako hnedožlté okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami a s možnými tmavšími škvunami (priemer tablety: 8 mm, hrúbka tablety: 3,0 mm – 4,3 mm).
Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety (tablety): tento liek je dostupný ako hnedožlté oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s možnými tmavšími škvunami (rozmery tablety: 13 mm x 8 mm, hrúbka tablety: 3,8 mm – 5,4 mm).
Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety (tablety): tento liek je dostupný ako bledé hnedožlté oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety (rozmery tablety: 13 mm x 8 mm, hrúbka tablety: 3,8 mm – 5,4 mm).

Blister (OPA/Alu/PVC-Alu fólia): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobcovia

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

KRKA-farma d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10 450 Jastrebarsko, Chorvátsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Názov štátu	Názov lieku
Maďarsko	Wamlox 5 mg/80 mg filmtabletta Wamlox 5 mg/160 mg filmtabletta Wamlox 10 mg/160 mg filmtabletta
Slovensko	Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety

Bulharsko	Вамлокс 5 mg/80 mg филмирани таблетки Вамлокс 5 mg/160 mg филмирани таблетки Вамлокс 10 mg/160 mg филмирани таблетки
Česká republika	Wamlox 5 mg/80 mg Wamlox 5 mg/160 mg Wamlox 10 mg/160 mg
Slovinsko, Chorvátsko	Wamlox 5 mg/80 mg filmsko obložene tablete Wamlox 5 mg/160 mg filmsko obložene tablete Wamlox 10 mg/160 mg filmsko obložene tablete
Estónsko, Poľsko	Wamlox
Lotyšsko	Wamlox 5 mg/80 mg apvalkotās tabletes Wamlox 5 mg/160 mg apvalkotās tabletes Wamlox 10 mg/160 mg apvalkotās tabletes
Litva	Wamlox 5 mg/80 mg plēvele dengtos tabletēs Wamlox 5 mg/160 mg plēvele dengtos tabletēs Wamlox 10 mg/160 mg plēvele dengtos tabletēs
Rumunsko	Wamlox 5 mg/80 mg comprimate filmate Wamlox 5 mg/160 mg comprimate filmate Wamlox 10 mg/160 mg comprimate filmate
Rakúsko	Wamlox 5 mg/80 mg Filmtabletten Wamlox 5 mg/160 mg Filmtabletten Wamlox 10 mg/160 mg Filmtabletten
Nemecko	Amlo-Valsacor 5 mg/80 mg Filmtabletten Amlo-Valsacor 5 mg/160 mg Filmtabletten Amlo-Valsacor 10 mg/160 mg Filmtabletten

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2022.

Podrobnejšie informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečív (www.sukl.sk).