

Písomná informácia pre používateľa

DICARTIL 5 mg/10 mg filmom obalené tablety DICARTIL 10 mg/10 mg filmom obalené tablety

amlodipín/atorvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je DICARTIL a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DICARTIL
3. Ako užívať DICARTIL
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať DICARTIL
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je DICARTIL a na čo sa používa

DICARTIL sa používa na prevenciu srdcovoocievnych príhod (napr. angíny pektoris, srdcového infarktu) u pacientov s vysokým krvným tlakom, ktorí majú ďalšie srdcovoocievne rizikové faktory, ako sú fajčenie, nadváha, zvýšený cholesterol v krvi, srdcové ochorenie v rodinnej anamnéze alebo cukrovka. Prítomnosť takýchto rizikových faktorov súvisiacich s vysokým krvným tlakom vystavuje pacientov zvýšenému riziku vzniku srdcovoocievnych príhod.

DICARTIL je liek, ktorý obsahuje dve liečivá, amlodipín (blokátor kalciových kanálov) a atorvastatín (statín) a má sa používať vtedy, keď váš lekár považuje za vhodné použiť oba lieky. Amlodipín sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a atorvastatín znižuje hladinu cholesterolu.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je zdravotný stav, pri ktorom sa zistilo pretrvávajúce nezvyčajné zvýšenie tlaku krvi a je jedným z rizikových faktorov srdcovoocievnych príhod (angíny pektoris, srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody).

Cholesterol je prirodzene sa vyskytujúca látka v tele, ktorá je potrebná pre normálny rast. Ak však máte v krvi príliš veľa cholesterolu, môže sa ukladať na stenách ciev, čím zvyšuje riziko krvných zrazenín a srdcovoocievnych príhod. Toto je jedna z najčastejších príčin ochorenia srdca.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DICARTIL

Neužívajte DICARTIL

- ak ste alergický (precitlivený) na amlodipín alebo atorvastatín alebo na ktorýkoľvek iný blokátor kalciových kanálov alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
- ak v súčasnosti máte ochorenie, ktoré má vplyv na pečeň (ak ste v minulosti mali ochorenie, ktoré malo vplyv na pečeň, pozrite si ďalej časť „Upozornenia a opatrenia“)
- ak ste mali akékoľvek neobjasnené nezvyčajné hodnoty krvných testov funkcie pečene

- ak ste tehotná, pokúšate sa otehotniť, alebo ak dojčíte
- ak užívate niektorý z nasledovných liekov: ketokonazol, itrakonazol (lieky používané na liečbu infekcie spôsobenej hubami alebo mykóz), telitromycín (antibiotikum)
- ak máte závažne nízky tlak krvi (hypotenuziu)
- ak máte zúženie srdcovnicovej chlopne (aortálnej stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou)
- ak máte zlyhávanie srdca po srdcovej infarkte
- ak pri liečbe hepatítidy typu C používate kombináciu glecaprevir/pibrentasvir

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať DICARTIL, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- ak máte závažné respiračné zlyhanie
- ak užívate alebo ste posledných 7 dní užívali liek nazývaný kyselina fusidová (liek na bakteriálne infekcie) v perorálnej alebo injekčnej forme. Kombinácia kyseliny fusidovej a DICARTILU môže viesť k závažným ťažkostiam so svalmi (rabdomyolýza).
- ak máte ťažkosti s obličkami
- ak máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu)
- ak ste mali opakované alebo nevysvetlené bodanie alebo bolesti svalov, dedičné svalové ťažkosti v osobnej alebo rodinnej anamnéze (chorobopise)
- ak ste mali svalové ťažkosti počas predchádzajúcej liečby inými liekmi na zníženie cholesterolu (tuku) (napr. inými „statínm“ alebo „fibratmi“)
- ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu
- ak ste mali v minulosti ochorenie, ktoré malo vplyv na vašu pečeň
- ak máte viac ako 70 rokov
- ak ste mali predtým náhlu cievnu mozgovú príhodu s krvácaním do mozgu alebo máte po predchádzajúcich mozgových príhodách v mozgu malé ohraničené ložiská s tekutinou
- ak máte alebo ste mali myasténiu (ochorenie s celkovou svalovou slabosťou, v niektorých prípadoch vrátane svalov používaných pri dýchaní) alebo očnú myasténiu (ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť oka), pretože statíny môžu niekedy toto ochorenie zhoršiť alebo viesť k vzniku myasténie (pozri časť 4).

Ak sa vás týka niektorý z týchto prípadov, váš lekár bude potrebovať urobiť krvné testy pred a možno aj počas liečby DICARTILOM, aby mohol predpovedať riziko výskytu vedľajších účinkov súvisiacich so svalmi. Je známe, že riziko výskytu vedľajších účinkov súvisiacich so svalmi napr. rabdomyolyzy, sa zvyšuje, keď sa niektoré lieky užívajú v rovnakom čase (pozri časť 2 „Iné lieky a DICARTIL“).

Ak máte svalovú slabosť, ktorá pretrváva, tiež sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Na diagnostikovanie a liečbu tohto ochorenia budú možno potrebné ďalšie vyšetrenia a lieky.

V priebehu liečby týmto liekom vás bude lekár starostlivo sledovať, pokiaľ máte cukrovku alebo u vás existuje riziko, že by ste cukrovku mohli dostať. Riziko, že by ste mohli dostať cukrovku je vyššie, pokiaľ máte v krvi vysoké hladiny cukrov a tukov, trpíte nadváhou alebo máte vysoký krvný tlak.

Iné lieky a DICARTIL

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Existujú niektoré lieky, v prípade ktorých môže dôjsť k interakcii s DICARTILOM. Táto interakcia by mohla spôsobiť menšiu účinnosť jedného alebo oboch liekov. Prípadne by mohla zvýšiť riziko alebo závažnosť vedľajších účinkov vrátane závažných stavov charakterizovaných ubúdaním svalov, známych ako rabdomyolyza a myopatia (opísaných v časti 4):

- niektoré antibiotiká napr. rifampicín, kyselina fusidová alebo „makrolídové antibiotiká“ napr. erytromycín, klaritromycín, telitromycín alebo niektoré lieky používané na liečbu hubových infekcií napr. ketokonazol, itrakonazol
- lieky na reguláciu hladiny cholesterolu: fibráty (napr. gemfibrozil) alebo cholestipol

- lieky na reguláciu srdcového rytmu napr. amiodarón, diltiazem a verapamil
- lieky používané na liečbu alebo prevenciu záchvatov napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidon
- lieky, ktoré sa používajú na ovplyvnenie imunitného systému napr. cyklosporín, takrolimus, sirolimus, temsirolimus, everolimus
- lieky používané na liečbu HIV, ako ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinácia tipranaviru/ritonaviru atď.
- niektoré lieky používané na liečbu hepatitídy typu C (žltacký) napr. telaprevir, boceprevir a kombinácia elbasvir/grazoprevir, ledipasvir/sofosbuvir
- letermovir, liek, ktorý vám pomáha zabrániť vzniku ochorenia vyvolaného cytomegalovírusom
- lieky používané na liečbu depresie napr. nefazodon a imipramín
- lieky používané na liečbu duševných porúch napr. neuroleptiká
- lieky používané na liečbu zlyhávania srdca napr. betablokátory
- lieky používané na liečbu vysokého tlaku krvi napr. antagonisty angiotenzínu II, ACE inhibítory, verapamil a diuretiká
- alfablokátory používané na liečbu vysokého tlaku krvi a tŕažkostí s prostatou
- iné lieky, o ktorých je známe, že sa vzájomne ovplyvňujú s DICARTILOM, vrátane ezetimibu (ktorý znižuje cholesterol), warfarínu (ktorý znižuje zrážanlivosť krvi), perorálnej (ústami užívanej) antikoncepcie, stiripentolu (lieku na kŕče pri epilepsii), cimetidínu (používaného na pálenie záhy a vredovú chorobu žalúdka), fenazónu (liek proti bolesti), kolchicínov (používané na liečbu dny) a antacíd (lieky na tráviace tŕažkosti obsahujúce hliník alebo horčík)
- amifostín (používaný na liečbu rakoviny)
- sildenafil (na erektilnú dysfunkciu)
- dantrolén a baklofén (svalové relaxanciá, lieky na uvoľnenie svalstva)
- steroidy
- voľnopredajné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný
- ak budete potrebovať užívať kyselinu fusidovú v perorálnej forme na liečbu bakteriálnej infekcie, musíte prerušiť užívanie tohto lieku. Váš lekár vám povie, kedy bude bezpečné začať znova užívať DICARTIL. Užívanie DICARTILU s kyselinou fusidovou môže zriedkavo viesť k svalovej slabosti, citlivosti alebo bolesti (rabdomolyza). Viac informácií o rabdomolyze nájdete v časti 4.

DICARTIL môže znižovať krvný tlak oveľa viac, ak ho užívate s inými liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

DICARTIL a jedlo a nápoje

DICARTIL sa môže užívať kedykoľvek počas dňa, s jedlom alebo bez jedla.

Grapefruitový džús

Nevypite viac ako jeden alebo dva poháre grapefruitového džúsu za deň, pretože veľké množstvo grapefruitového džúsu môže zmeniť účinky DICARTILU.

Alkohol

Počas užívania DICARTILU sa vyhýbajte pitiu príliš veľkého množstva alkoholu. Ďalšie informácie pozrite v časti 2 „Upozornenia a opatrenia“.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte DICARTIL, ak ste tehotná, dojčíte, alebo ak sa pokúšate otehotniť. Ženy v plodnom veku musia počas užívania DICARTILU alebo akéhokoľvek lieku používať primerané antikoncepčné opatrenia. Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poradťte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevedťte vozidlá ani neobsluhujte žiadne stroje, ak po užití tohto lieku pocíťujete závrat.

DICARTIL obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať DICARTIL

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí

Zvyčajná začiatočná dávka DICARTILU u dospelých je jedna 5 mg/10 mg tableta denne. V prípade potreby váš lekár môže zvýšiť dávku na 10 mg/10 mg tabletu DICARTILU denne.

DICARTIL sa má prehltnúť celý a zapíť vodou. Tablety môžete užiť perorálne kedykoľvek počas dňa, s jedlom alebo bez jedla. Avšak pokúste sa užiť vašu tabletu každý deň v rovnakom čase.

Dodržujte rady svojho lekára týkajúce sa diéty, zvlášť diéty s obmedzením tukov, vyhýbajte sa fajčeniu a pravidelne cvičte.

Ak máte pocit, že účinok tablet DICARTILU je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Použitie u detí a dospeievajúcich

Tento liek sa neodporúča pre deti a dospeievajúcich.

Ak užijete viac DICARTILU, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tablet DICARTILU (viac ako vašu zvyčajnú dennú dávku), obráťte sa na svojho lekára, alebo choďte do najbližšej nemocnice. Zoberte si so sebou všetky zostávajúce tablety a vnútorný obal s celou škatuľkou, aby mohol personál nemocnice ľahko zistíť, aký liek ste užili.

Prebytočná tekutina sa môže nahromadiť vo vašich plúcach (plúcny edém), čo spôsobuje dýchavičnosť, ktorá sa môže prejavíť až 24 – 48 hodín po užití.

Ak zabudnete užiť DICARTIL

Ak zabudnete užiť dávku, užite len vašu nasledujúcu plánovanú dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať DICARTIL

DICARTIL neprestaňte užívať, pokial vám to nepovie váš lekár. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku alebo si želáte ukončiť vašu liečbu, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejava u každého.

Ak u vás nastane niektorý z nasledovných prípadov, prestaňte užívať DICARTIL a povedzte to okamžite svojmu lekárovi:

- opuch tváre, jazyka a priedušnice, ktoré môžu spôsobiť veľké tŕažkosti pri dýchaní
- ak pocíťujete akúkoľvek nevysvetliteľnú svalovú slabosť, svalovú citlivosť, bolesť alebo natrhnutie svalu alebo červeno-hnedé sfarbenie moču a zároveň sa necítite dobre alebo máte

vysokú teplotu. (Veľmi zriedkavo táto kombinácia účinkov viedla k závažnému život ohrozujúcemu stavu nazývanému rabdomyolýza.)

- ochorenie nazývané syndróm podobný lupusu (zahŕňa vyrážku, poruchy kĺbov a účinky na krvné bunky)

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

- opuch ramien, rúk, nôh, kĺbov alebo chodidel

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

- alergická reakcia
- bolest hlavy (zvlášť na začiatku liečby), závrat, pocit únavy, ospanlivosť
- nepravidelný tlkot srdca, začervenanie
- palpitácie (nezvyčajné vnímanie tlkotu srdca), dýchavičnosť
- zápal nosových ciest, bolest v hrdle, krvácanie z nosa
- nutkanie na vracanie, bolest brucha, problémy s trávením, zmenené návyky týkajúce sa vyprázdnovania (vrátane hnačky, zápchy a vetrov)
- bolest svalov a kĺbov, svalové kŕče a sťahy, bolest chrbta, bolest končatín, svalová únava
- zvýšenie hladiny cukru v krvi (ak máte cukrovku, nadľa si starostlivo sledujte hladinu cukru v krvi), zvýšená hladina kreatínskoy v krvi, výsledky krvných testov, ktoré poukazujú na to, že vaša pečeň nefunguje správne
- ťažkosti so zrakom (vrátane dvojitého videnia), rozmazané videnie

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

- hepatítida (zápal pečene)
- nádcha, strata chuti do jedla, zníženie hladiny cukru v krvi (ak máte cukrovku, nadľa si starostlivo sledujte hladinu cukru v krvi), zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti
- ťažkosti so spaním, nočné mory, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia, tremor (tras), poškodenie senzorických nervov (znížená citlivosť) na rukách a nohách, strata pamäti
- zvonenie alebo bučanie v ušiach, mdloby, zvýšené potenie, nízky krvný tlak
- sucho v ústach, zmeny vo vnímaní chuti, vracanie, grganie
- strata vlasov, modriny alebo malé škvŕny na koži, zmeny sfarbenia pokožky, znížená citlivosť kože na dotyk alebo bolest, pocit mravčenia v prstoch a palcoch na nohách, kožná vyrážka, žihľavka alebo svrbenie
- ťažkosti pri močení (vrátane nadmerného močenia v noci a častejšieho močenia), impotencia, zväčšenie prsných žliaz u mužov
- pocit telesnej nepohody, pankreatítida (zápal podžalúdkovej žľazy vedúci k bolestiam brucha), bolest, bolest krku, bolest na hrudi
- pozitívna reakcia vyšetrenia moču na biele krvinky
- nepravidelný srdcový rytmus
- kašeľ

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

- neočakávané krvácanie alebo tvorba modrín
- závažný zápal svalov, veľmi silné svalové bolesti alebo kŕče, natrhnutie svalu, ktoré môžu veľmi zriedkavo viesť k rabdomyolýze (rozpadu svalových buniek) a nezvyčajnému rozpadu svalov. Nezvyčajný rozpad svalov sa nie vždy zastaví, dokonca, aj keď ste prestali užívať DICARTIL, a to môže byť život ohrozujúce a viesť k ťažkostiam s obličkami.
- znížený počet krvných doštičiek v krvi
- ťažkosti s pečeňou (zožltnutie kože a očných bielok)
- závažné kožné reakcie alergického pôvodu, začervenanie kože, pľuzgierovitá vyrážka, odlupovanie kože, ktoré sa môže rýchlo rozšíriť na celé telo a môže začať príznakmi podobnými chripke sprevádzanými vysokou horúčkou (toxická epidermálna nekrolýza)
- opuch v hlbokých vrstvách kože – vrátane opuchu pier, očných viečok a jazyka
- zápal alebo opuch kostrových svalov, vyrážka s pľuzgierikmi, náhly, závažný, ohraničený opuch kože
- zápal šliach, poškodenie šliach

- zmätenosť

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

- alergická reakcia – príznaky môžu zahŕňať náhlú dýchavičnosť a bolest' na hrudníku alebo stuhnutosť, opuch očných viečok, tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, t'ažkosti s dýchaním, kolaps
- znížený počet bielych krviniek v krvi
- stuhnutosť svalov alebo zvýšené svalové napätie
- srdečový infarkt, zápal malých krvných ciev, bolest' žalúdka (gastritída)
- zväčšenie d'asien, krvácanie d'asien
- strata sluchu, zlyhanie pečene
- fotosenzitivita (citlivosť kože na svetlo)

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

- svalová slabosť, ktorá pretrváva
- sexuálne t'ažkosti
- t'ažkosti s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo namáhavé dýchanie alebo horúčka
- t'ažkosti kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohybu
- cukrovka. Riziko je vyššie, pokiaľ máte v krvi vysoké hladiny cukrov a tukov, trpíte nadváhou alebo máte vysoký krvný tlak. Vás lekár vás bude v priebehu liečby týmto liekom sledovať.
- myastenia gravis (ochorenie spôsobujúce celkovú svalovú slabosť, v niektorých prípadoch vrátane svalov používaných pri dýchaní).

Očná myastenia (ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť oka).

Ak sa u vás vyskytne slabosť v rukách alebo nohách, ktorá sa zhoršuje po obdobiah aktivity, dvojité videnie alebo padanie očných viečok, problémy s prehľtaním alebo dýchavičnosť, poraďte sa so svojím lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotní sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať DICARTIL

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, škatuľke a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo DICARTIL obsahuje

Liečivá sú amlodipín a atorvastatín.

Tablety DICARTIL 5 mg/10 mg obsahujú 5 mg amlodipínu ako amlodipínium-bezylátu a 10 mg atorvastatínu ako trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu.

Tablety DICARTIL 10 mg/10 mg obsahujú 10 mg amlodipínu ako amlodipínium-bezylátu a 10 mg atorvastatínu ako trihydrátu vápenatej soli atorvastatínu.

Ďalšie zložky sú uhličitan vápenatý, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný kukuričný škrob, polysorbát 80, hyprolóza, koloidný oxid kremičitý (bezvodý) a stearát horečnatý.

Filmotvorná obalová vrstva tablet DICARTIL 5 mg/10 mg obsahuje: bielu Opadry II 85F28751 (polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastenec).

Filmotvorná obalová vrstva tablet DICARTIL 10 mg/10 mg obsahuje: modrú Opadry II 85F10919 (polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu (E132), makrogol 3000 a mastenec).

Ako vyzerá DICARTIL a obsah balenia

Tablety DICARTIL 5 mg/10 mg sú biele filmom obalené tablety oválneho tvaru označené „Pfizer“ na jednej strane a „CDT 051“ na strane druhej.

Tablety DICARTIL 10 mg/10 mg sú modré filmom obalené tablety oválneho tvaru označené „Pfizer“ na jednej strane a „CDT 101“ na strane druhej.

Tablety DICARTIL sú dostupné v blistrových baleniach po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 alebo 200 tablet alebo vo flăškách s uzáverom s detskou poistkou po 30 alebo 90 tablet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Upjohn EESV
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel
Holandsko

Výrobca

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Nemecko

Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom, 2900
Maďarsko

Tento liek je schválený v nasledujúcich členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu	Názov lieku
Francúzsko	Amlodipine/Atorvastatine Génériques 5 mg/10 mg comprimé pelliculé Amlodipine/Atorvastatine Génériques 10 mg/10 mg comprimé pelliculé
Maďarsko	DICARTIL 5 mg/10 mg filmtabletta DICARTIL 10 mg/10 mg filmtabletta
Slovenská republika	DICARTIL 5 mg/10 mg filmom obalené tablety DICARTIL 10 mg/10 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2024.