

## Písomná informácia pre používateľa

### Anopyrin 30 mg kyselina acetylsalicylová tablety

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkolvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

#### **V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Anopyrin 30 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anopyrin 30 mg
3. Ako užívať Anopyrin 30 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Anopyrin 30 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Anopyrin 30 mg a na čo sa používa**

Anopyrin 30 mg patrí medzi antitrombotiká zo skupiny inhibítorga agregácie trombocytov, to znamená medzi liečivá, ktoré tlmi zhlukovanie krvných doštičiek (trombocytov), a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach (vzniku trombov).

Anopyrin 30 mg sa užíva na lekársky predpis:

- pri nestabilnej angíne pektoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou priesmyku srdcovými vencovitými tepnami) – ako doplnok štandardnej liečby;
- na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá (napr. prechodné prejavy obrny na tvári alebo svalovine končatín či prechodná strata videnia).

#### Upozornenie:

Anopyrin 30 mg nie je vhodný na liečbu bolestivých stavov.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anopyrin 30 mg**

##### **Neužívajte Anopyrin 30 mg**

- ak ste alergický/á na liečivo kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné salicyláty (látky príbuzné kyseline acetylsalicylovej) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak u vás v minulosti užitie kyseliny acetylsalicylovej alebo liekov s podobným účinkom, najmä nesteroidných protizápalových liekov, vyvolalo astmatický záchvat;
- pri žalúdočných alebo dvanásťnikových vredoch;
- pri chorobne zvýšenej náchylnosti na krvácanie (hemoragickej diatéze);
- ak máte mastocytózu (ochorenie imunitného systému);
- pri závažnom zlyhaní obličiek;
- pri ťažkom poškodení funkcie obličiek;
- pri závažnom zlyhaní pečene;

- pri závažnom srdcovom zlyhaní;
- v kombinácii s metotrexátom pri dávke 15 mg týždenne alebo vyššej;
- u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení. Pri podávaní kyseliny acetylsalicylovej hrozí deťom a dospievajúcim riziko vzniku veľmi zriedkavého život ohrozujúceho Reyovho syndrómu, ktorý postihuje mozog a pečeň;
- v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť plod, predlžiť či oneskoríť pôrod a predlžiť krvácanie;
- v posledných troch mesiacoch tehotenstva nesmiete užívať dávky vyššie ako 100 mg denne (pozri časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“).

### **Upozornenia a opatrenia**

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Anopyrin 30 mg:

- ak ste alergický na iné lieky proti bolesti, zápalu alebo reumatizmu, či pri existencii iných alergií;
- ak sa súbežne liečite liekmi tlmiacimi zrážanie krvi (napr. kumarínovými derivátmi, heparínom – s výnimkou liečby heparínom v nízkych dávkach);
- ak máte prieduškovú astmu;
- ak máte dlhotrvajúce (chronické) či opakujúce sa ťažkosti so žalúdkom alebo dvanásťnikom;
- ak máte poruchu funkcie obličiek;
- ak máte poruchu funkcie pečene;
- ak užívate lieky uvedené v bode „Iné lieky a Anopyrin 30 mg“.

Pacientom, ktorí trpia prieduškovou astmou, alergickou nádchou, nosovými polypmi (výrastkami na nosovej sliznici) alebo chronickými (zdlhavými) infekciami dýchacích ciest (najmä sprevádzanými prejavmi typu alergickej nádchy), a pacientom s precitlivenosťou na lieky proti bolesti, zápalu alebo reumatizmu akéhokoľvek druhu pri užívaní tablet Anopyrinu 30 mg hrozia astmatické záchvaty (tzv. neznášanlivosť analgetik/analgetická astma). Títo pacienti sa pred užitím lieku Anopyrin 30 mg majú poradiť s lekárom. To isté platí pre pacientov, ktorí reagujú precitliveno (alergicky), napr. kožnými reakciami, svrbením, žihľavkou na iné látky.

Pri užívaní tablet Anopyrinu 30 mg pred operačnými výkonmi sa treba poradiť s lekárom alebo zubným lekárom, prípadne ich informovať.

Ak máte nedostatok enzymu, ktorý sa nazýva glukózo-6-fosfát dehydrogenáza, musíte tento liek užívať len pod prísnym lekárskym dohľadom kvôli riziku hemolýzy (rozpad červených krviniek).

Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú užívať dlhší čas alebo vo vyšších dávkach bez konzultácie s lekárom.

### **Deti a dospievajúci**

Anopyrin 30 mg nie je určený na liečbu detí a dospievajúcich s horúčkovitými ochoreniami. Ak pri týchto ochoreniah deti a dospievajúci užívali daný liek a dôjde k dlhotrvajúcemu vracaniu, môže to byť známka Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, ale život ohrozujúceho ochorenia, ktoré bezpodmienečne vyžaduje urýchlenú lekársku pomoc.

### **Iné lieky a Anopyrin 30 mg**

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri užívaní Anopyrinu 30 mg sa zosilňujú/zvyšujú:

- účinky liekov spojených s rizikom krvácania, napr. warfarín, heparín, klopídogrel, tiklopídín (na riedenie krvi/prevencia tvorby krvných zrazenín);
- riziká žalúdočných alebo črevných krvácaní pri súčasnej liečbe kortikoidmi (lieky podobné hormónom kôry nadobličiek) alebo pri súbežnom požívaní alkoholu;
- účinky niektorých liekov užívaných na liečbu cukrovky (perorálnych antidiabetík zo skupiny derivátov sulfonylmočoviny);
- žiaduce i nežiaduce účinky metotrexátu [liečiva užívaného k liečbe lupienky (psoriázy), určitého ochorenia kĺbov (reumatoidná artritída) a niektorých nádorových ochorení];

- množstvo (koncentráciu) niektorých súbežne užívaných liečiv (digoxínu, barbiturátov alebo lítia) v krvi;
- žiaduce i nežiaduce účinky určitých liečiv proti bolesti alebo zápalu (nesteroidových analgetík/antiflogistík) a všeobecne všetkých liečiv užívaných na liečbu reumatických ochorení;
- účinky určitých liečiv užívaných na liečbu infekčných ochorení [sulfónamidy a kombinácie obsahujúce sulfónamidy, ako napr. kotrimoxazol (kombinácia sulfametoxazolu a trimetoprimu)];
- účinky trijódtyronínu (liotyronínu), čo je liečivo užívané na liečbu nedostatočnej činnosti štítnej žľazy;
- účinky kyseliny valproovej [liečiva proti záchvatovým (epileptickým) ochoreniam];
- účinky levotyroxínu (používa sa na liečbu porúch štítnej žľazy).

Anopyrin 30 mg oslabuje účinky:

- určitých liečiv vyvolávajúcich zvýšené vylučovanie moču [tzv. antagonistov aldosterónu (spironolaktónu a kanrenoátu) a tzv. kľučkových diuretík (napr. furosemidu)];
- antihypertenzív (liečiv užívaných na zníženie chorobne zvýšeného krvného tlaku);
- liečiv zvyšujúcich vylučovanie kyseliny močovej z tela (napr. probenecidu, sulfinpyrazónu).

Liečivo metamizol môže pri súbežnom užívaní s Anopyrinom 30 mg znížiť jeho účinok na agregáciu (zhlukovanie) krvných doštíčiek. Preto ak užívate liek obsahujúci liečivo metamizol, povedzte to svojmu lekárovi.

Liečivo acetazolamid, ktoré sa používa v liečbe glaukomu (zelený zákal), môže pri súbežnom užívaní s Anopyrinom 30 mg zvyšovať riziko metabolickej acidózy. Preto ak užívate liek obsahujúci liečivo acetazolamid, povedzte to svojmu lekárovi.

Liečivo tenofovir (používa sa na liečbu infekcie HIV alebo chronickej hepatitídy typu B) môže pri súbežnom užívaní s nesteroidovými protizápalovými liekmi zvýšiť riziko zlyhania obličiek.

Liečivo nikorandil (používa sa na liečbu pri bolesti na hrudníku (angina pectoris)) môže pri súbežnom užívaní s nesteroidovými protizápalovými liekmi zvýšiť riziko ľažkých komplikácií ako vredy žalúdka alebo črev, prederavenie a krvácanie.

#### Očkovanie proti ovčím kiahňam (varicella)

Užívanie Anopyrinu 30 mg sa neodporúča po dobu šiestich týždňov od očkovania vakcínou proti ovčím kiahňam (varicella). Po použití salicylátov počas infekcie vírusom ovčích kiahní sa vyskytli prípady Reyovho syndrómu (veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň).

Anopyrin 30 mg neužívajte súbežne s niektorým z vyššie uvedených liečiv, ak vám to lekár výslovne neodporučil.

#### **Anopyrin 30 mg, jedlo a nápoje a alkohol**

Pri užívaní tablet Anopyrinu 30 mg nie je vhodné piť nápoje s obsahom alkoholu. Pitie alkoholu v priebehu liečby môže zvýšiť riziko krvácania z tráviaceho traktu alebo poškodenia tráviaceho traktu.

#### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak pri užívaní tablet Anopyrinu 30 mg zistíte, že ste otehotneli, informujte o tom lekára.

Ak počas tehotenstva pokračujete alebo začíname s liečbou kyselinou acetylsalicylovou podľa pokynov lekára, užívajte kyselinu acetylsalicylovú podľa odporúčaní lekára a neužívajte vyššiu dávku, než je odporúčaná.

#### **Tehotenstvo – prvý a druhý trimester**

Počas prvých (šiestich mesiacov) tehotenstva sa nesmie liek podávať, ak to nie je akútne nevyhnutné a ak vám to neodporučí lekár. Ak sa však zo závažných dôvodov liek podá ženám, ktoré chcú

otehotniet' alebo sú v prvej a druhej tretine tehotenstva, musí byť podávaná dávka čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia. Ak sa kyselina acetylsalicylová užíva viac ako niekoľko dní od 20. týždňa tehotenstva, môže spôsobiť problémy s obličkami u nenaisteného dieťaťa, čo môže viest' k nízkym hladinám plodovej vody obklopujúcej dieťa (oligohydramnión) alebo k zúženiu krvnej cievky (ductus arteriosus) v srdci dieťaťa. Ak potrebujete liečbu dlhšie ako niekoľko dní, lekár vám môže odporučiť dodatočné monitorovanie.

### **Tehotenstvo – posledný trimester**

Neužívajte kyselinu acetylsalicylovú v dávkach vyšších ako 100 mg denne, ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť vaše nenaistené dieťa alebo spôsobiť problémy pri pôrode. U nenaisteného dieťaťa môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom. Môže to ovplyvniť tendenciu krvácania u vás a väčšo dieťaťa a spôsobiť, že pôrod bude neskorší alebo dlhší, než sa očakávalo.

Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú v nízkych dávkach (do a vrátane 100 mg denne), potrebujete prísny dohľad pri pôrode podľa odporúčaní lekára.

Liečivo kyselina acetylsalicylová a jej metabolity (látky vzniknuté v dôsledku jej látkovej premeny v tele) v malých množstvách prechádzajú do materského mlieka. Ked'že doteraz neboli hlásené škodlivé účinky na dojčiatá, pri dennej dávke do 150 mg spravidla nie je nutné ukončiť dojčenie. Ak žena užíva vyššie denné dávky (viac než 150 mg), má prestať dojčiť.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viest' vozidlá a obsluhovať stroje.

## **3. Ako užívať Anopyrin 30 mg**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nasledujúce údaje platia, ak vám lekár Anopyrin 30 mg nepredpísal inak. Dodržujte, prosím, predpísané použitie, inak by liek nemohol správne pôsobiť.

Na základe väčšo zdravotného stavu vám váš lekár určí dávku a príslušný počet tablet Anopyrinu 30 mg.

### **Koľko tablet Anopyrinu 30 mg máte užívať a ako často**

- Pri nestabilnej angíne pektoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou prieťoku krvi srdcovými vencovitými tepnami):  
Používa sa denné dávkovanie medzi 75 a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na základe lepšej znášanlivosti je odporúčaná denná dávka 3 tablety Anopyrinu 30 mg (čo zodpovedá 90 mg kyseliny acetylsalicylovej).
- Na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvnenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá:  
Liečbu začíname jednorazovou dávkou 120 – 200 mg a pokračujeme v užívaní 60 – 100 mg denne.

Pre odporúčané dávky, ktoré sú vyššie ako 90 mg kyseliny acetylsalicylovej sú k dispozícii tablety Anopyrinu 100 mg.

Anopyrin 30 mg sa zvyčajne užíva raz denne, podľa možnosti vždy približne v tom istom čase dňa.

### **Ako a kedy máte užívať Anopyrin 30 mg**

Tablety užívajte podľa možnosti po jedle, prehltnite celé a zapite dostatočným množstvom tekutiny. Tablety neužívajte na lačný žalúdok.

### Ako dlho máte užívať Anopyrin 30 mg

Anopyrin 30 mg je určený na dlhodobé užívanie.

O dĺžke jeho užívania rozhoduje váš ošetrujúci lekár.

### Ak užijete viac Anopyrinu 30 mg, ako máte

Závraty a hučanie v ušiach môžu byť, najmä u detí a osôb vo vyššom a pokročilom veku, známkami závažnej otravy. Predávkovanie salicylátmi môže, najmä u mladších detí, spôsobiť tăžkú hypoglykémiu (príliš nízka hladina cukru v krvi) a potenciálne smrteľnú otravu.

Pri podozrení na predávkovanie Anopyrinom 30 mg ihneď vyhľadajte alebo zavolajte lekára. Ten podľa závažnosti predávkowania (otravy) rozhodne o potrebných opatreniach.

### Ak zabudnete užiť Anopyrin 30 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Pokračujte nasledujúcou dávkou bezo zmeny tak, ako vám ju predpísal váš lekár.

### Ak prestanete užívať Anopyrin 30 mg

Neukončujte, prosím, užívanie lieku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

#### **Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne:**

- vyrážka, žihľavka, svrbenie celého tela, náhly opuch okolo očí, pocit tlaku na hrudníku s tăžkosťami pri dýchaní alebo prehlitaní, zmodranie kože, nízky krvný tlak.
- čierna (dechtovitá) stolica (ktorá môže byť známkou závažného žalúdočného krvácania).

Nižšie uvedené možné vedľajšie účinky sú zoskupené podľa ich častosti výskytu:

#### **Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):**

- žalúdočné a črevné tăžkosti ako napr. bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie, hnačka, krvácanie do tráviacej sústavy.

#### **Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):**

- žalúdočné krvácanie, žalúdočný vred
- kožné reakcie.

#### **Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):**

- málokrvnosť (v dôsledku skrytých strát krvi zo žalúdka a čreva)
- reakcia z precitlivenosti napr. záchvaty dýchavičnosti (najmä u astmatikov), tăžkosti pri dýchaní alebo dýchavičnosť, veľmi závažná alergická reakcia (anafylaktoidná reakcia) a zvlášť závažné kožné reakcie.

#### **Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):**

- poruchy činnosti pečene a obličiek
- zníženie množstva glukózy v krvi (hypoglykémia).

#### **Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):**

- závraty a hučanie v ušiach (môžu byť, najmä u detí a osôb vo vyššom a pokročilom veku, známkami závažnej intoxikácie)
- prasknutie vredu a krvácanie v tráviacom trakte (bez predchádzajúcich príznakov), podráždenie alebo zápal žalúdka, črev alebo pažeráka, vred hrubého alebo tenkého čreva, prederavenie čreva, náhly zápal pankreasu

- poškodenie pečene
- zmeny vo výsledkoch krvných testov: zvýšenie pečeňových enzýmov
- vnútrolebkové krvácanie, ktoré môže byť, najmä u starších ľudí, smrteľné
- opuch pľúc (súvisiaci s reakciou z precitlivenosti v dôsledku dlhodobého užívania kyseliny acetylsalicylovej)
- poruchy krvi (znižený počet krvných doštičiek; chudokrvnosť následkom rozpadu červených krviniek u pacientov s nedostatkom enzymu nazývaného glukózo-6-fosfát dehydrogenázy; pokles počtu určitých typov krviniek: pancytopenia, bacytopenia, aplastická anémia, agranulocytóza, neutropénia, leukopénia; zlyhanie kostnej drene)
- krvácanie (môže byť smrteľné)
- zápal ciev vrátane tzv. Henoch-Schönleinovej purpury (zápal malých krvných ciev - kapilár, zvyčajne postihuje cievy v koži, čreve a v obličkách)
- Kounisov syndróm (život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriehodnosťou vencových tepien srdca) v súvislosti s alergickou reakciou kvôli prítomnosti kyseliny acetylsalicylovej
- zlyhanie obličiek
- chronický zápal pečene
- fixný výsev na koži
- prítomnosť krvi v ejakuláte (hematospermia)
- opuch - pri vyšších (protizápalových) dávkach ASA.

Kyselina acetylsalicylová v nízkom dávkovaní obmedzuje vylučovanie kyseliny močovej. U pacientov náhylných na dnu to podľa okolností môže vyvolať jej záchvat.

#### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvej vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

#### **5. Ako uchovávať Anopyrin 30 mg**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

#### **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

##### **Čo Anopyrin 30 mg obsahuje**

Liečivo je 30 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Pomocné látky sú uhličitan vápenatý, glycín, kukuričný škrob, mastenec, mikrokryštalická celulóza.

##### **Ako vyzerá Anopyrin 30 mg a obsah balenia**

Biele mramorované okrúhle tablety so skosenými hranami s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane s vyrazeným označením 30.

*Obsah balenia:* 20 tablet, 50 tablet

##### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a. s.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika

Výrobca:  
S.C. ZENTIVA S.A.  
50 Theodor Pallady Blvd., district 3  
032266 Bukurešť  
Rumunsko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2025.**