

UPOZORNENIE

Možnosť namerania nesprávnych hodnôt glukózy v krvi

Meno pacienta

POUŽÍVAJTE IBA glukometre a testovacie prúžky, ktoré sú špecifické na glukózu. Tieto metódy sa bežne používajú v biochemických laboratóriách. Za účelom zistenia metódy použitej na vyhodnotenie nameraných výsledkov kontaktujte výrobcu glukometrov a testovacích prúžkov.

NEPOUŽÍVAJTE glukometre a testovacie prúžky na báze pyrochinolínchinón glukózodehydrogenázy (GDH-PQQ) alebo glukózového farbiva – oxidoreduktázy. Okrem toho nepoužívajte glukometre a testovacie prúžky, ktoré používajú metódu glukózovej dehydrogenázy s flavín-adenín-dinukleotidom (GDH-FAD). U pacientov, ktorí používajú **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %), môže použitie týchto metód viesť k falošne zvýšeným hodnotám glukózy následkom interferencie maltózy. Takýto výsledok môže zamaskovať skutočnú hypoglykémiu alebo môže viesť k nesprávnemu stanoveniu hyperglykémie, čo môže mať za následok ohrozenie života pacienta.

Používa **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %),
roztok na peritoneálnu dialýzu

Vantive

SK-RC21-240003 (V1.0) Dátum schválenia: November 2024

Vantive a **EXTRANEAL** sú ochranné známky Vantive Health LLC alebo jej dcérskych spoločností.