

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Apixaban Teva Slovakia (apixabán) je perorálne antikoagulancium, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- Apixaban Teva Slovakia môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácaných príhod sa má liečba okamžite ukončiť.
- Liečba liekom Apixaban Teva Slovakia nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Vo výnimočných situáciách môže byť užitočný kalibrovaný kvantitatívny antifaktor Xa test, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) - pozri SPC.

- K dispozícii je liečivo na zvrátenie účinku apixabánu proti faktoru Xa.

teva

212154_s1

Apixaban Teva Slovakia 2,5 mg (apixabán)

Karta pre pacienta

Túto kartu noste vždy so sebou.

Ukážte túto kartu svojmu lekárnikovi, zubárovi alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vás lieči.

Užívam antikoagulačnú liečbu, Apixaban Teva Slovakia (apixabán), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.



Vyplňte nasledujúce časti alebo o to požiadajte svojho lekára.

Meno:

Dátum narodenia:

Indikácia:

Dávka: mg dvakrát denne

Meno lekára:

Telefónne číslo lekára:

Informácie pre pacientov

- Apixaban Teva Slovakia užívajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete a pokračujte podľa predpísanej schémy.
- Neprestaňte užívať Apixaban Teva Slovakia, ak sa najprv neporadíte so svojim lekárom, pretože ste vystavený riziku cievnej mozgovej príhody a iných komplikácií.
- Apixaban Teva Slovakia pomáha zriediť vašu krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.

- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.
- Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**
- Ak potrebujete chirurgický zákrok alebo akýkoľvek invazívny zákrok, informujte ošetrojúceho lekára, že užívate Apixaban Teva Slovakia.