

Apixabán

Karta pre pacienta

Túto kartu noste vždy so sebou.

Ukážte túto kartu svojmu lekárnikovi, zubárovi alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vás lieči.

Užívam antikoagulančnú liečbu, liek Apixaban STADA 5 mg (apixabán), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Vyplňte nasledujúce časti alebo o to požiadajte svojho lekára:

Meno:

Dátum narodenia:

Indikácia:

Dávka mg dvakrát denne

Meno lekára:

Telefónne číslo lekára:

Informácie pre pacientov

- Apixaban STADA užívajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete a pokračujte podľa predpísanej schémy.
- Neprestaňte užívať Apixaban STADA, ak sa najprv neporadíte so svojím lekárom, pretože ste vystavený riziku mozgovej príhody a iných komplikácií.
- Apixaban STADA pomáha zriediť vašu krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.

- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.
- Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**
- Ak potrebujete operáciu alebo akýkoľvek invazívny zákrok, informujte ošetrojúceho lekára, že užívate Apixaban STADA.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Apixaban STADA (apixabán) je perorálne antikoagulancium, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- Apixaban STADA môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácaných príhod sa má liečba okamžite zastaviť.
- Liečba Apixabanom STADA si nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Vo výnimočných situáciách môže byť užitočný kalibrovaný kvantitatívny antifaktor Xa test, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) - pozri SPC.
- K dispozícii je liečivo na zvrátenie účinku apixabánu proti faktoru Xa.