

## Písomná informácia pre používateľa

### Fexofenadine Viatris 180 mg filmom obalené tablety

fexofenadínium-chlorid

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

#### **V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Fexofenadine Viatris a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Fexofenadine Viatris
3. Ako užívať Fexofenadine Viatris
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Fexofenadine Viatris
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Fexofenadine Viatris a na čo sa používa**

Fexofenadine Viatris obsahuje fexofenadínium-chlorid, čo je antihistaminikum.

Fexofenadine Viatris 180 mg sa používa u dospelých a dospevajúcich vo veku 12 rokov a starších na zmiernenie príznakov, ktoré sa vyskytujú pri dlhodobých alergických kožných reakciách (chronická idiopatická urticária), ako je svrbenie, opuch a vyrážky.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Fexofenadine Viatris**

##### **Neužívajte Fexofenadine Viatris**

- ak ste alergický na fexofenadínium-chlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

##### **Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Fexofenadine Viatris, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

- máte problémy s pečeňou alebo obličkami
- máte alebo ste niekedy mali ochorenie srdca, pretože tento druh lieku môže viesť k rýchlemu alebo nepravidelnému srdcovému tepu
- ste starší

Ak sa vás niečo z uvedeného týka alebo ak si nie ste istý, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Fexofenadine Viatris.

#### **Deti**

Fexofenadine Viatris nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

#### **Iné lieky a Fexofenadine Viatris**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate apalutamid (liek na liečbu rakoviny prostaty), pretože účinok fexofenadínu môže byť znížený.

Lieky na poruchy trávenia obsahujúce hliník a horčík môžu ovplyvniť účinok lieku Fexofenadine Viatris znížením množstva absorbovaného lieku. Odporúča sa dodržať aspoň dvojhodinový časový odstup medzi užitím lieku Fexofenadine Viatris a liekom na poruchy trávenia.

#### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte Fexofenadine Viatris ak ste tehotná, pokial' to nie je nevyhnutné. Fexofenadine Viatris sa neodporúča užívať počas dojčenia.

#### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Nie je pravdepodobné, že Fexofenadine Viatris ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov však máte skontrolovať, či vám tieto tablety nespôsobujú ospalosť alebo závrat.

#### **Fexofenadine Viatris obsahuje laktózu**

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

#### **Fexofenadine Viatris obsahuje sodík**

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete , t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

### **3. Ako užívať Fexofenadine Viatris**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### **Dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie**

Odporúčaná dávka je jedna tableta (180 mg) denne.

Tabletu užite pred jedlom a zapite vodou.

Tento liek začne zmierňovať príznaky do 1 hodiny a jeho účinok trvá 24 hodín.

#### **Ak užijete viac lieku Fexofenadine Viatris, ako máte**

Ak ste užili príliš veľa tablet, ihned kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť. Príznaky predávkovania u dospelých sú závrat, ospalosť, pocit únavy a sucho v ústach.

#### **Ak zabudnete užiť Fexofenadine Viatris**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase, ako vám predpísal váš lekár.

**Užite ďalšiu dávku podľa plánu.**

**Ak prestanete užívať Fexofenadine Viatris**

Ak prestanete užívať Fexofenadine Viatris skôr, ako bolo plánované, môžu sa vám príznaky vrátiť.

Ak máte akokoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

**4. Možné vedľajšie účinky**

**Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.**

**Okamžite oznámite svojmu lekárovi a prestaňte užívať Fexofenadine Viatris, ak sa u vás vyskytne:**

- opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla a t'ažkosti s dýchaním, pretože to môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie.

Nasledovné vedľajšie účinky boli hlásené v klinických skúšaniahach s podobným výskytom ako u pacientov, ktorí nedostávali liek (placebo).

**Časté vedľajšie účinky** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- bolesť hlavy
- ospalomst'
- pocit nevoľnosti (nauzea)
- závrat

**Menej časté vedľajšie účinky** (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- pocit únavy/ospalomstí

**Ďalšie vedľajšie účinky** (frekvencia neznáma: z dostupných údajov), ktoré sa môžu vyskytnúť, sú:

- t'ažkosti so spánkom (nespavosť)
- poruchy spánku
- zlé sny
- nervozita
- rýchly alebo nepravidelný tep srdca
- hnačka
- kožná vyrážka a svrbenie
- žihľavka
- závažné alergické reakcie, ktoré môžu spôsobiť opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, sčervenanie, tlak na hrudi a t'ažkosti s dýchaním
- rozmazané videnie

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotní sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

**5. Ako uchovávať Fexofenadine Viatris**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri a fláši po EXP.  
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.  
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo Fexofenadine Viatris obsahuje

- Liečivo je fexofenadínium-chlorid. Každá tableta obsahuje 180 mg fexofenadínium-chloridu.
- Ďalšie zložky sú:
  - Jadro tablety: monohydrát laktózy, hydroxypropylcelulóza, čiastočne substituovaná (E463), predželatínovaný škrob, koloidný oxid kremičitý, bezvodý, mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ kroskarmelózy (E468) a stearát horečnatý.
  - Filmotvorný obal: hypromelóza, povidón, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), makrogol a koloidný oxid kremičitý, bezvodý.

### Ako vyzerá Fexofenadine Viatris a obsah balenia

Filmom obalené tablety v tvare kapsuly broskyňovej farby s rozmermi 17,1 mm x 7,6 mm s vyrazeným „180“ na jednej strane a „FX“ na druhej strane.

Dostupné v:

Blistrové balenie: 10, 15, 20, 30 alebo 100 filmom obalených tablet

HDPE fláše: 500 alebo 1 000 filmom obalených tablet

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

#### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Viatris Limited

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

DUBLIN

Írsko

#### Výrobca

Mylan Hungary Kft.

Mylan Utca 1

Komarom, 2900

Maďarsko

### Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Dánsko: Fexofenadine Viatris

Francúzsko: FEXOFENADINE VIATRIS SANTE 180 mg, comprimé pelliculé

Holandsko: Fexofenadine HCl Viatris 180 mg, filmomhulde tabletten

Island: Fexofenadine Viatris

Portugalsko: Fexofenadina Viatris

Slovenská republika: Fexofenadine Viatris 180 mg

Švédsko: Fexofenadine Viatris

Taliansko: Fexofenadina Mylan Italia

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 03/2025 .**