

Písomná informácia pre používateľa

neo-angin šalvia
1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg
tvrdé pastilky

2,4-dichlórbenzylalkohol, amylmetakrezol, levomentol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 – 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je neo-angin šalvia a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin šalvia
3. Ako užívať neo-angin šalvia
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať neo-angin šalvia
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je neo-angin šalvia a na čo sa používa

neo-angin šalvia je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.

Dospelí, dospelievajúci a deti vo veku od šesť rokov môžu používať neo-angin šalvia na podpornú liečbu pri zápaloch sliznice dutiny ústnej v oblasti hltanu, ktoré sprevádzajú typické príznaky ako bolesť hrdla, sčervenanie alebo opuch.

Ak sa do 3 – 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin šalvia

Nepoužívajte neo-angin šalvia

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- neo-angin šalvia nie je vhodný pre deti vo veku do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať neo-angin šalvia, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

Deti

Nedávajte neo-angin šalvia deťom vo veku do 6 rokov. Aby sa deti mohli liečiť neo-anginom šalvia, musia byť schopné kontrolovať cmúľať tvrdé pastilky.

Iné lieky a neo-angin šalvia

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je známe.

neo-angin šalvia a jedlo a nápoje

neo-angin šalvia sa môže používať kedykoľvek počas dňa, nezávisle od jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Vzhľadom na nedostatok informácií sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva neodporúča.

Dojčenie

Vzhľadom na nedostatok informácií sa neo-angin šalvia nemá užívať počas dojčenia.

Plodnosť

Neuskutočnili sa žiadne štúdie na hodnotenie účinkov na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

neo-angin šalvia obsahuje izomalt a košenilovú červenú A (E124)

neo-angin šalvia obsahuje 2,58 g izomaltu, ako náhradu cukru v jednej tvrdej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ). Má sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku. Izomalt môže mať v denných dávkach vyšších ako 10 g mierny preháňací účinok.

neo-angin šalvia obsahuje farbivo košenilovú červenú A (E124), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

Farbivo v tomto lieku obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tvrdej pastilke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať neo-angin šalvia

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riadte sa týmito pokynmi:

Dospelí, dospelievajúci a deti vo veku od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Ak sa do 3 – 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac neo-anginu šalvia, ako máte

Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Vo veľmi nepravdepodobnom prípade predávkovania sa môžu nižšie uvedené nežiaduce účinky zosilniť. V takom prípade sa odporúča liečba týchto príznakov.

Ak zabudnete užiť neo-angin šalvia

Ak ste zabudli užiť neo-angin šalvia alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať neo-angin šalvia a kontaktujte svojho lekára:

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice ako sú tráviace ťažkosti (dyspepsia), nevoľnosť.

Neznáme (častotť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- alergické reakcie ako sú opuch úst, jazyka a pier, vyrážka.
- dýchavičnosť a kašeľ.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať neo-angin šalvia

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin šalvia obsahuje

Liečivá sú: 2,4-dichlórbenzylalkohol, amylmetakrezol, levomentol.

Jedna tvrdá pastilka obsahuje 1,2 mg 2,4-dichlórbenzylalkoholu, 0,6 mg amylmetakrezolu, 5,9 mg levomentolu.

Ďalšie zložky sú: silica mäty piepornej, izomalt, kyselina vínna, šalviová silica, košenilová červená A (E124) obsahujúca sodík, chinolínová žltá (E104) obsahujúca sodík, patentná modrá V (E131) obsahujúca sodík.

Ako vyzerá neo-angin šalvia a obsah balenia

neo-angin šalvia sú okrúhle, medovo zafarbené, obojstranne vypuklé, čiastočne priehľadné, tvrdé pastilky.

Obsah balenia: 24 tvrdých pastiliek v blistri.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlín
Nemecko

Výrobca:
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12777 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2025 .