

Písomná informácia pre používateľa

Strevox so sisymbriom mäkké pastilky 10 mg

Suchý extrakt hľavníka lekárskeho
(*Sisymbrium officinale herba extractum siccum*)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek pešne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak príznaky pretrvávajú počas užívania lieku alebo ak sa objavujú nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa, je potrebné poradiť sa s lekárom.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Strevox so sisymbriom a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strevox so sisymbriom
3. Ako užívať Strevox so sisymbriom
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Strevox so sisymbriom
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strevox so sisymbriom a na čo sa používa

Strevox so sisymbriom je tradičný rastlinný liek na zmiernenie príznakov podráždenia hrdla, ako je chraptot a suchý kašeľ.

Strevox so sisymbriom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

Je určený dospelým, dospievajúcim a deťom od 6 rokov.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strevox so sisymbriom

Nepoužívajte Strevox so sisymbriom

- ak ste alergický na vňat hľavníka, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak príznaky počas užívania lieku pretrvávajú alebo ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa, musíte sa poradiť s lekárom.

Ak sa objaví dýchavičnosť, horúčka alebo hnisavý hlien, treba okamžite vyhľadať lekára.

Tento liek obsahuje vôňu s obsahom cinnamaldehydu.

Cinnamaldehyd môže vyvolať alergické reakcie.

Deti

Tento liek sa nesmie používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože existuje riziko prehltnutia pastilky a kvôli nedostatku adekvátnych údajov.

Iné lieky a Strevox so sisymbriom

Nebolo hlásené, že Strevox so sisymbriom ovplyvňuje účinky iných liekov.

Neboli vykonané žiadne interakčné štúdie (štúdie vzájomného pôsobenia).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Strevox so sisymbriom s jedlom, nápojmi a alkoholom

Neočakáva sa žiadna interakcia (vzájomné pôsobenie), nie sú však k dispozícii žiadne údaje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Bezpečnosť počas tehotenstva nebola stanovená. Vzhľadom na nedostatok dostatočných údajov sa použitie počas tehotenstva neodporúča.

Dojčenie

Nie je známe, či sa liečivo alebo jej metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko pre dojčeného novorodenca/dieťa nemožno vylúčiť. Strevox so sisymbriom sa preto nemá používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strevox so sisymbriom obsahuje maltitol a sorbitol

Liek obsahuje 441 mg maltitolu a 100 mg tekutého sorbitolu v každej pastilke. Sorbitol je zdrojom fruktózy. Ak vám váš lekár povedal, že máte (alebo vaše dieťa) neznášanlivosť niektorých cukrov alebo ak vám bola diagnostikovaná dedičná intolerancia fruktózy (HFI), zriedkavá genetická porucha, pri ktorej človek nevie rozkladať fruktózu, poraďte sa so svojím lekárom. predtým, ako vy (alebo vaše dieťa) užijete alebo dostanete tento liek.

3. Ako užívať Strevox so sisymbriom

Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnou informáciou pre používateľa alebo podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Odporúčaná dávka je:

Dospievajúci od 12 rokov, dospelí a staršie osoby: jedna pastilka 10 až 12 krát denne.

Použitie u detí

Deti od 6 do 11 rokov: jedna pastilka 5 až 6 krát denne.

Užívanie lieku Strevox so sisymbriom u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča (pozri časť 2 pod „Deti“).

Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na určenie odporúčanej dávky pre pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek. Preto sa použitie pastilky s obsahom huľavníka lekárskeho u týchto skupín pacientov neodporúča.

Spôsob podávania

Nechajte pastilku rozpustiť v ústach bez žuvania.

Dĺžka liečby

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára (pozrite tiež časť Upozornenia a opatrenia).

Ak užijete viac Strevoxu so sisymbriom ako máte

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Ak náhodou užijete dvojnásobok alebo trojnásobok zamýšľanej dávky Strevoxu so sisymbriom, vo všeobecnosti sa nevyskytnú žiadne negatívne indikácie alebo prejavy. Pokračujte v užívaní tohto lieku tak, ako je uvedené v dávkovaní alebo ako vám povedal váš lekár. Ak užijete podstatne vyššiu dávku ako je odporúčaná dávka opísaná vyššie, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak zabudnete užiť Strevox so sisymbriom

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Pokračujte v liečbe podľa odporúčaní v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strevox so sisymbriom

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nevyhadzujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strevox so sisymbriom obsahuje

- Jedna pastilka obsahuje 10 mg suchého extraktu *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., herba (6-8:1), extrakčné rozpúšťadlo: voda.
- Ďalšími zložkami sú: tekutý maltitol (E 965), akácia (E 414), tekutý sorbitol, (nekryštalizujúci) (E 420), triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom, sukralóza (E 955), levomentol, kukuričný škrob, čistená voda maltodextrín, aróma med-citrón-verbena (obsahuje cinnamaldehyd).

Jedna pastilka obsahuje 100 mg sorbitolu.

Ako vyzerá Strevox so sisymbriom a obsah balenia

Strevox so sisymbriom sú hnedasté, okrúhle pastilky s priemerom 16 mm v Al /PVC/PE/PVDC blistroch.

Jedno balenie obsahuje 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40 alebo 48 mäkkých pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca:

BOLDER Arzneimittel GmbH & Co. KG, Rheinische Allee 11, 50858 Köln, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Belgicko	Streptuss Honing & Tijm siroop Streptuss Miel & Thym sirop Streptuss Honig & Thymian Sirup*
Bulharsko	StrepTuss Active Naturals Sisymbrium 10 mg lozenges СтрепТусс Актив Нечъралс Лечебна Мъдрица 10 mg таблетки за смучене
Dánsko	StrepHost*
Estónsko	Streptusol
Chorvátsko	Streptusan divlja gorušica meke pastile
Česká republika	Strevox se sisymbriem mäkké pastilky
Fínsko	StrepCough*
Francúzsko	STREPSILS TOUX SECHE SISYMBRIUM 10 mg, pastille
Nemecko	Dobendan Husten & Halsreizung Wegrauke
Holandsko	Streptuss honing & tijm siroop*
Nórsko	Strepsolve*
Grécko	StrepCough Sissibrium*
Maďarsko	StrepTuss 10 mg pasztilla
Taliansko	Benactuss Tosse secca e Gola Irritata*
Island	StrepHost*
Litva	Streptusol
Lotyšsko	Streptusol pastilas
Poľsko	Strepsils Natur kaszel suchy i chrypka
Portugalsko	Streptosse Active Naturals Tosse Seca pastilhas*
Rumunsko	StrepTuss Brâncuță 10 mg pastile
Slovenská republika	Strevox so sisymbriom mäkké pastilky
Slovinsko	Navadni dišnik Streptusan mehke pastile
Švédsko	StrepCough
Španielsko	Streptos erísimo 10 mg pastillas para chupar

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 11/2025.