

Intravenózne železo sa používa na liečbu nedostatku železa v prípade, keď sú perorálne lieky neúčinné alebo sa nedajú použiť.

Intravenózne železo môže spôsobiť alergické reakcie a musia ho podávať osoby vyškolené na vyhodnotenie a zvládnutie týchto reakcií.

U niektorých pacientov sa tieto alergické reakcie môžu stať závažnými alebo život ohrozujúcimi (známymi ako anafylaktické reakcie) a môžu spôsobiť problémy so srdcom a krvným tlakom a / alebo spôsobiť mdloby alebo stratu vedomia.

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia vigilancie

Kvetná 11, 825 08 Bratislava

tel.: + 421 2 507 01 206

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Intravenózne železo

Dôležité informácie pre pacientov o možnom riziku závažných alergických reakcií spôsobených intravenóznym železom (lieky podávané ihlou do žily)

Tieto informácie boli pripravené a poskytnuté od výrobcov intravenózneho železa v Európe



Pozorne si prečítajte tento materiál a prediskutujte akékoľvek otázky, ktoré máte, so svojim lekárom. Môžete mať zvýšené riziko alergickej reakcie, ak máte:

- známe alergie vrátane alergií na lieky
- závažnú astmu, ekzém alebo iné alergie (napríklad prach, peľ, srst domácich zvierat) alebo
- imunitné alebo zápalové ochorenia (napr. reumatoidná artritída, lupus erythematosus a iné)

Ak máte niektoré z týchto alergií alebo ochorení, mali by ste o tom povedať svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre predtým, ako vám predpíšu alebo podajú intravenózne železo.

Váš lekár rozhodne, či je pre vás liečba väčší prínos ako riziko.

Nemalo by vám byť predpísané alebo podávané intravenózne železo:

- ak ste alergický (precitlivený) na liek alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
- ak ste v minulosti prekonali závažné alergické (reakcie z precitlivenosti) reakcie na inú intravenóznú liečbu železom*
- ak je preukázaný nadbytok železa (príliš veľa železa vo vašom tele)
- vaša anémia nie je spôsobená nedostatkom železa

Mali by ste povedať svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre predtým, ako vám predpíšu/podajú intravenózne železo, ak máte niektorú z týchto alergií alebo ochorení.

***Je dôležité vedieť, že reakcia sa môže vyskytnúť, aj keď ste v minulosti nemali žiadne problémy s intravenóznym železom.**

Gravidita: intravenózne železo sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak, ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, je dôležité prediskutovať to so svojim lekárom.

Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak:

- máte akékoľvek prejavy alebo príznaky alergickej reakcie počas liečby intravenóznym železom alebo krátko po nej

Napríklad: žihľavka alebo vyrážka, svrbenie, závraty, točenie hlavy, opuch pier, jazyka, hrdla alebo tela, ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť alebo sipot.

- Váš lekár alebo zdravotná sestra vás budú sledovať na prejavy a príznaky alergickej reakcie najmenej 30 minút po každom podaní intravenózneho železa.