

**Písomná informácia pre používateľa
NiQuitin Mini 1,5 mg, tvrdé pastilky**

nikotín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je NiQuitin Mini 1,5 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete NiQuitin Mini 1,5 mg
3. Ako užívať NiQuitin Mini 1,5 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať NiQuitin Mini 1,5 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je NiQuitin Mini 1,5 mg a na čo sa používa

NiQuitin Mini 1,5 mg je liek na odvykanie od fajčenia. Tento typ liečby sa nazýva nikotínová substitučná liečba (Nicotine Replacement Therapy – NRT).

Toto balenie obsahuje pastilky NiQuitin Mini 1,5 mg, ktoré sú určené fajčiarom, ktorí vyfajčia *20 alebo menej cigariet denne*.

Pastilky vám môžu pomôcť prestať fajčiť buď ihneď, alebo postupne obmedzovať fajčenie predtým, než prestanete fajčiť úplne. Ak si myslíte, že ste schopní prestať fajčiť naraz, mali by ste to urobiť, zvyčajne je to to najlepšie. Ak si myslíte, že je to príliš veľká zmena, ako prvý krok môžete vyskúšať obmedziť počet cigariet, ktoré vyfajčíte predtým, než prestanete fajčiť úplne NiQuitin Mini 1,5 mg sa môže použiť spoločne s náplastami NiQuitin CLEAR, pokiaľ došlo k relapsu po pokuse o ukončenie liečby pomocou NRT, ak jeden liek NiQuitin nestačí na zvládnutie túžby po cigarete alebo ak ste silný fajčiar (napr. fajčíte viac ako 10 cigariet denne). Pre ďalšie informácie pozri časť 3. Ako užívať NiQuitin Mini.

Práve nikotín v cigaretách môže na nich spôsobiť fyzickú závislosť.

NiQuitin Mini 1,5 mg vám pomôže prestať fajčiť tým, že nahradí časť nikotínu, ktorý získavate z cigariet, čím sa zmiernia niektoré nepríjemné príznaky, ktoré môžu fajčiari pociťovať, keď sa snažia prestať fajčiť, zmierňuje chuť na cigaretu a pomáha odolať nutkaniu fajčiť.

Keďže NRT NiQuitin Mini 1,5 mg neobsahuje decht ani kyslíčnik uhoľnatý a ďalšie toxíny z cigaretového dymu, nemá také zdravotné riziko, aké má fajčenie tabaku.

Niektorí ľudia sa obávajú, že potom čo prestanú fajčiť, by sa mohli stať závislými od nikotínu v NRT. To sa stáva veľmi zriedkavo a ak sa to stane, je to menej nebezpečné než pokračovať vo fajčení. Zbaviť sa tejto závislosti je oveľa jednoduchšie.

Vaša šanca prestať fajčiť sa zvýši, ak sa zúčastníte **podporného programu**. Pre bližšie informácie sa obráťte na svojho lekára.

Z fajčenia nevyplýva žiadny zdravotný prospech. Vždy je lepšie prestať fajčiť. NRT môže pomôcť. Vo všeobecnosti, akékoľvek nežiaduce účinky spojené so substitučnou liečbou ďaleko prevážia nebezpečenstvo fajčenia.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete NiQuitin Mini 1,5 mg

Neužívajte NiQuitin Mini 1,5 mg:

- ak ste alergický na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
- ak ste nefajčiar alebo ešte nemáte 12 rokov

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať NiQuitin Mini 1,5 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- **ak máte alebo ste nedávno mali srdcový záchvat alebo mozgovú príhodu, závažné arytmie, nestabilnú alebo zhoršujúcu sa angínu pectoris (bolesť na hrudníku).** V tom prípade by ste mali prestať fajčiť bez akejkoľvek nikotínovej substitučnej liečby (NRT), ak vám ju lekár neodporučí.
- **ak máte problémy so srdcom alebo krvným obehom vrátane srdcového zlyhania, stabilnej angíny pectoris, vysokého krvného tlaku alebo zúženia periférnych artérií.**
- **ak máte cukrovku.** Na začiatku užívania NiQuitin Mini by ste mali kontrolovať hladinu krvného cukru častejšie ako obvykle. Môže dôjsť ku zmene dávkovania inzulínu alebo niektorých ďalších liekov.
- ak ste v minulosti mali záchvaty (epilepsia).
- **ak ste niekedy mali alergické reakcie** spojené s opuchom pier, tváre a hrdla, alebo svrbivú kožnú vyrážku. Užívanie NRT môže niekedy takúto reakciu spustiť.
- ak máte problémy so srdcom, mali by ste sa pred použitím lieku NiQuitin Mini 1,5 mg v kombinácii s náplastami NiQuitin poradiť so svojím lekárom.
- **ak máte závažné alebo stredne závažné ochorenie pečene alebo závažné ochorenie obličiek,** pretože je pravdepodobné, že sa u vás prejavia nežiaduce účinky.
- **ak máte nekontrolovanú hypertyreózu** (hyperfunkciu štítnej žľazy) **alebo feochromocytóm** (nádor drene nadobličiek, ktorý ovplyvňuje krvný tlak), pretože nikotín môže prejavy týchto ochorení zhoršiť.
- **ak máte vredy žalúdka alebo dvanástnika alebo zápal pažeráka** (zažívacia trubica spojujúca ústnu dutinu so žalúdkom), pretože prehĺtanie nikotínu môže zhoršiť prejavy týchto ochorení. Nikotín môže tiež spôsobiť vredy v ústnej dutine. Pokiaľ sa tieto príznaky zhoršia, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom. V tom prípade by ste mohli užívať NRT vo forme náplastí.
- ak máte obavy zo závislosti alebo si myslíte, že ste sa stali závislými na tomto lieku.

Pred použitím prípravku NiQuitin Mini 1,5 mg sa poraďte so svojím lekárom, ak sa vás niečo z uvedeného týka.

Počas odvykania od fajčenia nezamieňajte pastilky NiQuitin Mini 1,5 mg za nikotínové žuvačky.

Deti (do 12 rokov)

Hladiny nikotínu v NRT nie sú vhodné pre deti do 12 rokov. Nikotín postihuje deti viac ako dospelých. U detí môže spôsobiť závažnú otravu, ktorá by mohla spôsobiť smrť. Je preto nevyhnutné, aby ste NiQuitin Mini 1,5 mg vždy držali mimo dohľadu a dosahu detí.

Iné lieky a NiQuitin Mini 1,5 mg

Informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste v nedávnom čase užívali.

Odvykanie od fajčenia môže ovplyvniť účinok niektorých ďalších liekov, ktoré súbežne užívate. Poradte sa so svojím lekárom, predtým ako začnete užívať NiQuitin Mini, či sa to týka liekov, ktoré užívate.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.

Fajčenie počas **tehotenstva** je spojené s rizikami pre dieťa ako je napr. spomalenie rastu plodu, predčasný pôrod alebo potrat. Prestať fajčiť je preto hlavným najčastejším opatrením pre vaše zdravie i zdravie vášho dieťaťa. Čím skôr prestanete, tým lepšie.

Ideálne je prestať fajčiť počas tehotenstva bez nikotínovej substitučnej liečby (NRT). Ak sa to nepodarilo, **lekár vám môže odporučiť substitučnú liečbu**, pretože riziká substitučnej liečby pre plod sú menšie než keď pokračujete vo fajčení. NRT by ste mali užívať čo najskôr počas tehotenstva a najlepšie iba 2 - 3 mesiace. Pamätajte si, že najdôležitejšie je prestať fajčiť.

Orálne NRT sú vhodnejšie než náplasti, pretože neposkytujú nikotín neustále. Náplasti však môžu byť vhodnejšie, ak máte pocit na vracanie alebo trpíte nevoľnosťou.

Pri dojení môže cigaretový dym spôsobovať dýchacie ťažkosti a iné problémy u dojčiat a u detí. Fajčenie by ste mali ukončiť najprv bez NRT. Ak sa to nepodarilo, lekár vám môže odporučiť NRT. Ak potrebujete na odvykanie od fajčenia užívať NRT, je množstvo nikotínu, ktoré môže vaše dieťa dostať pri tejto liečbe malé a je to pre dojča oveľa menej škodlivé ako pasívne fajčenie. Lieky, ako sú pastilky, môžu byť vhodnejšie ako náplasti, pretože nikotín nedostávajú nepretržite. Tiež je lepšie užívať liek NRT až tesne po dojení, aby dojča dostávalo čo najmenej nikotínu.

Neužívajte NiQuitin Mini v kombinácii s náplastami NiQuitin CLEAR ak ste tehotná alebo dojčíte, ak to lekár nepovažuje za potrebné pre zaistenie abstinencie. Je to preto, že táto kombinácia nebola testovaná u tehotných alebo dojčiacich žien.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky lieku NiQuitin Mini na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Odvykanie od fajčenia však môže spôsobiť zmeny v správaní, ktoré by vás mohli týmto spôsobom ovplyvniť.

NiQuitin Mini 1,5 mg obsahuje

Sodík - Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej pastilke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať NiQuitin Mini 1,5 mg

Postup substitučnej liečby závisí od toho, či pôjde o:

- a) ukončenie fajčenia naraz
- b) ukončenie fajčenia postupne
- c) kombináciu NiQuitinu Mini 1,5 mg s náplastami

Vždy užívajte NiQuitin Mini 1,5 mg presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára.

NiQuitin Mini 1,5 mg je určený pre fajčiarov, ktorí fajčia menej ako 20 cigariet denne.

Tento liek je určený na užitie v ústnej dutine. To znamená, že nikotín z pastiliek sa v ústach pomaly uvoľňuje a vstrebáva sa ústnou sliznicou do tela.

Vždy sa vkladá jedna pastilka NiQuitinu Mini 1,5 mg do úst a opakovane sa premiestňuje z jednej strany úst na druhú, až do úplného rozpustenia (asi 10 minút). Pastilky sa nesmú žuť alebo vcelku prehĺtať. Neužívajte viac ako 15 pastiliek denne. Ak by ste potrebovali užívať NiQuitin Mini dlhšie ako 9 mesiacov, mali by ste sa poradiť s lekárom.

a) Ukončenie fajčenia naraz

Dospelí (18 rokov a starší)

- Začnite s užívaním 8 až 12 pastiliek denne. Užite pastilku, kedykoľvek dostanete chuť si zafajčiť.
- Užívajte takto pastilky až 6 týždňov, potom postupne znižujte ich počet počas dňa.
- Keď vám budú stačiť 1 až 2 pastilky denne, môžete užívanie ukončiť. Ak po ukončení liečby nastane neodolateľná potreba fajčiť, je možné v tejto situácii znovu užiť pastilku.

b) Ukončenie fajčenia postupne

Dospelí (18 rokov a starší)

Keď nastane neodolateľná potreba fajčiť, použije sa namiesto cigarety NiQuitin Mini 1,5 mg, čo pomáha zvládnuť túto potrebu. Znížte čo najviac počet denne vyfajčených cigariet. Ak nedôjde po 6 týždňoch užívania pastiliek k zníženiu počtu vyfajčených cigariet, je potrebné sa poradiť s lekárom. Znižovanie počtu vyfajčených cigariet by malo viesť k úplnému zastaveniu fajčenia. O to by ste sa mali pokúsiť čo najskôr. Až sa počet cigariet zníži na úroveň, kedy môžete prestať fajčiť úplne, začnite postupovať podľa odstavca „Ukončenie fajčenia naraz“ uvedeného vyššie. Ak neprestanete fajčiť úplne počas 6 mesiacov, je potrebné sa poradiť s lekárom.

c) Kombinácia NiQuitinu Mini 1,5 mg s náplastami

Dospelí (od 18 rokov)

Samotné užívanie NiQuitin Mini 1,5 mg nie vždy postačuje na ukončenie fajčenia. Užívanie **NiQuitinu Mini 1,5 mg v rovnakom čase ako náplasti môže pomôcť** kontrolovať náhlu túžbu na cigaretu a zvýšiť pravdepodobnosť, že prestanete fajčiť, ako keby ste používali len NiQuitin Mini 1,5 mg.

Kombinácia NiQuitin Mini a NiQuitinových náplastí môže pomôcť:

- ak došlo k relapsu po pokuse o ukončenie liečby pomocou NRT
- ak jeden liek NiQuitin nestačí na to, aby ovládol túžbu na cigaretu
- ak ste silný fajčiar (napr. fajčíte 10 alebo viac cigariet denne)
- ak ste starší ako 18 rokov a platí niektorý z vyššie uvedených bodov

Postupujte v „krokoch“ s náplastami, ale užívajte liek NiQuitin Mini 1,5 mg, keď pocítite náhlu chuť na cigaretu - odporúča sa priemerne 5-6 pastiliek denne. Podrobnosti nájdete v tabuľkách 1 a 2 nižšie.

Pri súčasnom použití NiQuitin Mini 1,5 mg a náplastí:

- neužívajte viac ako 15 kusov NiQuitin Mini 1,5 mg za 24 hodín

Pre viac informácií čítajte príbalovú informáciu obdržanú s náplastami NiQuitin CLEAR.

Tabuľka 1: Kombinovaná liečba pre silných fajčiarov (viac ako 10 cigariet denne)

Doba	Náplasti	NiQuitin Mini pastilky 1,5 mg
Prvých 6 týždňov	Krok 1: náplasť 21 mg/24 hodín každý deň	5-6 pastiliek denne
7. a 8. týždeň	Krok 2: náplasť 14 mg/24 hodín každý deň	Pokračujte v užívaní lieku NiQuitin Mini 1,5 mg podľa potreby
9. a 10. týždeň	Krok 3: náplasť 7 mg/24 hodín každý deň	
Po 10 týždňoch	Prestaňte používať náplasti	Postupne znižujte množstvo pastiliek lieku NiQuitin Mini 1,5 mg. Keď sa tento počet zníži na 1-2 pastilky denne, liečbu ukončite

Tabuľka 2: Kombinovaná liečba pre slabých fajčiarov (menej ako 10 cigariet denne)

Doba	Náplasti	NiQuitin Mini pastilky 1,5 mg
Prvých 6 týždňov	Krok 1: 14 mg / 24 hodín náplasť každý deň	5-6 pastiliek denne

7. a 8. týždeň	Krok 2: 7 mg / 24 hodín náplast' každý deň	Pokračujte v užívaní NiQuitin Mini 1,5 mg podľa potreby
Po 8 týždňoch	Prestaňte používať náplasti	Postupne znižujte množstvo pastiliek NiQuitin Mini 1,5 mg. Keď sa tento počet zníži na 1-2 pastilky, liečbu ukončite

Použitie u detí a dospelých

Dospelí (12 - 17 rokov, vrátane)

NiQuitin Mini 1,5 mg užívajte len na odporúčanie lekára. Neužívajte NiQuitin Mini 1,5 mg v kombinácii s náplastami NiQuitin.

Neprekračujte uvedené dávky. Pozorne dodržiavajte tento návod a neužívajte viac ako 15 pastiliek denne (t. j. počas 24 hod.).

Liek NiQuitin Mini nesmú užívať deti do 12 rokov.

Poradte sa s lekárom, pokiaľ:

- máte pocit, že zasa začnete fajčiť
- považujete za príliš ťažké úplne prestať užívať pastilky

Pokiaľ ste už opäť začali fajčiť, poradí vám ako dosiahnuť pri ďalšej liečbe nikotínovou substituálnou liečbou najlepšie výsledky.

Ak užijete viac NiQuitin Mini 1,5 mg ako máte

Ak užijete príliš veľa pastiliek NiQuitin Mini 1,5 mg, môže vám byť zle, môžete mať závraty a cítiť sa nezdravo. Prestaňte užívať pastilky a vyhľadajte lekára alebo priamo nemocničné ošetrovanie. Ukážte im balenie tohto lieku alebo jeho písomnú informáciu.

Pastilky nie sú vhodné pre deti do 12 rokov alebo pre nefajčiarov. Pastilky vyvolávajú u detí alebo u nefajčiarov prejavy predávkovania nikotínom: ako sú bolesti hlavy, nevoľnosť, bolesti žalúdka a hnačka. Ak dieťa požíja viac pastiliek, vyhľadajte lekára alebo priamo nemocničné ošetrovanie. Ukážte im balenie tohto lieku alebo jeho písomnú informáciu.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj NiQuitin Mini 1,5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Niektoré môžu byť častejšie, iné menej časté. Pri odporúčanom dávkovaní lieku NiQuitin Mini 1,5 mg neboli zaznamenané žiadne závažné vedľajšie účinky.

Prestať fajčiť už samo o sebe môže spôsobiť príznaky ako závraty, bolesti hlavy, poruchy spánku, kašeľ a ďalšie príznaky ako pri prechladnutí. S ukončením fajčenia môžu súvisieť aj ďalšie príznaky ako depresia, podráždenosť, pocity úzkosti, nepokoj a nespavosť.

Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené nižšie – sú zoradené v skupinách podľa frekvencie, s akou sa môžu vyskytnúť:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí)

- Pastilky môžu spôsobiť miernu bolesť alebo podráždenie jazyka a úst. Môže vám byť tiež zle od žalúdka.

Časté (môžu sa vyskytnúť u 1 z 10 ľudí)

- bolesť hrdla
- zvracanie
- žalúdočná nevoľnosť
- hnačka
- tráviace ťažkosti / pálenie záhy
- plynatosť
- štikútanie
- zápal sliznice hltana (faryngitída)
- zápcha
- sucho v ústach
- nepríjemný pocit v ústach
- vredy v ústach

Menej časté (môžu sa vyskytnúť u 1 zo 100 ľudí)

- nervozita
- depresie
- palpitácia (búšenie srdca)
- zrýchlený pulz
- bolesť na hrudníku
- vyrážka
- únava a pocit choroby

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej než 1 z 10 000 ľudí)

- symptómy závažnej alergickej reakcie, ktoré zahŕňajú dýchavičnosť alebo zvieranie na hrudníku, vyrážku a pocit na omdlenie

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

- záchvaty kŕčov
- dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním)
- eruktácia (grganie)
- zvýšené slinenie
- ochorenie podobné chrípke (príznaky podobné chrípke)
- precitlivosť
- tras, dysgeúzia (poruchy chuti), parestézia v ústach (necitlivosť alebo brnenie v ústach)
- dyspnoe (dýchavičnosť)
- svrbenie alebo vyrážka, opuch kože alebo sliznice, začervenanie kože, zvýšené potenie

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V*** Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať NiQuitin Mini

Tento liek uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Pastilky uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Pre možnú kontamináciu jemným prachom z pastiliek nepoužívajte obal na iné účely.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo NiQuitin Mini obsahuje

Liečivo je nikotín 1,5 mg vo forme živcového komplexu (nicotini resinas 7,50 mg).

Ďalšie zložky sú manitol (E421), alginan sodný (E401), hydrogenuhličitan draselný (E501), xantánová guma (E415), vápenatá soľ polykarbofilu, uhličitan sodný (E500), draselná soľ acesulfámu (E950), stearát horečnatý (E470b), ochucovacia aróma, príchuť mäty piepornej, levomentol.

NiQuitin Mini neobsahuje cukor.

Ako vyzerá NiQuitin Mini a obsah balenia

NiQuitin Mini 1,5 mg je biela, oválna, obojstranne vypuklá tvrdá pastilka, na jednej strane vyrazené "L". NiQuitin Mini je k dispozícii v obale s viečkom obsahujúcom 20 pastiliek. Balenie môže obsahovať 1, 3 alebo 5 obalov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Výrobcovia

Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, EX33 2DL, Veľká Británia

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810, Belgicko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: NiQuitin Mini

Estónsko: NiQuitin Mini, 1,5 mg pressitud losengid

Maďarsko: NiQuitin Minitab 1,5 mg préselt szopogató tableta

Írsko: NiQuitin mini 1.5mg mint lozenges

Slovenská republika: NiQuitin Mini 1,5 mg tvrdé pastilky

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2022.