

Písomná informácia pre používateľa

neo-angin čerešňa 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol
(*alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum*)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 – 4 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je neo-angin čerešňa a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin čerešňa
3. Ako užívať neo-angin čerešňa
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať neo-angin čerešňa
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je neo-angin čerešňa a na čo sa používa

neo-angin čerešňa je antiseptikum na ošetrovanie úst a hrdla.

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku nad šesť rokov môžu používať neo-angin čerešňa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltana sprevádzaných typickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenanie alebo opuch.

Ak sa do 3 – 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin čerešňa

Neužívajte neo-angin čerešňa

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku tohto lieku (uvedených v časti 6).
- neo-angin čerešňa nie je vhodný pre deti vo veku do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať neo-angin čerešňa, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

Deti

Nedávajte neo-angin čerešňa deťom vo veku do 6 rokov. Aby sa deti mohli liečiť neo-anginom čerešňa, musia byť schopné kontrolované cmúľať tvrdé pastilky.

Iné lieky a neo-angin čerešňa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi pri perorálnej liečbe nie sú známe.

neo-angin čerešňa a jedlo a nápoje

neo-angin čerešňa sa môže užívať kedykoľvek počas dňa, nezávisle od jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Vzhľadom na nedostatok informácií sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva neodporúča.

Dojčenie

Vzhľadom na nedostatok informácií sa neo-angin čerešňa nemá užívať počas dojčenia.

Plodnosť

Neuskutočnili sa žiadne štúdie na hodnotenie účinkov na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

neo-angin čerešňa obsahuje izomalt (E953), Ponceau 4R 80 % (E124), benzylalkohol a butylhydroxyanizol (E320)

neo-angin čerešňa obsahuje 2,58 g izomaltu (E953) ako náhradu cukru v jednej tvrdej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ). Má sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitus. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Izomalt môže mať v denných dávkach vyšších ako 10 g mierny preháňací účinok.

neo-angin čerešňa obsahuje farbivo Ponceau 4R 80 % (E124), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

Farbivo v tomto lieku obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tvrdej pastilke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Tento liek obsahuje 0,30 mg benzylalkoholu (zložku čerešňovej arómy) vo veľmi nízkych dávkach v každej pastilke (2,6 g). Benzylalkohol môže spôsobiť alergické reakcie.

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, ak ste tehotná alebo dojčíte alebo ak máte ochorenie pečene alebo obličiek, pretože vo vašom tele sa môžu hromadiť veľké množstvá benzylalkoholu a môžu spôsobiť vedľajšie účinky (nazývané „metabolická acidóza“).

Čerešňová aróma v tomto lieku obsahuje aj butylhydroxyanizol (E320), ktorý môže vyvolať podráždenie slizníc.

3. Ako užívať neo-angin čerešňa

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí, dospelávajúci a deti vo veku od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Ak sa do 3 – 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac neo-anginu čerešňa, ako máte

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania. Vo veľmi nepravdepodobnom prípade predávkovania sa môžu nižšie uvedené nežiaduce účinky zosilniť. V takom prípade sa odporúča liečba týchto príznakov.

Ak zabudnete užiť neo-angin čerešňa

Ak ste zabudli užiť neo-angin čerešňa alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať neo-angin čerešňa a kontaktujte svojho lekára:

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice ako sú tráviace ťažkosti (dyspepsia), nevoľnosť.

Neznáme (častotť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- alergické reakcie ako sú opuch úst, jazyka a pier, vyrážka.
- dýchavičnosť a kašeľ.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať neo-angin čerešňa

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin čerešňa obsahuje

Liečivá sú: dichlórbenzénmetanol (*alcohol dichlorobenzylicus*), amylmetakrezol (*amylmetacresolum*), levomentol (*levomentholum*).

Jedna tvrdá pastilka obsahuje 1,20 mg dichlórbenzénmetanolu, 0,60 mg amylmetakrezolu, 5,90 mg levomentolu.

Ďalšie zložky sú: silica mäty piepornej, izomalt (E953), kyselina vínna, Ponceau 4R 80 % (E124) obsahujúce sodík, indigokarmín (E132) obsahujúci sodík, čerešňová aróma obsahujúca okrem iného benzylalkohol, butylhydroxyanizol (E320).

Ako vyzerá neo-angin čerešňa a obsah balenia

neo-angin čerešňa sú červené, okrúhle, obojstranne vypuklé, čiastočne priehľadné, tvrdé pastilky.

Obsah balenia: 24 alebo 48 tvrdých pastiliek v blistri.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
12777 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2023.