

## Písomná informácia pre používateľa

### FIXIT 120 120 mg filmom obalené tablety

fexofenadínium-chlorid

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je FIXIT 120 a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete FIXIT 120
3. Ako užívať FIXIT 120
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať FIXIT 120
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### 1. Čo je FIXIT 120 a na čo sa používa

FIXIT 120 obsahuje fexofenadínium-chlorid, je to antihistaminikum.

FIXIT 120 sa používa u dospelých a dospeviajúcich vo veku 12 rokov a starších na zmiernenie príznakov sennej nádchy (sezónna alergická rinitída) ako sú kýchanie, svrbenie a výtok z nosa alebo upchaný nos, svrbenie, scervenanie a slzenie očí.

#### 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete FIXIT 120

##### Neužívajte FIXIT 120

- ak ste alergický (precitlivený) na fexofenadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

##### Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať FIXIT 120, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, najmä:

- ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami,
- ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie srdca, pretože skupina liekov, medzi ktoré patrí aj FIXIT 120, môže spôsobiť rýchly alebo nepravidelný tep srdca,
- ak ste v staršom veku.

##### Iné lieky a FIXIT 120

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate apalutamid (liek na liečbu rakoviny prostaty), pretože účinok fexofenadínu sa môže znížiť.

Lieky na trávenie s obsahom hliníka a magnézia môžu ovplyvniť účinok FIXITU 120, znižujú množstvo absorbovaného lieku. Odporuča sa dodržať aspoň dvojhodinový časový odstup medzi užitím FIXITU 120 a takéhoto lieku na zlé trávenie.

## **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas tehotenstva FIXIT 120 neužívajte, ak to nie je nevyhnutné.

V období dojčenia sa užívanie FIXITU 120 neodporúča.

## **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Nie je pravdepodobné, že FIXIT 120 má vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ale predtým ako začnete šoférovať alebo obsluhovať stroje, musíte mať istotu, že po užití tejto tablety nie ste ospanlivý a nemáte závrat.

## **3. Ako užívať FIXIT 120**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

### **Dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie**

Odporučaná dávka je jedna tabletka (120 mg fexofenadínium-chloridu) denne.

Tabletu užite pred jedlom a zapite vodou.

### **Ak užijete viac FIXITU 120, ako máte**

Ak užijete príliš veľa tablet, spojte sa so svojím lekárom alebo ihneď choďte na najbližšiu pohotovosť do nemocnice. Príznaky predávkowania u dospelých sú: závrat, ospanenosť, únava a sucho v ústach.

### **Ak zabudnete užiť FIXIT 120**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ďalšiu tabletu užite vo zvyčajnom čase.

### **Ak prestanete užívať FIXIT 120**

Ak chcete prestat' užívať FIXIT 120 predtým, ako sa skončí liečebná kúra, oznamte to svojmu lekárovi. Ak prestanete užívať FIXIT 120 skôr ako bolo plánované, môžu sa vám príznaky vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak pocítite, že vám opúcha tvár, pery, jazyk alebo hrdlo a ťažko sa vám dýcha, okamžite to oznamte lekárovi, pretože to môžu byť príznaky ťažkej alergickej reakcie.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): bolesť hlavy, ospanenosť, pocit ochorenia (nevoľnosť) a závrat.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): únava/nevšímavosť.

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): ťažkosti so spánkom (nespavosť), poruchy spánku, zlé sny, nervozita, rozmazané videnie, kožná vyrážka a svrbenie, žihľavka, ťažké alergické reakcie, ktoré môžu spôsobiť opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, scervenanie, tlak na hrudníku a ťažkosti s dýchaním, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, hnačka.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## 5. Ako uchovávať FIXIT 120

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo FIXIT 120 obsahuje

Liečivo je fexofenadínium-chlorid. Každá tableta obsahuje 120 mg fexofenadínium-chloridu. Pomocné látky sú manitol, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ karboxymetylškrobu, stearát vápenatý, obalová súprava Sepifilm 752 biela, obalová súprava Sepifilm 3011 oranžová.

### Ako vyzerá FIXIT 120 a obsah balenia

FIXIT 120 sú oranžové, oválne, dvojvypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou.

Veľkosti balenia: 20, 30, 50, 60 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko

### Výrobca

Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovensko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2023.**