

Písomná informácia pre používateľa

Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu

amoxicilín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ospamox a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ospamox
3. Ako užívať Ospamox
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ospamox
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ospamox a na čo sa používa

Čo je Ospamox

Ospamox je antibiotikum. Účinná zložka je amoxicilín. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“.

Na čo sa Ospamox používa

Ospamox sa používa na liečbu infekcií spôsobených baktériami v rôznych častiach tela. Ospamox sa tiež môže používať v kombinácii s inými liekmi na liečbu žalúdočných vredov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ospamox

Neužívajte Ospamox

- ak ste alergický na amoxicilín, penicilín, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste niekedy mali alergickú reakciu na akékoľvek antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou vyrážkou alebo opuchom tváre alebo hrdla.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužívajte Ospamox. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Ospamox.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ospamox, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- máte infekčnú mononukleózu (horúčka, bolesť hrdla, opuchnuté uzliny a veľmi silná únava),
- máte problémy s obličkami,
- pravidelne nemočíte.

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z uvedeného týka, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Ospamox.

Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču

Ak podstupujete:

- vyšetrenia moču (na glukózu) alebo krvné vyšetrenia zamerané na funkciu pečene,
 - vyšetrenia estriolu (používajú sa počas tehotenstva, aby sa skontrolovalo, či sa dieťa správne vyvíja).
- Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi povedzte, že užívate Ospamox. Dôvodom je, že Ospamox môže ovplyvniť výsledky týchto vyšetrení.

Iné lieky a Ospamox

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

- Ak spolu s Ospamoxom užívate alopurinol (používa sa na liečbu dny), môžete mať vyššiu pravdepodobnosť vzniku alergickej kožnej reakcie.
- Ak užívate probenecid (používa sa na liečbu dny), súbežné používanie probenecidu môže znížiť vylučovanie amoxicilínu a neodporúča sa.
- Ak užívate lieky, ktoré pomáhajú zabráňovať tvorbe krvných zrazenín (napríklad warfarín), môžete potrebovať dodatočné krvné vyšetrenia.
- Ak užívate iné antibiotiká (ako napríklad tetracyklín), Ospamox môže byť menej účinný.
- Ak užívate metotrexát (používa sa na liečbu rakoviny a závažnej psoriázy), penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, čo môže spôsobiť zvýšenie výskytu vedľajších účinkov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ospamox môže mať vedľajšie účinky a príznaky (ako napríklad alergické reakcie, závraty a kŕče) môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlá.

Nevedzte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ sa necítite dobre.

Ospamox obsahuje aspartám, benzoát sodný, benzylalkohol, benzyl-benzoát, etanol, sorbitol, oxid siričitý, glukózu a sodík.

Tento liek obsahuje 8,5 mg aspartámu v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie (užívanej cez ústa). Aspartám je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý, ak máte fenylketonúriu (skratka PKU z anglického phenylketonuria), zriedkavú genetickú poruchu, pri ktorej sa hromadí látka fenylalanín, pretože telo ju nevie správne odstrániť.

Tento liek obsahuje 7,1 mg benzoátu sodného (E 211) v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie (užívanej cez ústa), ktorý môže spôsobiť mierne podráždenie očí, kože a slizníc. Tento liek obsahuje do 0,44 mg benzyl-benzoátu v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie. Benzoát sodný a benzyl-benzoát môžu zhoršiť novorodeneckú žltáčku (žltnutie kože a očí) (až do veku 4 týždňov).

Tento liek obsahuje do 3,0 mg benzylalkoholu v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie. Benzylalkohol môže spôsobiť alergické reakcie. Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, ak ste tehotná, dojčíte alebo máte ochorenie pečene alebo obličiek, pretože vo vašom tele sa môžu hromadiť veľké množstvá benzylalkoholu a môžu spôsobiť vedľajšie účinky (nazývané “metabolická acidóza”). Nepoužívajte viac ako týždeň u malých detí (menej ako 3 roky), ak vám to neodporúči váš lekár alebo lekárnik. Pokým vám to neodporúči lekár, nepodávajte novorodencovi (vo veku 4 týždne alebo menej). Benzylalkohol bol spojený s rizikom závažných vedľajších účinkov vrátane problémov s dýchaním (nazývanými “syndróm lapavého dychu”) u malých detí.

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Tento liek obsahuje 0,14 mg sorbitolu v 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie.

Tento liek obsahuje 100 ng oxidu siričitého. Zriedkavo môže vyvolať závažné reakcie z precitlivosti a bronchospazmus (krč svalstva priedušiek).

Tento liek obsahuje 0,68 mg glukózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Ospamox

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Obsah fľašky dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.
- Rozložte si dávky rovnomerne počas dňa a užívajte ich s odstupom aspoň 4 hodín.

Zvyčajná dávka je:

Deti vážiace menej ako 40 kg

Všetky dávky sa vypočítajú podľa telesnej hmotnosti dieťaťa stanovenej v kilogramoch.

- Ošetrojúci lekár vám poradí, aké množstvo Ospamoxu máte podávať vášmu dieťaťu alebo dieťaťu.
- Zvyčajná dávka je 40 mg až 90 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti denne a podáva sa rozdelená do dvoch alebo troch čiastkových dávok.
- Najvyššia odporúčaná dávka je 100 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti denne.

Dospelí, starší pacienti a deti vážiace 40 kg alebo viac

Zvyčajná dávka Ospamoxu je 250 mg až 500 mg trikrát denne alebo 750 mg až 1 g každých 12 hodín, v závislosti od závažnosti a druhu infekcie.

- **Závažné infekcie:** 750 mg až 1 g trikrát denne.
- **Infekcie močových ciest:** 3 g dvakrát denne počas jedného dňa.
- **Lymfická choroba (infekcia, ktorú prenášajú parazity nazývané kliešte):** izolovaný migrujúci erytém (včasná štádium - červená alebo ružová okrúhla vyrážka): 4 g denne, systémové príznaky (neskoré štádium - pri závažnejších príznakoch, alebo keď sa ochorenie rozšírilo do organizmu): do 6 g denne.
- **Žalúdočné vredy:** jedna 750 mg dávka alebo jedna 1 g dávka dvakrát denne počas 7 dní spolu s inými antibiotikami a liekmi na liečbu žalúdočných vredov.
- **Prevenia infekcie srdca počas chirurgického zákroku:** dávka sa líši v závislosti od druhu chirurgického zákroku. V tom istom čase sa môžu podať aj iné lieky. Váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra vám poskytnú viac informácií.
- Najvyššia odporúčaná dávka je 6 g denne.

Problémy s obličkami

Ak máte problémy s obličkami, dávka môže byť nižšia ako zvyčajná dávka.

Ak užijete viac Ospamoxu, ako máte

Ak ste užili priveľké množstvo Ospamoxu, môžu sa u vás objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kryštáliky v moči, ktorých prítomnosť sa môže prejaviť

zakaleným močom alebo problémami s močením. Čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. Vezmite si so sebou tento liek a ukážte ho lekárovi.

Ak zabudnete užiť Ospamox

- Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete.
- Ďalšiu dávku neužite príliš skoro, počkajte približne 4 hodiny pred užitím ďalšej dávky.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ako dlho máte užívať Ospamox?

- Pokračujte v užívaní Ospamoxu tak dlho, ako vám povedal váš lekár, dokonca aj vtedy, ak sa cítite lepšie. Na prekonanie infekcie potrebujete každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.
- Ak sa po ukončení liečby stále necítite dobre, znovu vyhľadajte lekára.

Ak sa Ospamox užíva dlhý čas, môže vzniknúť kandidóza (kvasinková infekcia na vlhkých miestach tela, ktorá môže spôsobovať bolesť, svrbenie a biely výtok). Ak sa u vás vyskytne kandidóza, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak užívate Ospamox dlhý čas, váš lekár vám môže urobiť dodatočné vyšetrenia, aby skontroloval, či vám správne fungujú obličky, pečeň a krvotvorba.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Ospamox a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrovanie:

Nasledujúce vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- alergické reakcie, ktorých prejavy môžu zahŕňať: svrbenie kože alebo kožnú vyrážku, opuch tváre, pier, jazyka, tela alebo ťažkosti s dýchaním. Alergické prejavy môžu byť závažné a občas viesť k úmrtiam.
- vyrážka alebo červené ploché okrúhle škvrnky veľkosti špendlíkovej hlavičky pod povrchom kože alebo tvorba krvných podliatin na koži. Je to spôsobené zápalom stien krvných ciev v dôsledku alergickej reakcie. Môže sa to spájať s bolesťou kĺbov (artritídou) alebo s problémami s obličkami.
- oneskorená alergická reakcia sa môže vyskytnúť zvyčajne 7 až 12 dní po užití Ospamoxu a niektoré jej prejavy zahŕňajú: vyrážky, horúčku, bolesť kĺbov a zväčšenie lymfatických uzlín, najmä v podpazuší.
- kožná reakcia známa ako „multiformný erytém“, pri ktorej sa môžu objaviť: svrbivé červenopurpurové škvrnky na koži, najmä na dlaniach alebo chodidlách, „žihľavkovité“ vyvýšené opuchnuté miesta na koži, bolestivé miesta na slizniciach ústnej dutiny, očí a pohlavných orgánov. Môžete mať horúčku a byť veľmi unavený.
- ďalšie závažné kožné reakcie môžu zahŕňať: zmeny farby kože, hrčky pod kožou, tvorbu pľuzgierov, pustuly (malé pľuzgieriky na koži naplnené hnisom alebo vodou), olupovanie, začervenanie, bolesť, svrbenie, tvorbu šupiniek na koži. Tieto môžu byť spojené s horúčkou, bolesťami hlavy a bolesťami tela.
- príznaky podobné chrípke s vyrážkou, horúčkou, opuchnutými uzlinami a abnormálnymi výsledkami krvných testov (vrátane zvýšenia počtu bielych krviniek (eozinofília) a pečenej enzýmov) (Lieková reakcia s eozinofiliou a systémovými príznakmi (DRESS, z anglického *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms*)).
- horúčka, triaška, bolesť hrdla alebo iné prejavy infekcie, alebo ľahká tvorba krvných podliatin. Môžu to byť prejavy ťažkostí s krvinkami.

- Jarischova-Herxheimerova reakcia, ktorá sa vyskytuje počas liečby Ospamoxom zameranej na Lymfskú chorobu a spôsobuje horúčku, triašku, bolesť hlavy, bolesť svalov a kožnú vyrážku.
- zápal hrubého čreva, ktorý je sprevádzaný hnačkou (niekedy obsahujúcou krv), bolesťou a horúčkou.
- môžu sa vyskytnúť závažné vedľajšie účinky postihujúce pečeň. Vyskytujú sa hlavne u osôb podstupujúcich dlhodobú liečbu, u mužov a u starších osôb. Musíte urýchlene informovať svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú:
 - o silná hnačka s krvácaním,
 - o pľuzgiere, začervenanie alebo tvorba krvných podliatin na koži,
 - o tmavší moč alebo bledšia stolica,
 - o zožltnutie kože alebo očných bielok (žltáčka). Pozrite si tiež nižšie uvedenú informáciu o anémii, ktorá môže viesť k žltáčke.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť počas liečby týmto liekom alebo až niekoľko týždňov po jej ukončení.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z príznakov uvedených vyššie, prestaňte užívať tento liek a bezodkladne vyhľadajte svojho lekára.

Niekedy sa u vás môžu vyskytnúť menej závažné kožné reakcie, ako napríklad:

- mierne svrbivá vyrážka (okružle, ružovočervené škvrnky), „žihľavkovité“ opuchnuté miesta na predlaktí, nohách, dlaniach, rukách alebo chodidlách. Ich výskyt je menej častý (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb).

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, obráťte sa na svojho lekára, pretože liečba Ospamoxom sa bude musieť ukončiť.

Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- kožná vyrážka
- napínanie na vracanie (nauzea)
- hnačka

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- vracanie

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- kandidóza (kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov), váš lekár alebo lekárnik vám môže odporučiť liek na kandidózu
- problémy s obličkami
- záchvaty kŕčov (kŕče), ktoré sa pozorovali u pacientov, ktorí užívali vysoké dávky alebo mali problémy s obličkami
- závraty
- hyperaktivita
- zuby sa môžu zdať zafarbené, čo sa zvyčajne odstráni čistením zubnou kefkou (tento vedľajší účinok sa hlásil u detí)
- farba jazyka sa môže zmeniť na žltú, hnedú alebo čiernu a môže vyzeráť ako chlpatý
- nadmerný rozpad červených krviniek spôsobujúci typ anémie (málokrvnosti). Prejavy zahŕňajú: únavu, bolesť hlavy, namáhavé dýchanie, závraty, bledosť a zožltnutie kože a očných bielok.
- nízky počet bielych krviniek
- nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi
- krv sa môže zrážať pomalšie ako zvyčajne. Môžete si to všimnúť pri krvácaní z nosa alebo pri porezaní sa.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- bolesť na hrudníku v súvislosti s alergickými reakciami, ktorá môže byť príznakom srdcového infarktu vyvolaného alergiou (Kounisov syndróm)
- enterokolitída vyvolaná liekom (DIES, drug-induced enterocolitis syndrome):
Enterokolitída vyvolaná liekom (zápal tenkého a hrubého čreva) bola hlásená hlavne u detí, ktoré dostávali amoxicilín. Ide o určitý druh alergickej reakcie s hlavným príznakom opakovaného vracania (1-4 hodiny po podaní lieku). Ďalšie príznaky môžu zahŕňať bolesť brucha, pocit únavy, hnačku a nízky krvný tlak.
- kryštály v moči vedúce k akútne mu poškodeniu obličiek, ktorých prítomnosť sa môže prejavovať zakaleným močom alebo ťažkosťami s močením alebo nepríjemným pocitom pri močení. Dbajte na to, aby ste pili veľa tekutín, aby ste znížili pravdepodobnosť vzniku týchto príznakov.
- vyrážka s pl'uzgiermi usporiadanými do kruhu s chrastou v strede alebo ako šnúra perál (IgA lineárna dermatóza)
- zápal membrán obklopujúcich mozog a miechu (aseptická meningitída)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik a. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ospamox

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaši po „EXP“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Pripravená suspenzia: Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Pripravenú suspenziu nepoužívajte dlhšie ako 14 dní.

Nepoužívajte tento liek, ak sú pred prípravou vo fľaši viditeľné hrudky prášku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ospamox obsahuje

Liečivo je amoxicilín (ako trihydrát).

Každých 5 ml pripravenej perorálnej suspenzie obsahuje 250 mg amoxicilínu (ako trihydrát).

Ďalšie zložky sú: bezvodá kyselina citrónová (E 330), benzoát sodný (E 211), aspartám (E 951), mastenec (E 553b), bezvodý trinátriumcitrát (E 331), guma guar (E 412), zrážaný oxid kremičitý (E 551), prášková citrónová aróma (obsahuje glukózu, sorbitol (E 420), oxid siričitý (E 220)), prášková marhuľovo-broskyňová aróma (obsahuje benzyl-benzoát, etanol, sorbitol (E 420), oxid siričitý (E 220)), prášková pomarančová aróma (obsahuje benzylalkohol).

Ako vyzerá Ospamox a obsah balenia

Biely až žltkastý prášok s ovocnou vôňou.

Prášok na perorálnu suspenziu je balený v 60 ml žltohnedej sklenenej fľaši s detským bezpečnostným uzáverom so závitom (stlačiť + otočiť) a tesniacou membránou.

Prášok na perorálnu suspenziu je balený v 100 ml žltohnedej sklenenej fľaši s detským bezpečnostným uzáverom so závitom (stlačiť + otočiť) a tesniacou membránou.

Veľkosti balenia:

6,6 g prášku na prípravu 60 ml perorálnej suspenzie

11 g prášku na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie

Súčasťou balenia je polypropylénová odmerná lyžička alebo polypropylénová a polyetylénová striekačka (s adaptérom) s označením 1,25 ml, 2,5 ml a 5 ml.

Meranie dávky lieku:

- Obsah fľaše pretrepte.
- Vložte adaptér do hrdla fľaše.
- Vložte koniec striekačky do adaptéra.
- Obráťte fľašu hore dnom.
- Ťahom piestu naberte potrebnú dávku.
- Prevráťte fľašu do zvislej polohy, vyberte dávkovaciu striekačku, adaptér nechajte na fľaši a fľašu uzavrite.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Výrobca

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakúsko

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Rakúsko:	Amoxicillin Sandoz 250 mg/5 ml - Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Bulharsko:	Amoxicillin Sandoz
Česká republika:	Amoxicillin Sandoz 250 mg/5 ml
Estónsko:	Ospamox 250mg/ 5ml
Fínsko:	Amoxicillin Sandoz 250 mg/5 ml jauhe oralisuspensiotta varten
Litva:	Ospamox 250mg/5ml milteliai geriamajai suspensijai
Lotyšsko:	Ospamox 250mg/5ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai
Poľsko:	Novamox
Rumunsko:	Amoxicilină Trihidrat Sandoz 250 mg/5 ml pulbere pentru suspensie orală
Slovinsko:	Ospamox 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
Slovenská republika:	Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2023.

Všeobecné odporúčanie týkajúce sa používania antibiotík

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Nemajú žiaden účinok proti infekciám spôsobeným vírusmi.

Infekcia spôsobená baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomuto dochádza, je, že baktérie, ktoré spôsobujú infekciu, sú rezistentné na užívané antibiotikum. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj rozmnožovať, a to aj napriek liečbe antibiotikom.

Baktérie sa môžu stať rezistentnými na antibiotiká z mnohých príčin. Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znížiť riziko, že sa na ne baktérie stanú rezistentnými.

Keď vám lekár predpíše antibiotikum, je určené iba na liečbu vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby ste pomohli predísť vzniku rezistentných baktérií, ktoré môžu zabrániť pôsobeniu antibiotika.

1. Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v správnom čase a počas správneho počtu dní. Prečítajte si pokyny v písomnej informácii a ak niečomu nerozumiete, požiadať o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.
2. Antibiotikum nesmiete užívať, pokiaľ nebolo predpísané výhradne vám a môžete ho užívať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo predpísané.
3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným osobám, dokonca ani vtedy, ak mali infekciu, ktorá sa podobala tej vašej.
4. Antibiotiká, ktoré predpísali vám, nesmiete dávať iným osobám.
5. Ak vám nejaké antibiotiká zostali po tom, ako ste liečbu dokončili podľa pokynov vášho lekára, zvyšné antibiotiká musíte vrátiť do lekárne na náležitú likvidáciu.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov.

Pokyny na rekonštitúciu

Po otvorení uzáveru so závitom sa uistite, že tesniaca membrána je neporušená a tesne prilieha k okrajom fľaše. Nepoužívajte, ak je tesniaca membrána porušená. Potraste fľašu, aby bol práškový obsah voľne sypký.

Suspenziu pripravíte naplnením fľaše nasledujúcim množstvom vody:

- Do 60 ml fľaše pridajte 55 ml vody
- Do 100 ml fľaše pridajte 92 ml vody.

Obsah fľaše opäť dôkladne pretrepte.

Biela až žltkastá suspenzia je takto pripravená na použitie.

Nepoužívajte rekonštituovanú (pripravenú) suspenziu, ak jej farba nie je biela až žltkastá.

Obsah fľaše dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.