

Písomná informácia pre používateľa

Indometacin 100 Berlin-Chemie

100 mg čapíky

indometacín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečíitali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Indometacin 100 Berlin-Chemie a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Indometacin 100 Berlin-Chemie
3. Ako používať Indometacin 100 Berlin-Chemie
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Indometacin 100 Berlin-Chemie
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Indometacin 100 Berlin-Chemie a na čo sa používa

Indometacin 100 Berlin-Chemie je liek proti zápalu a bolesti (nesteroidový liek proti zápalu/reumatickým chorobám, NSAID).

Používa sa na liečbu bolesti a zápalov pri:

- akútnejch zápaloch klíbov (akútnej artritíde), vrátane záchvatov dny;
- chronických zápaloch klíbov (chronická artritída), hlavne pri reumatických zápaloch klíbov (chronická polyartritída);
- Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylitída) a iné zápalové reumatické ochorenia chrabtie;
- zápaly pri degeneratívnych chorobách klíbov a chrabtie (artrózy a spondyloartrózy);
- zápalové reumatické ochorenia mäkkých tkanív;
- bolestivé opuchy alebo zápaly po úrazoch;
- bolesti pri menštruačii (primárna dysmenorea);
- bolesti pri nádorových ochoreniach.

Indometacin 100 Berlin-Chemie je určený dospelým.

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Indometacin 100 Berlin-Chemie

Nepoužívajte Indometacin 100 Berlin-Chemie

- ak ste alergický na indometacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak ste v minulosti reagovali na liečbu acetylsalicylovou kyselinou alebo iným nesteroidovým protizápalovým liekom astmatickým záchvatom, opuchom slizníc nosa alebo reakciami na koži;
- ak trpíte neobjasnenou poruchou krvotvorby alebo poruchou zrážanlivosti krvi;
- ak máte alebo ste v minulosti mali krvácanie alebo prederavenie žalúdka alebo črevov v súvislosti s liečbou nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID);
- ak máte alebo ste v minulosti mali vredy žalúdočného alebo črevného traktu (dve alebo viac potvrdených udalostí vytvoreného vredu alebo krvácania);
- ak máte krvácanie v mozgu (cerebrovaskulárne krvácanie) alebo iné aktívne krvácanie;
- ak máte závažné zlyhávanie srdca;
- v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Indometacin 100 Berlin-Chemie, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Nasledujúce stavy alebo ochorenia vyžadujú užívanie Indometacina 100 Berlin-Chemie len pri určitých podmienkach (t. j. dlhšie intervale medzi dávkami alebo nižšie dávky a pod dohľadom lekára) so zvýšenou opatrnosťou. Opýtajte sa na to vášho lekára. Toto platí, aj ak sa tieto stavy u vás vyskytli hocikedy v minulosti.

Bezpečnosť v súvislosti so žalúdočno-črevným traktom

Indometacin 100 Berlin-Chemie sa nemá používať súbežne s inými nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítormov cyklooxygenázy-2 (COX-2).

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na liečbu príznakov.

Starší ľudia

U starších pacientov je výskyt nežiaducích reakcií na NSAID zvýšený, najmä krvácanie do tráviaceho traktu a perforácia (prederavenie), ktoré môžu byť smrteľné. Obzvlášť u starších pacientov je preto nutné starostlivé sledovanie lekárom.

Krvácanie do tráviaceho traktu, ulcerácia (vznik vredov) a perforácia (prederavenie)

Krvácanie do tráviaceho traktu, vredy alebo prederavenie, ktoré môžu byť smrteľné, boli hlásené počas liečby všetkými NSAID kedykoľvek v priebehu liečby, s varovnými príznakmi alebo bez nich, alebo bez predošlého výskytu závažných príhod v tráviacom trakte.

Riziko krvácania do tráviaceho traktu, vredov alebo prederavenia sa zvyšuje so stúpajúcimi dávkami NSAID, u pacientov s predchádzajúcim výskytom žalúdočných vredov, obzvlášť ak boli komplikované krvácaním alebo prederavením (pozri časť 2. „Nepoužívajte Indometacin 100 Berlin-Chemie“), a u starších pacientov. Títo pacienti majú začať liečbu najnižšou dostupnou dávkou.

U týchto pacientov a tiež u pacientov, u ktorých sa vyžaduje súčasná sprievodná liečba nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi s pravdepodobnosťou zvýšenia rizika krvácania do žalúdočno-črevného traktu, sa má zvážiť kombinácia liečby s liekmi s ochranným účinkom (napríklad mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy).

Pacienti s výskytom vedľajších účinkov v oblasti tráviaceho traktu, obzvlášť starší ľudia, majú byť upozornení lekárom, aby informovali lekára o výskytu akéhokoľvek neobvyklého príznaku v brušnej oblasti (najmä krvácanie do tráviaceho traktu), hlavne na začiatku terapie.

Zvýšená opatrnosť je nutná pri pacientoch súbežne liečených liekmi, ktoré by mohli zvýšiť riziko vzniku vredov alebo krvácania, akými sú napríklad perorálne podávané kortikosteroidy, lieky proti zrážaniu krvi, ako napríklad warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, ktoré sa používajú okrem iného na terapiu depresívnych nálad, alebo lieky proti zhľukovaniu krvných doštičiek, ako napr. kyselina acetylsalicylová (pozri časť 2 „Iné lieky a Indometacin 100 Berlin-Chemie“).

Ak sa u vás pri liečbe Indometacinem 100 Berlin-Chemie vyskytne krvácanie v tráviacom trakte alebo vredy, liečbu musíte ukončiť.

NSAID majú byť používané s opatrnosťou u pacientov s výskytom chorôb tráviaceho traktu prekonaných v minulosti (zápal hrubého čreva s tvorbou vredov, Crohnova choroba), pretože môže dojst' k obnoveniu výskytu uvedených chorôb (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).

Účinok na srdcovocievny systém

Užívanie liekov ako Indometacin 100 Berlin-Chemie môže byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Akékoľvek riziko sa zvyšuje s vysokými dávkami alebo predĺženou liečbou. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dobu liečby.

Ak máte ťažkosti so srdcom, prezili ste cievnu mozkovú príhodu alebo si myslíte, že by ste mohli mať riziko vzniku týchto chorôb (napr. ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo vysoký cholesterol v krvi, alebo fajčíte), porad'te sa o liečbe s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Kožné reakcie

V súvislosti s liečbou protizápalovými liekmi sa veľmi zriedkavo vyskytli závažné kožné reakcie, niektoré z nich smrtelné (Stevenson-Johnsonov syndróm a toxicá epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm) (pozri časť 4). Najvyššie riziko vzniku týchto reakcií je na začiatku liečby, vo väčšine prípadov reakcie vznikli počas prvého mesiaca liečby. Liečba Indometacinem 100 Berlin-Chemie má byť prerušená a okamžite konzultovaná s lekárom pri prvom prejave žihľavky, zmenách na sliznici alebo inom príznaku precitlivenosti.

Ďalšie upozornenia

Indometacin 100 Berlin-Chemie sa má použiť len po starostlivom zvážení pomeru prínos/riziko liečby:

- pri určitých vrozených poruchách krvotvorby (napr. akútnej intermitentnej porfýrii);
- pri určitých autoimunitných ochoreniach (systémový lupus erythematosus (SLE), zmiešané choroby spojivového tkaniva).

Dôsledné monitorovanie lekárom sa vyžaduje:

- bezprostredne po väčšom chirurgickom zákroku;
- pri poruche funkcie pečene alebo obličeiek;
- pri alergických ochoreniach (t. j. kožné reakcie na iné liečivá, astma, senná nádcha), chronických opuchoch slizníc nosa a dýchacích ciest alebo chronických chorobách dýchacích ciest spojených s ich zúžením.

Závažné akútne reakcie z precitlivenosti (hypersensitivity), napr. anafylaktický šok, boli pozorované veľmi zriedkavo. Po prvom príznaku hypersenzitívnej reakcie sa liečba Indometacinem 100 Berlin-

Chemie musí okamžite ukončiť. Liečbu tohto stavu na základe prítomných príznakov musí začať lekár s vhodnou špecializáciou.

Indometacín, liečivo Indometacinu 100 Berlin-Chemie, môže dočasne potlačiť funkciu krvných doštičiek (agregáciu trombocytov). Pacienti s poruchou zrážanlivosti krvi musia byť starostlivo sledovaní.

Ak súbežne užívate lieky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi alebo obsah cukru v krvi, vykonáva sa preventívne kontrola zrážanlivosti krvi a cukru v krvi.

Ak je pacient súbežne liečený Indometacinom 100 Berlin-Chemie a liekmi na báze lítia (lieky na liečbu psychiatrických chorôb) alebo močopudnými liekmi šetriacimi draslík, je nevyhnutná kontrola hladín lítia a draslíka v krvi pacienta.

Pri dlhodobom používaní Indometacinu 100 Berlin-Chemie je potrebná pravidelná kontrola funkcie pečene, obličiek a krvného obrazu.

Pred chirurgickým zákrokom je nutné informovať o liečbe Indometacinom 100 Berlin-Chemie chirurga alebo zubného lekára.

Pri dlhodobom používaní liekov proti bolesti môžu nastať bolesti hlavy, ktoré sa nesmú liečiť zvýšením dávky liekov. Porad'te sa s lekárom, ak napriek liečbe Indometacinom 100 Berlin-Chemie máte často bolest' hlavy.

Vo všeobecnosti nadmerné užívanie liekov proti bolesti, najmä kombinácií viacerých liečiv, môže viesť k poškodeniu obličiek s rizikom ich zlyhania (analgetická nefropatia).

Deti a dospevajúci

Používanie indometacínu, liečiva Indometacinu 100 Berlin-Chemie, u detí a dospevajúcich sa neodporúča, pretože pre túto vekovú kategóriu nie sú k dispozícii dostatočné údaje o bezpečnosti a účinku liečby reumatických ochorení indometacínom.

Iné lieky a Indometacin 100 Berlin-Chemie

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súbežné používanie Indometacinu 100 Berlin-Chemie a digoxínu (lieku na posilnenie akcie srdca), fenytoínu (liek na liečbu záchvatov epilepsie) alebo lítia (liek na psychiatrické ochorenia) môže zvýšiť koncentráciu týchto liečiv v krvi. Je nutná kontrola hladiny lítia v krvi.

Indometacin 100 Berlin-Chemie môže oslabiť účinok liekov na odvodnenie a zníženie krvného tlaku (diuretická a antihypertenzívna).

Indometacin 100 Berlin-Chemie môže oslabiť účinok ACE inhibítarov (liekov na zlyhanie srdca a vysoký krvný tlak). Pri súbežnom užívaní sa môže tiež zvýšiť riziko vzniku poruchy funkcie obličiek.

Používanie Indometacinu 100 Berlin-Chemie a draslík šetriacich liekov na zvýšenie tvorby moču (niektoré diuretická) súbežne môže viesť k nárastu hladiny draslíka v krvi.

Používanie Indometacinu 100 Berlin-Chemie súbežne s inými liekmi proti bolesti a proti zápalu zo skupiny nesteroidových protizápalových liekov alebo glukokortikoidov zvyšuje riziko žalúdočno-črevných vredov alebo krvácania.

Lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi, ako kyselina acetylsalicylová a niektoré lieky proti depresii (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu/SSRI), môžu zvyšovať riziko žalúdočno-črevného krvácania.

Používanie Indometacinu 100 Berlin-Chemie do 24 hodín pred alebo po podaní metotrexátu môže viesť k zvýšenej koncentrácií metotrexátu v krvi a ku zvýšeniu jeho vedľajších účinkov.

Nesteroidové protizápalové lieky môžu pravdepodobne zvýšiť účinok liekov proti krvným zrazeninám, ako je warfarín.

Lieky, ktoré obsahujú probenecid (liek na liečbu dny), môžu spôsobiť oneskorenie vylučovania indometacínu. Tým môže dôjsť k akumulácií indometacínu v tele a zvýšeniu vedľajších účinkov.

V kombinácii s penicilínnimi môže dôjsť k oneskoreniu vylučovania.

Vylučovanie indometacínu je urýchľované furosemidom (liekom na odvodnenie).

Indometacin 100 Berlin-Chemie nesmie byť použitý súbežne s triamterénom (liekom na odstraňovanie vody a na zníženie krvného tlaku) z dôvodu rizika akútneho zlyhania obličiek.

Indometacin 100 Berlin-Chemie nesmie byť použitý súbežne s diflunisalom (liek proti bolesti pri zápaloch klíbov a degeneratívnym ochoreniam klíbov) z dôvodu očakávaného výrazného nárastu koncentrácie indometacínu v krvi (bolo popísané smrteľné krvácanie do tráviaceho traktu).

Nesteroidové protizápalové lieky (ako je indometacín) môžu zvýšiť toxicitu cyklosporínu na obličky.

Ojedinele boli hlásené prípady ovplyvnenia hladiny glukózy v krvi po podaní indometacínu, ktoré si vyžiadali úpravu dávky lieku znižujúceho cukor v krvi (antidiabetiká). Kontroly hodnôt krvného cukru sa odporúčajú ako prevencia počas liečby v rovnakom čase.

Indometacin 100 Berlin-Chemie a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Indometacínom 100 Berlin-Chemie sa vyhýbajte požívaniu alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť výskyt vedľajších účinkov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčité, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradťte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Ak sa zistí tehotenstvo počas liečby Indometacínom 100 Berlin-Chemie, treba informovať lekára. Neužívajte Indometacin 100 Berlin-Chemie, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť vaše nenaistené dieťa alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom u vášho nenaisteného dieťaťa. Môže ovplyvniť náchylnosť vás a vášho dieťaťa ku krvácaniu a spôsobiť, že pôrod bude neskôrší alebo dlhší, ako sa očakávalo. Indometacin 100 Berlin-Chemie nemáte užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokial' to nie je absolútne nevyhnutné a ak vám to neodporúčí váš lekár. Ak potrebujete liečbu počas tohto obdobia alebo kým sa pokúšate otehotniť, má sa použiť čo najnižšia dávka počas čo najkratšieho času. Ak sa Indometacin 100 Berlin-Chemie užíva dlhšie ako niekoľko dní od 20. týždňa tehotenstva, môže u vášho nenaisteného dieťaťa spôsobiť problémy s obličkami, ktoré môžu viesť k nízkej hladine plodovej vody obklopujúcej dieťa

(oligohydramnión) alebo k zúženiu cievy (*ductus arteriosus*) v srdci dieťaťa. Ak potrebujete liečbu dlhšiu ako niekoľko dní, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie sledovanie.

Dojčenie

Liečivo indometacín a produkty jeho metabolickej premeny v organizme prestupujú do materského mlieka v malých množstvách. Nakoľko škodlivé účinky pre dieťa neboli doteraz opísané, pre krátkodobé užívanie sa zvyčajne nevyžaduje prerušenie dojčenia. Ak je predpísané dlhšie užívanie alebo liečba vysokými dávkami, má byť dojčenie prerušené.

Plodnosť

Tak ako všetky lieky, ktoré inhibujú syntézu prostaglandínov, môže Indometacin 100 Berlin-Chemie spôsobiť ťažkosti s otehotnením. Porad'te sa s lekárom, ak plánujete otehotniť alebo ak máte problémy otehotniť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri používaní vysokých dávok Indometacingu 100 Berlin-Chemie môžu nastať poruchy centrálneho nervového systému, ako napríklad únava a závraty a v niektorých prípadoch sa môže znížiť schopnosť aktívne sa zúčastňovať premávky, viest' vozidlá a obsluhovať stroje.

Vo väčšom rozsahu sa môžu tieto stavy prejaviť pri kombinovaní lieku s alkoholom alebo s inými centrálnymi pôsobiacimi liekmi (napr. lieky na spanie alebo trankvilizéry – lieky proti úzkosti a duševnému napätiu).

Potom už nie ste schopní reagovať rýchlo na nečakané a náhle udalosti. V takomto prípade neved'te vozidlá a neobsluhujte stroje a zariadenia. Nepracujte bez bezpečnej opory nôh.

3. Ako používať Indometacin 100 Berlin-Chemie

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Dodržiavajte inštrukcie na použitie, aby účinok Indometacingu 100 Berlin-Chemie bol správny.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí


Dávkovanie indometacínu závisí od závažnosti ochorenia. Odporučený rozsah dávok je 50 – 150 mg indometacínu denne.

Dospelým sa preto odporúča aplikovať 1 čapík Indometacingu 100 Berlin-Chemie 1 krát denne.

V mimoriadnych prípadoch sa dávka indometacínu môže na krátke čas zvýšiť až na 200 mg denne, avšak táto dávka sa nesmie prekročiť.

Spôsob podávania

Oddeľte 1 zabalený čapík (v mieste perforácie odtrhnite alebo odstráhnite) zo stripu. Palcom a ukazovákom obidvoch rúk potiahnite za voľné konce fólie nad špicou čapíka, až kým sa čapík neuvoľní tak, aby sa dal vybrať z obalu (pozri obrázok).



Čapík opatrne zavedťte hlboko do konečníka, pokiaľ možno po vyprázdnení stolice.
Pre zlepšenie zavedenia môžete čapík ohriť v ruke alebo veľmi krátko ponoriť do horúcej vody.

Dĺžka liečby

Dĺžku liečby stanoví lekár. Pri reumatických ochoreniach môže byť potrebné dlhodobé užívanie Indometacinu 100 Berlin-Chemie.

Porad'te sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že účinok Indometacinu 100 Berlin-Chemie je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak použijete viac Indometacinu 100 Berlin-Chemie, ako máte

Používajte Indometacin 100 Berlin-Chemie podľa pokynov lekára alebo pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak máte pocit, že úľava od bolesti nie je dostatočná, nezvyšujte si dávku sami, ale porad'te sa s lekárom.

Poruchy centrálneho nervového systému, ako bolesti hlavy, závraty, mdloby a kŕče, môžu byť príznakmi predávkovania, podobne ako bolesti žalúdka, nevoľnosť a vracanie. Takisto je možný vznik krvácania v žalúdočno-črevnej oblasti, narušenia funkcie pečene a obličiek.

Neexistuje špecifické antidotum (protijed).

V prípade podezrenia na predávkovanie Indometacinom 100 Berlin-Chemie informujte lekára, ktorý na základe závažnosti stavu rozhodne, aké opatrenia sú nevyhnutné.

Ak zabudnete použiť Indometacin 100 Berlin-Chemie

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak spozorujete výskyt niektorého z nasledujúcich vedľajších účinkov, porad'te sa s lekárom, ktorý určí, ako postupovať ďalej.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú závislé od dávky a líšia sa individuálne.

Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky postihujú žalúdočno-črevný trakt. Môžu sa vyskytnúť žalúdočné/dvanásťnikové vredy (peptické vredy), prederavenie alebo krvácanie do tráviaceho traktu, niekedy smrteľné najmä u starších ľudí (pozri časť 2. „Upozornenia a opatrenia“). Po použití indometacínu boli hlásené nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, tráviace tŕažkosti, bolest

brucha, dechťová stolica, vracanie krvi, zápal sliznice úst s tvorbou vredov, zhoršenie zápalu hrubého čreva a Crohnovej choroby (pozri časť 2. „Upozornenia a opatrenia“). Menej často bol pozorovaný zápal sliznice žalúdka. Riziko žalúdočno-črevného krvácania závisí najmä od veľkosti dávky a dĺžky používania.

V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené opuchy, vysoký krvný tlak a srdečové zlyhávanie.

Lieky ako Indometacin 100 Berlin-Chemie môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdečového záchvatu (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- Žalúdočno-črevné problémy, ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka, mierne žalúdočno-črevné krvácanie, ktoré vo výnimcoch môže spôsobiť anémiu.
- Poruchy centrálneho nervového systému, ako sú bolesti hlavy a točenie hlavy.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- Zvonenie v ušiach.
- Poruchy trávenia, nadúvanie, žalúdočné kŕče, strata chuti do jedla, žalúdočné alebo črevné vredy (potenciálne s krvácaním a prederavením).
- Zvýšenie hodnôt pečeňových enzymov v krvi (sérové transaminázy).
- Reakcie z precitlivenosti s kožou vyrážkou a svrbením kože.
- Závraty, spavosť a ľahká unaviteľnosť, vyčerpanie a depresie.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- Hluchota.
- Dvojité videnie, poškodenie sietnice (pigmentová degenerácia sietnice) a zakalenie rohovky v priebehu dlhodobej liečby indometacínom. Rozmazané videnie môže byť príznakom týchto zmien a vyžaduje dôkladné vyšetrenie očným lekárom (oftalmológom). Nakoľko tieto zmeny na sietnici a rohovke sa môžu vyvinúť aj bez tohto spozorovateľného príznaku (asymptomaticky), je u pacientov dlhodobo liečených indometacínom vhodné pravidelné očné vyšetrenie.
Ak vzniknú takéto zmeny, odporúča sa ukončenie terapie a poškodenie sa zvyčajne upraví bez následkov.
- Vracanie krvi, krv v stolici alebo krvavá hnačka.
Ak sa u vás vyskytnú ľažké bolesti v hornej časti brucha, čierna stolica alebo krv v stolici, liečbu Indometacinom 100 Berlin-Chemie musíte ihneď ukončiť a informovať lekára.
- Poškodenie pečene (hepatítida so žltačkou alebo bez nej, veľmi zriedkavo sa rozvíjajúca do veľmi ľažkej akútnej formy, dokonca aj bez predchádzajúcich príznakov). Preto sa majú pravidelne kontrolovať hodnoty pečeňových enzymov v krvi.
- Žihľavka. Reakcie z precitlivenosti s astmatickým záchvatom (prípadne s poklesom krvného tlaku). Pacient musí byť poučený, aby v takomto prípade informoval lekára a viac nepoužil Indometacin 100 Berlin-Chemie.
- Periférna neuropatia (pocity típnutia horných a dolných končatín, mravčenie), svalová slabosť, kŕče, porucha citlivosti a prechodné straty vedomia až kóma.
Pri liečbe indometacínom je možné zosilnenie intenzity symptómov epilepsie a Parkinsonovej choroby.
V závislosti od intenzity príznakov je nutné zníženie dávok alebo vysadenie liečby. Poradťte sa s vaším lekárom.
- Zmätenosť, úzkosť, psychické poruchy, nespavosť.
Môže dochádzať k zvýšenej intenzite symptómov z predchádzajúcich psychiatrických ochorení pri používaní Indometacina 100 Berlin-Chemie.

V závislosti od závažnosti príznakov je nutné zníženie dávky alebo vysadenie liečby. Obráťte sa na svojho lekára.

- Opuchy (napr. periférne opuchy), zvlášť u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo zhoršenou funkciou obličiek.
- Vypadávanie vlasov.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- Poruchy krvotvorby (málokrvnosť, nedostatok krvných doštíčiek, znížený počet bielych krviniek, nedostatok bielych krviniek). Prvým príznakom môže byť horúčka, bolesť v hrdle, povrchové rany v ústach, symptómy podobné chrípke, tăžká únava, krvácanie z nosa a v koži. V týchto prípadoch je nevyhnutné liek okamžite vysadiť a navštíviť lekára. Nepoužívajte na liečenie týchto príznakov žiadne lieky proti horúčke alebo bolesti. Počas dlhodobej liečby je preto nutné pravidelne kontrolovať krvný obraz pacientov.
- Búsenie srdca, bolesť na hrudi a srdcové zlyhávanie.
- Prechodné poruchy sluchu.
- Zápal sliznice v ústach, zápal jazyka, lézie na pažeráku (poškodenie pažeráka), tăžkosti v podbrušku (napr. krvácanie, v niektorých prípadoch aj ulcerózne zápaly hrubého čreva), zhoršenie Crohnovej choroby/ulceróznej kolitídy (niektoré zápaly hrubého čreva spolu s vredmi), zápcha, zápal slinivky brušnej.
- Závažné reakcie precitlivenosti. Môžu sa prejavíť ako opuch tváre, jazyka alebo vnútorného hrtana so zúžením dýchacích ciest, tăžkostami s dýchaním, búsením srdca, poklesom krvného tlaku až život ohrozujúcim šokom. Pri vzniku jedného z týchto príznakov, ktoré môžu nastať pri prvom použití lieku, je nevyhnutná okamžitá pomoc lekára.
- Alergická vaskulítida (zápal ciev) a zápal pl'úc.
- Veľmi zriedkavo sa vyskytlo zhoršenie zápalov sprevádzajúcich infekcie (t. j. rozvoj zápalu väzivových obalov spojený s odumieraním tkaniva) spoločne s používaním určitých protizápalových liekov (nesteroidových protizápalových liekov, ku ktorým patrí Indometacin 100 Berlin-Chemie). Preto v prípade vzniku alebo zhoršenia príznakov infekcie (t. j. sčervenanie, opuch, prehriatie, bolesť, horúčka) počas liečby Indometacinem 100 Berlin-Chemie je nutné ihneď navštíviť lekára.
- Hyperglykémia (zvýšená hladina cukru v krvi), glykozúria (vylučovanie cukru močom).
- Poškodenie tkaniva obličiek (intersticiálna nefritída, papilárna nekróza), ktoré môže byť sprevádzané akútou poruchou funkcie obličiek (renálna insuficiencia), bielkovinami v moči (proteínuria) a/alebo krvou v moči (hematúria). Veľmi zriedkavo sa rozvinie nefrotický syndróm (akumulácia vody v tele, vznik opuchov a zjavné vylučovanie proteínov močom).
Zníženie vylučovania moču, hromadenie vody v tele (opuchy), podobne ako pocit choroby, môžu byť príznakmi ochorenia obličiek až ich zlyhania.
V prípade vzniku týchto symptómov alebo ich zhoršenia musíte okamžite vysadiť Indometacin 100 Berlin-Chemie a informovať vášho lekára.
- Krvácanie z pošvy.
- Citlivosť na svetlo, lokalizované kožné krvácanie (purpura) a závažné kožné reakcie, ako je kožná vyrážka s pl'uzgiermi a sčervenaním (napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm).
- Vysoký krvný tlak.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- Po použití čapíkov sa môžu objaviť lokálne príznaky podráždenia sliznice, krvavá sliznica alebo bolestivé vyprázdrovanie stolice.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky

môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Indometacin 100 Berlin-Chemie

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Indometacin 100 Berlin-Chemie obsahuje

- Liečivo je indometacín. Jeden čapík obsahuje 100 mg indometacínu.
- Ďalšie zložky sú tuhý tuk a kukuričný škrob.

Ako vyzerá Indometacin 100 Berlin-Chemie a obsah balenia

Čapíky žltkastej farby torpéдовitého tvaru s vyhlíbenou bázou, balené v bielych PVC stripoch potiahnutých PE filmom.

Originálne balenie s 10 alebo 30 čapíkmi.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2024.