

Písomná informácia pre používateľa

Lamotrigine Neuraxpharm 25 mg tablety
Lamotrigine Neuraxpharm 50 mg tablety
Lamotrigine Neuraxpharm 100 mg tablety
Lamotrigine Neuraxpharm 200 mg tablety
lamotrigín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečíitali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Lamotrigine Neuraxpharm a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamotrigine Neuraxpharm
3. Ako užívať Lamotrigine Neuraxpharm
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lamotrigine Neuraxpharm
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Lamotrigine Neuraxpharm a na čo sa používa

Lamotrigine Neuraxpharm patrí do skupiny liekov nazývaných *antiepileptiká*. Používa sa na liečbu dvoch ochorení - **epilepsie a bipolárnej poruchy**.

Lamotrigine Neuraxpharm lieči epilepsiu tým, že v mozgu blokuje signály, ktoré spúšťajú epileptické záchvaty (záchvaty kŕčov).

- U dospelých a detí vo veku 13 a viac rokov sa Lamotrigine Neuraxpharm môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie. Lamotrigine Neuraxpharm v kombinácii s inými liekmi sa môže používať aj na liečbu epileptických záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri stave nazývanom Lennox-Gastautov syndróm.
- U detí vo veku od 2 do 12 rokov sa Lamotrigine Neuraxpharm v kombinácii s inými liekmi môže používať na liečbu uvedených stavov. Môže sa používať samostatne na liečbu epileptických záchvatov nazývaných záchvaty typu absencie.

Lamotrigine Neuraxpharm lieči aj bipolárnu poruchu.

Ludia s bipolárnou poruchou (niekedy nazývanou *maniodepresívna psychóza*) majú extrémne zmeny nálady, pri ktorých sa obdobia mánie (vzrušenia alebo eufórie) striedajú s obdobiami deprezie (hlbokého smútku alebo zúfalstva). U dospelých vo veku 18 a viac rokov sa Lamotrigine Neuraxpharm môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie obdobiam deprezie, ktoré sa vyskytujú pri bipolárnej poruche. Zatiaľ nie je známe, akým pôsobením v mozgu Lamotrigine Neuraxpharm dosahuje takýto účinok.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamotrigine Neuraxpharm

Neužívajte Lamotrigine Neuraxpharm:

- Ak ste alergický na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6).

Ak sa vás to týka:

Povedzte to svojmu lekárovi a neužívajte Lamotrigine Neuraxpharm.

Upozornenia a opatrenia

Bud'te zvlášť opatrny pri užívaní Lamotriginu Neuraxpharm.

Predtým, ako začnete užívať Lamotrigine Neuraxpharm, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- Ak máte akékoľvek problémy s obličkami.
- Ak u vás niekedy vznikla vyrážka po užíti lamotrigínu alebo iných liekov proti bipolárnej poruche alebo epilepsii.
- Ak sa u vás po užíti lamotrigínu a vystavení slnku alebo umelému svetlu (napr. v soláriu) objavila vyrážka alebo spálenie kože. Lekár skontroluje vašu liečbu a môže vám odporučiť, aby ste sa vyhli slnečnému žiareniu, alebo aby ste sa chránili proti slnku (napr. používaním opaľovacích prípravkov a/alebo nosením ochranného odevu).
- Ak u vás niekedy vznikla meningítida po užíti lamotrigínu (*prečítajte si opis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informácie: Zriedkavé vedľajšie účinky*).
- Ak už užívate liek, ktorý obsahuje lamotrigín.
- Ak máte ochorenie nazývané Brugada syndróm. Brugada syndróm (známy aj ako syndróm Brugadovcov či Brugadov syndróm) je genetické ochorenie, ktoré má za následok neobvyklú elektrickú aktivitu v srdci. Lamotrigín môže vyvolať zmeny na elektrokardiograme (EKG, elektrický záznam činnosti srdca), ktoré môžu viest' k poruchám srdcového rytmu (arytmiam).

Ak sa vás niektoré z tohto týka:

Povedzte to svojmu lekárovi, ktorý sa môže rozhodnúť, že zníži dávku alebo že Lamotrigine Neuraxpharm pre vás nie je vhodný.

Dôležité informácie o reakciách potenciálne ohrozujúcich život

U malého počtu ľudí užívajúcich Lamotrigine Neuraxpharm sa vyskytuje alergická reakcia alebo potenciálne život ohrozujúca kožná reakcia, ktorá môže prejsť do väčších problémov v prípade, keď sa nelieči. Medzi takéto reakcie môžu patriť Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxicá epidermálna nekrolýza (TEN) a lieková reakcia s eozinofiliou a systémovými príznakmi (DRESS).

Je potrebné, aby ste poznali príznaky, na ktoré si počas užívania Lamotriginu Neuraxpharm musíte dávať pozor. Toto riziko môže súvisieť s variantom v génoch u ľudí ázijského pôvodu (predovšetkým Han čínskeho a thajského). Ak ste takého pôvodu a v minulosti vám bolo zistené, že ste nositeľom tohto genetického variantu (HLA-B* 1502), porozprávajte sa o tom so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Lamotrigine Neuraxpharm.

Prečítajte si popis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informácie pod „*Reakcie ohrozujúce potenciálne život: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc*“.

Hemofagocytová lymfohistiocytóza (haemophagocytic lymphohistiocytosis, HLH)

U pacientov, ktorí užívajú lamotrigín, boli hlásené prípady zriedkavej, ale veľmi závažnej imunitnej reakcie.

Ihned kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, ak sa u vás počas užívania lamotrigínu vyskytnie ktorúkoľvek z nasledovných príznakov: horúčka, vyrážka, neurologické príznaky (napr. tras alebo chvenie, stavy zmätenosti, poruchy funkcie mozgu).

Myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu

Antiepileptiká sa používajú na liečbu niekoľkých ochorení, vrátane epilepsie a bipolárnej poruchy. Ľudia s bipolárnou poruchou niekedy môžu mať myšlienky na sebapoškodenie alebo na spáchanie samovraždy. Ak máte bipolárnu poruchu, výskyt takýchto myšlienok môže byť u vás pravdepodobnejší:

- ked' liečbu začínate prvýkrát
- ked' ste v minulosti mysleli na sebapoškodenie alebo na samovraždu
- ked' máte menej ako 25 rokov.

Ak máte tiesnívé myšlienky alebo tiesnívé pocity alebo ak počas užívania Lamotriginu Neuraxpharm zistíte, že sa cítite horšie alebo že máte nové príznaky:

Čo najskôr navštívte lekára alebo vyhľadajte pomoc v najbližšej nemocnici.

Môže byť pre vás užitočné, ak členovi rodiny, opatrovateľovi alebo blízkemu priateľovi poviete, že sa u vás môže objaviť depresia alebo významné zmeny nálady a požiadate ho, aby si prečíta túto písomnú informáciu. Mohli by ste ho požiadať, aby vám povedal, ked' si bude robiť starosti kvôli vašej depresii alebo iným zmenám vo vašom správaní.

Malý počet ľudí liečených antiepileptikami ako je Lamotrigine Neuraxpharm mal taktiež myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu. Ak budete mať kedykoľvek takéto myšlienky, ihned sa obráťte na svojho lekára.

Ak užívate Lamotrigine Neuraxpharm na epilepsiu

Záchvaty spojené s niektorými typmi epilepsie sa počas užívania Lamotriginu Neuraxpharm občas môžu zhoršiť alebo sa vyskytovať častejšie. Niektorí pacienti môžu mať silné záchvaty, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Ak sa počas liečby Lamotriginom Neuraxpharm vaše záchvaty vyskytujú častejšie alebo ak prekonáte ťažký záchvat:

Čo najskôr navštívte lekára.

Deti a dospievajúci

Lamotrigine Neuraxpharm sa nesmie predpísať na liečbu bipolárnej poruchy ľuďom mladším ako 18 rokov. Lieky na liečbu depresie a iných problémov duševného zdravia zvyšujú riziko samovražedných myšlienok a samovražedného správania u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Lamotrigine Neuraxpharm

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov rastlinného pôvodu alebo iných liekov kúpených bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vášho lekára musíte informovať, ak užívate iné lieky na liečbu epilepsie alebo problémov duševného zdravia. Je to kvôli tomu, aby sa uistil, že užívate správnu dávku Lamotriginu Neuraxpharm. Tieto lieky zahŕňajú:

- **oxkarbazepín, felbamát, gabapentín, levetiracetam, pregabalín, topiramát alebo zonisamid,** používajú sa na liečbu **epilepsie**
- **lítium, olanzapín alebo aripiprazol,** používajú sa na liečbu **problémov duševného zdravia**
- **bupropión,** používa sa na liečbu **problémov duševného zdravia** alebo na **odvykanie od fajčenia**
- **paracetamol** na liečbu bolesti a horúčky

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z týchto liekov.

Niekteré lieky sa s Lamotriginom Neuraxpharm navzájom ovplyvňujú alebo môžu zvyšovať pravdepodobnosť, že u ľudí vzniknú vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú:

- **valproát,** používa sa na liečbu **epilepsie a problémov duševného zdravia**
- **karbamazepín,** používa sa na liečbu **epilepsie a problémov duševného zdravia**

- **fenytoín, primidón alebo fenobarbital**, používajú sa na liečbu **epilepsie**
- **risperidón**, používa sa na liečbu **problémov duševného zdravia**
- **rifampicín**, čo je **antibiotikum**
- lieky, ktoré sa používajú na liečbu **infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)** (**kombinácia lopinaviru a ritonaviru alebo atazanaviru a ritonaviru**)
- **hormonálnu antikoncepciu**, napríklad **antikoncepčné tablety** (*pozri nižšie*)

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z týchto liekov, alebo ak niektorý z nich začnete alebo prestanete užívať.

Hormonálna antikoncepcia (antikoncepčné tablety) môže ovplyvniť spôsob, akým Lamotrigine Neuraxpharm účinkuje

Vás lekár vám môže odporučiť, aby ste používali konkrétny druh hormonálnej antikoncepcie, alebo iný spôsob antikoncepcie, ako napríklad prezervatív, pesar alebo vnútromaternicové teliesko. Ak používate hormonálnu antikoncepciu, ako antikoncepčné tablety, váš lekár vám môže odoberať vzorky krvi na kontrolu hladiny Lamotrigina Neuraxpharm. Ak používate hormonálnu antikoncepciu, alebo ak plánujete, že ju začnete používať:

Informujte o tom svojho lekára, ktorý sa s vami porozpráva o vhodných spôsoboch antikoncepcie.

Lamotrigine Neuraxpharm môže, naopak, ovplyvniť spôsob, akým účinkuje hormonálna antikoncepcia, aj keď nie je pravdepodobné, že zníži jej účinnosť. Ak používate hormonálnu antikoncepciu a spozorujete akýkoľvek zmeny v charaktere menštruačného krvácania, ako je medzimenoštruačné krvácanie alebo špinenie:

Povedzte to svojmu lekárovi. Môžu to byť prejavy toho, že Lamotrigine Neuraxpharm ovplyvňuje spôsob, akým vaša antikoncepcia účinkuje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

- Liečbu nesmiete ukončiť bez toho, že by ste sa o tom porozprávali so svojím lekárom. Je to zvlášť dôležité, ak máte epilepsiu.
- Tehotenstvo môže zmeniť účinnosť Lamotrigina Neuraxpharm, a preto môžete potrebovať krvné vyšetrenia a vaša dávka Lamotrigina Neuraxpharm môže byť upravená
- Existuje malé zvýšenie rizika vrodených chýb, zahŕňajúcich rázstupy pery alebo rázstupy podnebia, ak sa Lamotrigine Neuraxpharm užíva počas prvých troch mesiacov tehotenstva.
- Vás lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali výživové doplnky s obsahom kyseliny listovej, ak plánujete otehotniť, a počas tehotenstva.

Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Liečivo Lamotrigine Neuraxpharm prechádza do materského mlieka a môže mať vplyv na vaše dieťa. Vás lekár s vami prekonzultuje riziká a prínosy dojčenia počas užívania Lamotrigina Neuraxpharm a ak sa rozhodnete dojčiť, lekár priebežne skontroluje, či sa u vášho dieťaťa nevyskytuje ospalosť, vyrážka alebo nedostatočný prírastok telesnej hmotnosti. Ak u vášho dieťaťa spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom svojho lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lamotrigine Neuraxpharm môže spôsobovať závraty a dvojité videnie.

Nevedťte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že sa u vás takéto príznaky nevyskytujú.

Ak máte epilepsiu, porad'te sa so svojím lekárom o vedení vozidla a obsluhe strojov.

Lamotrigine Neuraxpharm obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Lamotrigine Neuraxpharm obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Lamotrigine Neuraxpharm

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aká dávka Lamotriginu Neuraxpharm sa užíva

Môže trvať istý čas, kým sa zistí dávka Lamotriginu Neuraxpharm, ktorá je pre vás najlepšia. Dávka, ktorú budete užívať, bude závisieť:

- od vášho veku
- od toho, či užívate Lamotrigine Neuraxpharm v kombinácii s inými liekmi
- od toho, či máte nejaké problémy s obličkami alebo pečeňou

Váš lekár vám na začiatku liečby predpíše nízku dávku a počas niekoľkých týždňov bude dávku postupne zvyšovať, kým sa nedosiahne dávka, ktorá u vás účinkuje (nazývaná **účinná dávka**). **Nikdy neužívajte viac Lamotriginu Neuraxpharm, ako vám povie váš lekár.**

U dospelých a detí vo veku 13 a viac rokov je zvyčajná účinná dávka Lamotriginu Neuraxpharm v rozsahu od 100 mg do 400 mg denne.

U detí vo veku od 2 do 12 rokov závisí účinná dávka od ich telesnej hmotnosti - zvyčajne je v rozsahu od 1 mg do 15 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti dieťaťa, pričom najvyššia udržiavacia dávka je 200 mg denne.

Lamotrigine Neuraxpharm sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.

Ako sa dávka Lamotriginu Neuraxpharm užíva

Užívajte dávku Lamotriginu Neuraxpharm jedenkrát alebo dvakrát denne, ako vám odporučil váš lekár. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Váš lekár vám taktiež môže odporučiť, aby ste začali alebo prestali užívať iné lieky, a to v závislosti od ochorenia, na ktoré sa liečite a od toho, ako vaše telo reaguje na liečbu.

Tabletu je možno rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Vždy užívajte plnú dávku, ktorú vám predpísal váš lekár. Nikdy neužívajte iba časť dávky.

Ak užijete viac Lamotriginu Neuraxpharm, ako máte

Ihned kontaktujte lekára alebo najbližšiu lekársku pohotovosť. Ak je to možné, ukážte mu balenie Lamotriginu Neuraxpharm.

Ak užijete príliš veľkú dávku Lamotriginu Neuraxpharm, môže byť u vás väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných vedľajších účinkov, ktoré môžu byť smrtelné..

Niekto, kto užil príliš veľkú dávku Lamotriginu Neuraxpharm, môže mať akýkoľvek z týchto príznakov:

- rýchle, neovládateľné pohyby očí (*nystagmus*)
- nemotornosť alebo nedostatočná koordinácia pohybov ovplyvňujúca rovnováhu (*ataxia*)
- zmeny srdcového rytmu (zvyčajne zistené na elektrokardiograme)
- strata vedomia, epileptické záchvaty (kŕče) alebo kóma

Ak zabudnete užiť jednu dávku Lamotriginu Neuraxpharm

Neužívajte tablety navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.

Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku Lamotriginu Neuraxpharm

Poradte sa so svojím lekárom o tom, ako máte Lamotrigine Neuraxpharm znova začať užívať. Je dôležité, aby ste sa s ním o tom poradili.

Ak prestanete užívať Lamotrigine Neuraxpharm

Neprestaňte užívať Lamotrigine Neuraxpharm bez odporúčania lekárom.

Lamotrigine Neuraxpharm musíte užívať tak dlho, ako vám odporučí váš lekár. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užívate Lamotrigine Neuraxpharm na epilepsiu

Pri ukončovaní liečby Lamotriginom Neuraxpharm **je dôležité, aby sa dávka znižovala postupne**, a to počas približne 2 týždňov. Ak Lamotrigine Neuraxpharm prestanete užívať náhle, príznaky vašej epilepsie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť.

Ak užívate Lamotrigine Neuraxpharm na bipolárnu poruchu

Môže trvať istý čas, kým Lamotrigine Neuraxpharm začne účinkovať, a preto sa pravdepodobne nebudeste cítiť lepšie ihneď. Pri ukončovaní liečby Lamotriginom Neuraxpharm vašu dávku nie je nutné znižovať postupne. Napriek tomu sa však najskôr porozprávajte so svojím lekárom, ak Lamotrigine Neuraxpharm chcete prestať užívať.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Reakcie ohrozujúce potenciálne život: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

U malého počtu ľudí užívajúcich Lamotrigine Neuraxpharm sa vyskytuje alergická reakcia alebo kožná reakcia potenciálne ohrozujúca život, ktorá môže prejsť do väčnejších problémov v prípade, keď sa nelieči.

Výskyt týchto príznakov je pravdepodobnejší počas niekoľkých prvých mesiacov liečby Lamotrinom Neuraxpharm, najmä ak je počiatocná dávka príliš vysoká alebo ak sa dávka zvyšuje príliš rýchlo alebo ak sa Lamotrigine Neuraxpharm užíva s ďalším liekom nazývaným *valproát*. Niektoré z týchto príznakov sa častejšie vyskytujú u detí, a preto sa musia rodičia zvlášť pozorne zamerať na ich vznik.

Príznaky týchto reakcií zahŕňajú:

- kožné vyrážky alebo začervenanie kože, ktoré môžu prejsť do kožných reakcií ohrozujúcich život zahŕňajúcich rozsiahlu vyrážku spojenú s tvorbou pluzgierov a odlupovaním kože, najmä v oblasti úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (*Stevensov-Johnsonov syndróm*), rozsiahle odlupovanie kože (viac než na 30 % plochy tela - *toxická epidermálna nekrolýza*) alebo rozsiahle vyrážky s postihnutím pečene, krví a iných orgánov tela (lieková reakcia s eozinofiliou a systémovými príznakmi, ktorá je tiež známa ako DRESS alebo syndróm z precitlivenosti)
- vriedky v ústach, hrdle, nose alebo na pohlavných orgánoch
- boľavé ústa alebo červené a opuchnuté oči (*konjunktivítida*)
- vysokú teplotu (horúčku), príznaky podobné chrípke alebo ospalosť
- opuch v oblasti tváre alebo opuchnuté uzliny na krku, v podpazuši alebo v slabinách

- nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin, alebo zmodranie prstov na rukách
- bolesť hrdla, alebo častejšie infekcie (ako je prechladnutie) ako zvyčajne
- zvýšené hladiny pečeňových enzymov zistené krvnými vyšetreniami
- zvýšenie počtu druhu bielych krviniek (eozinofilov)
- zväčšené lymfatické uzliny
- postihnutie orgánov tela vrátane pečene a obličiek.

V mnohých prípadoch budú tieto príznaky prejavmi menej závažných vedľajších účinkov. Musíte však mať na pamäti, že môžu byť potenciálne život ohrozujúce a môžu prejsť do väčnejších problémov, akým je zlyhanie orgánov, a to v prípade, keď sa neliečia. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, **ihned kontaktujte lekára**. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám urobí vyšetrenia pečene, obličiek alebo krvi a môže vám povedať, aby ste Lamotrigine Neuraxpharm prestali užívať. Ak u vás vznikne Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxicická epidermálna nekrolýza, váš lekár vám povie, že lamotrigín už nesmiete nikdy znova začať užívať.

Hemofagocytová lymfohistiocytóza (HLH) (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamotrigine Neuraxpharm“).

Veľmi časté:

môžu postihovať **viac ako 1 z 10** osôb:

- bolesť hlavy
- kožná vyrážka

Časté:

môžu postihovať **menej ako 1 z 10** osôb:

- agresivita alebo podráždenosť
- ospalosť alebo spavosť
- závraty
- tras alebo chvenie rúk
- ťažkosti so spánkom (insomnia)
- nepokoj (agitovanosť)
- hnačka
- suchosť v ústach
- napínanie na vracanie (nauzea) alebo vracanie (dávenie)
- únava
- bolesť chrbta, klíbov alebo ktorejkoľvek časti tela

Menej časté:

môžu postihovať **menej ako 1 zo 100** osôb:

- nemotornosť a nedostatočná koordinácia pohybov (ataxia)
- dvojité videnie alebo rozmazané videnie
- nezvyčajné vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopecia)
- kožná vyrážka alebo spálenie kože po vystavení slnku alebo umelému svetlu (photosenzitivita)

Zriedkavé:

môžu postihovať **menej ako 1 z 1 000** osôb:

- život ohrozujúca kožná reakcia (Stevensov-Johnsonov syndróm): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
- skupina príznakov spolu zahŕňajúca:
horúčku, napínanie na vracanie, vracanie, bolesť hlavy, stuhnutú šiju a mimoriadnu citlivosť na jasné svetlo. Tieto príznaky môžu byť spôsobené zápalom blán, ktoré pokrývajú mozog a miechu

(*meningitída*). Tieto príznaky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby, avšak ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, **kontaktujte svojho lekára**.

- rýchle, neovládateľné pohyby očí (*nystagmus*)
- svrbenie očí spojené s výtokom z očí a chrastavením očných viečok (*konjunktivítida*)

Veľmi zriedkavé:

môžu postihovať **menej ako 1 z 10 000** osôb:

- život ohrozujúca kožná reakcia (toxická epidermálna nekrolýza): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
- lieková reakcia s eozinofiliou a systémovými príznakmi (DRESS)
- vysoká teplota (horúčka): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
- opuch v oblasti tváre (edém) alebo opuchnuté uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách (lymfadenopatia): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
- zmeny funkcie pečene, ktoré sa ukážu v krvných vyšetreniach, alebo zlyhanie pečene: pozrite si aj informácie na začiatku časti 4
- závažná porucha zrážania krví, ktorá môže spôsobiť nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin (diseminovaná intravaskulárna koagulácia): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
- hemofagocytová lymfohistiocytóza (HLH) (pozri časť 2 Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamotrigine Neuraxpharm)
- zmeny, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach - zahŕňajúce znížený počet červených krviniek (anémia), znížený počet bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza), znížený počet krvných doštičiek (trombocytopenia), znížený počet všetkých druhov krvných buniek (pancytopénia) a porucha kostnej dreny nazývaná aplastická anémia
- halucinácie (človek „vidí“ veci alebo „počuje“ zvuky, ktoré nie sú skutočné)
- zmätenosť
- pocit neistoty alebo nestability pri chôdzi
- neovládateľné opakované telesné pohyby a/alebo zvuky alebo slová (tiky), neovládateľné svalové stŕahy postihujúce oči, hlavu a trup (choreatetóza) alebo iné nezvyčajné telesné pohyby, ako sú zášklby, tras alebo strnulosť
- častejší výskyt epileptických záхватov u ľudí, ktorí už majú epilepsiu
- zhoršenie parkinsonovských príznakov u ľudí, ktorí už majú Parkinsonovu chorobu
- reakcia podobná lupusu (príznaky môžu zahŕňať: bolest chrbta alebo kĺbov, ktorá niekedy môže byť sprevádzaná horúčkou a/alebo pocitom, že ste chorý)

Ďalšie vedľajšie účinky

U malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale presná frekvencia ich výskytu nie je známa:

- prípady porúch kostí vrátane osteopénie a osteoporózy (rednutie kostí) a zlomenín. Poradťte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak antiepileptikum užívate dlhodobo, ak sa u vás v minulosti vyskytla osteoporóza alebo ak užívate steroidy.
- zápal obličiek (tubulointersticiálna nefritída) alebo zápal obličiek aj oka (syndróm tubulointersticiálnej nefritídy s uveítídou)
- nočné mory
- oslabená imunita kvôli nižším hladinám protilátok v krvi nazývaných imunoglobulíny, ktoré pomáhajú chrániť pred infekciou
- červené uzlíky alebo fláky na koži (pseudolymfóm)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Lamotrigine Neuraxpharm

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po „EXP:“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lamotrigine Neuraxpharm nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lamotrigine Neuraxpharm obsahuje

Liečivo je lamotrigín

Každá 25 mg tableta obsahuje 25 mg lamotrigínu.

Každá 50 mg tableta obsahuje 50 mg lamotrigínu.

Každá 100 mg tableta obsahuje 100 mg lamotrigínu.

Každá 200 mg tableta obsahuje 200 mg lamotrigínu.

Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, žltý oxid železitý (E172), povidón K30, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), stearát horečnatý, mastenec, koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Ako vyzerá Lamotrigine Neuraxpharm a obsah balenia

Lamotrigine Neuraxpharm 25 mg sú svetlo žlté, okrúhle, ploché, neobalené tablety, z jednej strany s deliacou ryhou, s polomerom 6,03 mm – 6,67 mm.

Lamotrigine Neuraxpharm 50 mg sú svetlo žlté, okrúhle, ploché, neobalené tablety, z jednej strany s deliacou ryhou, s polomerom 7,54 mm – 8,34 mm.

Lamotrigine Neuraxpharm 100 mg sú svetlo žlté, okrúhle, ploché, neobalené tablety, z jednej strany s deliacou ryhou, s polomerom 9,80 mm – 10,84 mm.

Lamotrigine Neuraxpharm 200 mg sú svetlo žlté, okrúhle, ploché, neobalené tablety, z jednej strany s deliacou ryhou, s polomerom 12,32 mm – 13,08 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Tablety sú balené v PVC/Alu blistroch.

Veľkosť balenia:

Lamotrigine Neuraxpharm 25 mg tablety: 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 alebo 100 tabliet

Lamotrigine Neuraxpharm 50 mg tablety: 14, 28, 30, 42, 50, 56, 90, 98 alebo 100 tabliet

Lamotrigine Neuraxpharm 100 mg tablety: 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98 alebo 100 tabliet

Lamotrigine Neuraxpharm 200 mg tablety: 28, 30, 42, 50, 56 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
náměstí Republiky 1078/1
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

Výrobca

SVUS Pharma a.s.
Smetanova nábřeží 1238/20a
500 02 Hradec Králové
Česká republika

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
pod nasledovnými názvami:**

Česká republika: Lamotrigine Neuraxpharm
Slovensko: Lamotrigine Neuraxpharm 25, 50, 100, 200 mg tablety

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2024.