

Písomná informácia pre používateľa

Legalon 140 140 mg kapsuly

suchý extrakt z plodov rastliny pestrec mariánsky

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Legalon 140 a na čo sa užíva
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Legalon 140
3. Ako užívať Legalon 140
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Legalon 140
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Legalon 140 a na čo sa používa

Silymarín, liečivo rastlinného pôvodu Legalonu 140, pôsobí ako stabilizátor bunkových membrán, a tým umožňuje ochranu pečene pred škodlivými vplyvmi a obnovu už poškodených pečeňových buniek.

To sa prejaví zlepšením celkového zdravotného stavu, zmiernením tráviacich ťažkostí, zvýšením chuti do jedla a prírastkom telesnej hmotnosti u pacientov, ktorí schudli následkom ochorenia pečene, zlepšením biochemického nálezu pečene a normalizáciou funkčných parametrov pečene.

Liek sa používa pri toxickom poškodení pečene, na podpornú liečbu pacientov s dlhodobými zápalovými ochoreniami pečene a cirhózou pečene.

Upozornenie

Liečba Legalonom 140 je úspešná iba vtedy, ak sa vylúči pôsobenie toxického činiteľa vyvolávajúceho poškodenie pečene (napr. alkohol).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Legalon 140

Neužívajte Legalon 140

- Ak ste alergický na silymarín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Legalon 140, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Liek nie je vhodný pri náhlych otravách.

Pri objavení sa príznakov žltacky vyhľadajte lekára.

Iné lieky a Legalon 140

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

K dispozícii nie sú údaje o používaní Legalonu 140 počas tehotenstva a dojčenia.

Ošetrojúci lekár vám môže predpísať tento liek v tehotenstve a počas dojčenia, ak existujú dostatočné dôvody na jeho použitie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, či Legalon 140 ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Legalon 140 obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v kapsule, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Legalon 140

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčí inak, odporúčaná dávka na začiatku liečby a vo vážnych prípadoch je 1 kapsula 3-krát denne. Udržiavacia dávka je 1 kapsula 2-krát denne.

Kapsulu prehltajte celú a zapite dostatočným množstvom tekutiny (perorálne použite).

Ak užijete viac Legalonu 140, ako máte

Príznaky predávkovania neboli pozorované. Pri predávkovaní liekom sa môžu vo zvýšenej miere prejaviť vedľajšie účinky. O prípadnej liečbe rozhodne lekár.

Ak zabudnete užiť Legalon 140

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Príležitostne bol zaznamenaný mierny preháňajúci účinok, tráviace problémy, výnimočne alergické reakcie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Legalon 140

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum expirácie). Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Legalon 140 obsahuje

- Liečivo je silymarín.
Jedna kapsula obsahuje 173,0 - 186,7 mg suchého extraktu z plodov rastliny pestrec mariánsky, čo zodpovedá 140 mg silymarínu (extrakčné činidlo: etylacetát > 96,7 %).
- Ďalšie zložky sú povidón, stearát horečnatý, polysorbát 80, manitol, karboxymetylškrob, želatína, oxid titaničitý (E171), laurylsíran sodný, červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Legalon 140 a obsah balenia

Legalon 140 sú hnedé kapsuly obsahujúce žltý prášok, dodávané v PVC/Al blistroch v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 20, 30, 50, 60 a 100 kapsúl, nemocničné balenie 2000 kapsúl (20 x 100).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Viatrix Healthcare Limited

Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Írsko

Výrobca

Madaus GmbH,

Lütticher Str. 5, 53842 Troisdorf, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2025.