

TEHOTENSTVO, PLODNOSŤ, DOJČENIE

Neužívajte Ferriprox, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotniť alebo dojčíte. Ferriprox môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa.

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte počas liečby Ferriproxom, oznámte to svojmu lekárovi a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ženám, ktoré môžu otehotniť, sa počas liečby Ferriproxom a 6 mesiacov po poslednej dávke odporúča používať účinnú antikoncepciu. Mužom sa počas liečby Ferriproxom a 3 mesiace po poslednej dávke odporúča používať účinnú antikoncepciu. Poradte sa s vaším lekárom, aká metóda je pre vás najvhodnejšia.

KARTA PRE PACIENTA

Dôležité bezpečnostné upozornenia pre pacientov užívajúcich Ferriprox (deferiprón)

Predpisujúci lekár: _____

Tel.: _____

SLEDOVANIE POČTU BIELYCH KRVINIEK POČAS UŽÍVANIA FERRIPROXU

Existuje malá možnosť, že sa u vás počas užívania Ferriproxu vyvinie agranulocytóza (veľmi nízky počet bielych krviniek), čo môže viesť k vážnym infekciám.

Aj keď agranulocytóza postihuje iba 1 až 2 užívateľov zo 100, je dôležité, aby vám bolo pravidelne vykonané vyšetrenie krvi.

Dodržiavajte nasledovné opatrenia:

1. Nechať si každý týždeň vyšetriť krv počas prvého roku liečby Ferriproxom a potom tak pravidelne, ako to odporučí lekár.
2. Ak sa u vás objavia nejaké príznaky infekcie, ako sú napr. horúčka, bolesť hrdla alebo príznaky podobné chrípke, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Do 24 hodín musí byť totiž skontrolovaný počet bielych krviniek vo vašej krvi na zistenie potenciálnej agranulocytózy.