

	60 mm		
280 mm	Karta pacienta MSN Labs Europe Limited Diwleiz 2,5 mg ☐ Diwleiz 10 mg ☐ Diwleiz 15 mg ☐ Diwleiz 20 mg ☐ ◆ Túto kartu noste vždy so sebou ◆ Túto kartu ukážte pred ošetrením každému lekárovi alebo zubnému lekárovi Užívam antikoagulačnú liečbu Diwleizom (rivaroxabán) Meno: Adresa: Dátum narodenia: Hmotnosť: Iné lieky / ochorenia: V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte: Meno lekára: Telefón lekára: Pečiatka lekára:	28 mm	
	Informujte, prosím, aj: Meno: Telefón: Vzťah k pacientovi:	28 mm	
	Informácia pre zdravotníckych pracovníkov: ◆ Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Diwleizu.	28 mm	
	Čo mám vedieť o Diwleizu? ◆ Diwleiz riedi krv, čím zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín. ◆ Diwleiz sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín nikdy nevynechajte dávku. ◆ Diwleiz nesmiete prestať užívať bez	28 mm	
	toho, aby ste sa najprv porozprávali s vaším lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť. ◆ Predtým, ako začnete užívať Diwleiz, povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať. ◆ Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Diwleiz.	28 mm	
	Kedy mám vyhľadať pomoc svojho lekára? Ked užívate liek na riedenie krvi, ako je Diwleiz, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších účinkov tohto lieku. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, Diwleiz nezačnite užívať bez toho, aby ste sa o tom najskôr porozprávali so svojím lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce: ◆ bolesť ◆ opuch alebo pocit nepohodlia ◆ bolesť hlavy, závrat alebo slabosť ◆ nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, pri ktorých zastavenie krvácania trvá dlho ◆ menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne ◆ krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica ◆ vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina	28 mm	
	Ako mám užívať Diwleiz? ◆ Na zabezpečenie optimálnej ochrany Diwleizom: - 2,5 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla - 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla - 15 mg sa musí užívať s jedlom - 20 mg sa musí užívať s jedlom	28 mm	
		 DXXXXXX-XX	28 mm