

## Písomná informácia pre používateľa

### Flector Rapid 50 mg granulát

epolamínová soľ diklofenaku

#### **Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

#### **V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:**

1. Čo je Flector Rapid 50 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flector Rapid 50 mg
3. Ako užívať Flector Rapid 50 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Flector Rapid 50 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Flector Rapid 50 mg a na čo sa používa**

Diklofenak je nesteroidové protizápalové liečivo odvodené od fenylooctovej kyseliny zo skupiny arylkarboxylových kyselín.

Má nasledovné vlastnosti: analgetické (znižuje pocit bolesti), antipyretické (znižuje horúčku), antireumatické (pôsobí proti reume), antiflogistické (pôsobí proti zápalu) a krátkodobo inhibuje doštičkové funkcie (pôsobí proti zrážaniu krvi).

Klinické štúdie zaznamenali, že klinický účinok Flectoru Rapid 50 mg začína 15 minút po užití.

Indikácie sú v súlade s protizápalovým účinkom diklofenaku, závisia od závažnosti nástupu prejavov neznašanlivosti spôsobených liekom v skupine protizápalových liekov dostupných v súčasnosti.

Užívanie tohto lieku je určené len pre dospelých a dospevajúcich nad 15 rokov na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnych stavov:

kĺbový reumatizmus, mikrokryštalická artritída, osteoartróza, bolesti chrbta a chrbtice radikulítida, poúrazová bolesť, zápal a opuch, napr. pri vyvrnutí kĺbov, pooperačná bolesť, zápal a opuch, napr. po chirurgických zákrokoch v stomatológii, alebo ortopédii, bolestivé a/alebo zápalové stavy v gynekológii, napr. menštruačné bolesti, zápal vaječníkov, záchvaty, migrény, bolestivé syndrómy chrbtice, ako adjuvans pri závažných bolestivých zápalových infekciách ucha, nosa alebo hrdla.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flector Rapid 50 mg**

##### **Neužívajte Flector Rapid 50 mg**

- ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- od 6. mesiaca tehotenstva, v prípade, že sa v anamnéze vyskytla alergia alebo astma, ktorá sa začala užívaním diklofenaku alebo podobných liečiv (iných nesteroidových protizápalových

liekov - NSAID),

- ak si myslíte, že môžete byť alergický na diklofenak, aspirín, ibuprofén alebo ktorýkoľvek iný protizápalový liek zo skupiny NSAID. Prejavy reakcie z precitlivenosti zahŕňajú opuch tváre a úst (angioedém), problémy s dýchaním, bolesť na hrudi, nádchu, kožnú vyrážku alebo akúkoľvek inú alergickú reakciu.
- ak máte gastroduodenálny vred,
- ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek,
- ak máte závažné poškodenie funkcie pečene,
- ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass,
- ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie),
- ak máte fenylketonúriu (z dôvodu prítomnosti aspartámu),
- ak máte neznášanlivosť na fruktózu (z dôvodu prítomnosti sorbitolu),
- u detí do 15 rokov.

Flector Rapid 50 mg sa nesmie užívať v kombinácii s:

- perorálnymi antikoagulanciami,
- inými NSAID liekmi (vrátane vysokých dávok salicylátov),
- heparínmi (parenterálne podávanie),
- lítiom,
- metotrexátom (podávaným v dávkach vyšších ako 15 mg/týždeň),
- tiklopídinom.

### **Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Flector Rapid 50 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste nedávno podstúpili alebo máte podstúpiť operáciu žalúdka alebo črevného traktu, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Flector Rapid 50 mg, pretože Flector Rapid 50 mg môže niekedy zhoršiť hojenie pooperačných rán v črevách.
- ak sa u vás niekedy po užívaní lieku Flector Rapid 50 mg alebo iných liekov na bolesť objavila závažná kožná vyrážka alebo olupovanie kože, pľuzgiere a/alebo vriedky na ústach.

Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

- fajčíte
- máte cukrovku
- máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.

### **Iné lieky a Flector Rapid 50 mg**

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky alebo liekové skupiny môžu spôsobovať hyperkaliémiu: soli kália, kálium šetriace diuretiká, inhibitóry konvertujúcich enzýmov, inhibítory angiotenzínu II, nesteroidové protizápalové lieky, heparíny (s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo nefrakcionované), cyklosporín, takrolimus a trimetoprim. Výskyt hyperkaliémie môže závisieť od kombinácie faktorov.

Riziko je väčšie v prípade kombinácie s vyššie uvedenými liekmi.

Súčasné podávanie diklofenaku s týmito liečivami vyžaduje pozorné sledovanie klinického stavu pacienta.

### **Flector Rapid 50 mg a jedlo a nápoje**

Najvhodnejšie je užívať liek počas jedla, v prípade akútnej bolesti sa odporúča užívať pred jedlom.

### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

#### Tehotenstvo:

Neužívajte tento liek, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť vaše nenaistené dieťa alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom u vášho nenaisteného dieťaťa. Môže ovplyvniť náchylnosť vás a vášho dieťaťa ku krvácaniu a spôsobiť, že pôrod bude neskorší alebo dlhší, ako sa očakávalo. Flector Rapid 50 mg nemáte užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokial to nie je absolútne nevyhnutné a ak vám to neodporučí váš lekár. Ak potrebujete liečbu počas tohto obdobia alebo kým sa pokúšate otehotniť, má sa použiť najnižšia dávka počas čo najkratšieho času. Ak sa Flector Rapid 50 mg užíva dlhšie ako niekoľko dní od 20. týždňa tehotenstva, môže u vášho nenaisteného dieťaťa spôsobiť problémy s obličkami, ktoré môžu viesť k nízkej hladine plodovej vody obklopujúcej dieťa (oligohydramnión) alebo k zúženiu cievky (*ductus arteriosus*) v srdci dieťaťa. Ak potrebujete liečbu dlhšiu ako niekoľko dní, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie sledovanie.

#### Dojčenie:

Flector Rapid 50 mg sa nemá užívať, ak dojčite, pretože môže byť škodlivý pre vaše dieťa. Ak dojčite, povedzte to svojmu lekárovi.

#### Plodnosť:

Flector Rapid 50 mg patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu mať vplyv na plodnosť žien. Tento účinok sa dá zvrátiť po vysadení lieku.

Používanie Flectoru Rapid 50 mg sa preto neodporúča u žien, ktoré sa pokúšajú otehotniť, majú ľažkosti s otehotnením alebo sa u nich vyšetruje neplodnosť.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Pacienti s možným výskytom závratu, ospanlivosti a zrakovými problémami nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

### **Flector Rapid 50 mg obsahuje aspartám a sorbitol**

Tento liek obsahuje 50 mg aspartámu v každom vrecku. Aspartám je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý, ak máte fenylketonúriu (skratka PKU z anglického phenylketonuria), zriedkavú genetickú poruchu, pri ktorej sa hromadí látka fenylalanín, pretože telo ju nevie správne odstrániť.

Tento liek obsahuje 1703 mg sorbitolu v každom vrecku. Sorbitol je zdrojom fruktózy. Ak vám (alebo vášmu dieťaťu) lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, alebo ak vám bola diagnostikovaná dedičná neznášanlivosť fruktózy (skratka HFI, z anglického hereditary fructose intolerance), zriedkavé genetické ochorenie, pri ktorom človek nedokáže spracovať fruktózu, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako vy (alebo vaše dieťa) užijete alebo dostanete tento liek.

### **3. Ako užívať Flector Rapid 50 mg**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### Spôsob podávania

Perorálne použitie (užívanie ústami) - granulát musí byť rozpustený v pohári vody.

Najvhodnejšie je užívať počas jedla, v prípade akútnej bolesti sa odporúča užívať pred jedlom.

### Dávkovanie a dĺžka užívania

Odporúčaná dávka je 1 vrecko 3-krát denne, maximálne počas 7 dní.

### **Ak užijete viac Flectoru Rapid 50 mg, ako máte**

Ak užijete viac Flectoru Rapid 50 mg, ako máte, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocničnú pohotovosť.

### **Ak zabudnete užiť Flector Rapid 50 mg**

Užite dávku čo najskôr ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.  
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Posúdenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcej frekvencii výskytu:

<b>Veľmi časté:</b>	môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
<b>Časté:</b>	môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
<b>Menej časté:</b>	môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
<b>Zriedkavé:</b>	môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
<b>Veľmi zriedkavé:</b>	môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
<b>Neznáme:</b>	častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Prestaňte užívať Flector Rapid 50 mg a ihneď vyhľadajte lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – možno budete potrebovať urgentné lekárske ošetrenie:  
• závažná alergická kožná reakcia, ktorá môže zahrňať veľké rozsiahle červené a/alebo tmavé škvŕny, opuch kože, pľuzgiere a svrbenie (generalizovaná bulózna fixná lieková erupcia).

#### Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: leukopénia, agranulocytóza, trombocytopénia s/bez purpury, medulárna aplázia, slabá hemolytická aktivita.

#### Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: bolesti hlavy, závraty.

Veľmi zriedkavé: ospalivosť, kŕče, aseptická meningitída, poruchy spánku, podráždenosť, slabosť, triaška, poruchy videnia, parestézie, zrakové ťažkosti (zahmelené videnie, dvojité videnie), bzukot v uchu.

#### Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: na začiatku liečby nauzea, vracanie, hnačka, kŕče v bruchu, epigastrické bolesti, dyspepsia, nechutenstvo, organie.

Veľmi zriedkavé: gastroduodenálny vred, perforácia alebo krvácanie z GIT, hemoragická kolítida, exacerbácia ulceróznej kolítidy. Pozorovala sa pankreatída a prípady obstipácie.

#### Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: zvýšenie sérových transamináz.

Veľmi zriedkavé: hepatíta s/bez žltačky, fulminantná hepatíta.

#### Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé: alopecia, fotoalergické reakcie, bulózne erupcie, Stevensov-Johnsonov syndróm,

toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm) a erytrodermia.

Neznáme: alergická kožná reakcia, ktorá môže zahŕňať okrúhle alebo oválne škvurny začervenania a opuch kože, pľuzgiere a svrbenie (fixná lieková erupcia). Môže sa vyskytnúť aj stmavnutie kože v postihnutých oblastiach, ktoré môže pretrvávať aj po hojení. Fixná lieková erupcia sa zvyčajne znova vyskytuje na rovnakom mieste (miestach), ak sa liek užíva znova.

#### **Poruchy obličiek a močových ciest:**

Veľmi zriedkavé: periférne edémy, akútnej renálnej insuficiencii, močové anomálie (hematúria, proteinúria), intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, papilárna nekróza, hyperkaliémia pri hyporeninizme.

#### **Celkové poruchy a poruchy v mieste podania:**

Zriedkavé: Dermatologické: kožné vyrážky, žihľavka, ekzémy.

Respiračné: bronchospazmy, hypersenzitívna pneumonitída.

Veľmi zriedkavé: vaskulítida (vrátane Debrejovej-Lamiovej purury), hypotenzie, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie hlavne u subjektov s alergiou na kyselinu acetyl salicylovú.

V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca.

Lieky, ako je Flector Rapid, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porázky.

#### **Nežiaduce účinky sorbitolu:**

Možnosť tráviacich tăžkostí a hnačky.

Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihned to povedzte svojmu lekárovi:

- Mierne kŕče a bolestivosť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí liečby liekom Flector Rapid 50 mg a po ktorých nasleduje rektálne krvácanie (krvácanie z konečníka) alebo krvavá hnačka zvyčajne do 24 hodín po nástupe abdominálnej bolesti (bolest brucha) (neznáma frekvencia, nie je možné ju odhadnúť z dostupných údajov).
- Bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenciálne závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm.

#### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Flector Rapid 50 mg**

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a vrecku po EXP. Ak je dátum exspirácie uvedený vo formáte mesiac/rok, dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

## **Čo Flector Rapid 50 mg obsahuje**

- Liečivo je epolamínová soľ diklofenaku.
- Jedno vrecko obsahuje diklofenak vo forme 65 mg epolamínevej soli diklofenaku, čo zodpovedá 50 mg sodnej soli diklofenaku.
- Ďalšie zložky sú: sorbitol, aspartám, drasel'ná soľ acesulfámu, povidón, broskyňová aróma, aróma mäty piepornej.

## **Ako vyzerá Flector Rapid 50 mg a obsah balenia**

Granulát vo forme kryštalického prášku bielej až slonovinovej farby.

Flector Rapid 50 mg je dostupný v balení po 10, 20 alebo 21 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

## **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

### Výrobca:

IBSA Farmaceutici Italia Srl, Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Taliansko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2025.**