

## **Písomná informácia pre používateľa**

**Carvedilol-Teva 6,25 mg**

**Carvedilol-Teva 12,5 mg**

**Carvedilol-Teva 25 mg**

tablety

karvedilol

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Carvedilol-Teva a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Carvedilol-Teva
3. Ako užívať Carvedilol-Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Carvedilol-Teva
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### **1. Čo je Carvedilol-Teva a na čo sa používa**

Karvedilol patrí do skupiny liečiv nazývaných beta-blokátory. Beta-blokátory uvoľňujú a rozširujú stenu krvných ciev a spomaľujú činnosť vášho srdca. Toto umožňuje spomaliť srdcový rytmus a znížiť krvný tlak.

Karvedilol sa používa na:

- liečbu angíny pectoris (bolesti na hrudníku)
- kontrolu vysokého krvného tlaku.
- karvedilol sa v kombinácii s inými liekmi taktiež používa na liečbu srdcového zlyhania.

### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Carvedilol-Teva**

**Neužívajte Carvedilol-Teva**

- ak ste alergický (precitlivенý) na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, (uvedených v časti 6).
- ak máte alebo ste v minulosti mali astmu alebo iné ochorenie pľúc
- ak máte problémy s vašim srdcom (napríklad poruchu vodivého systému srdca alebo srdcové zlyhanie), keďže karvedilol nie je vhodný pre ľudí s určitými typmi ochorení srdca,
- ak máte veľmi pomalý tep (< 50 bpm)
- ak máte veľmi nízky krvný tlak (systolický krvný tlak pod 85 mmHg), čo niekedy môže zapríčiniť závraty, mdloby alebo zatmenie pred očami pri postavení sa,
- ak v súčasnej dobe užívate verapamil, diltiazem alebo iný liek používaný na liečbu porúch srdcového rytmu (antiarytmiká) podávané vo forme intravenózneho inžekcie alebo infúzie,
- ak máte poruchu acidobázickej rovnováhy vo vašej krvi (metabolickú acidózu),
- ak máte ochorenie pečene,

- ak trpíte akútnou pľúcnou embóliou (krvná zrazenina v pľúcach spôsobujúca bolesť na hrudníku a dýchavičnosť),
- ak trpíte Prinzmetalovou angínou (spazmy koronárnych artérií),
- ak trpíte srdcovým zlyháváním v dôsledku respiračného ochorenia (pľúcne srdce),
- ak trpíte neliečeným feochromocytómom (nádor drene nadobličiek),
- ak užívate inhibítory MAO (s výnimkou inhibítorov MAO-B) – lieky používané na liečbu depresie a iných neurologických či psychiatrických ochorení,
- ak dojčíte.

### **Upozornenia a opatrenia**

Pred užitím lieku Carvedilol-Teva sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Lekár vám predpíše Carvedilol-Teva s osobitnou opatrnosťou v nasledujúcich prípadoch:

- ak máte cukrovku, pretože príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie) môžu byť menej zjavné než zvyčajne,
- ak trpíte srdcovým zlyháváním sprevádzaným:
  - nízkym krvným tlakom,
  - zníženým prívodom krvi a kyslíka do srdca (ischemická choroba srdca) a aterosklerózou,
  - a/alebo poruchou funkcie obličiek,
- ak máte Raynaudov syndróm alebo periférne vaskulárne ochorenie spôsobujúce studené končatiny alebo pocity mravčenia,
- ak máte poruchu štítnej žľazy,
- ak ste v minulosti trpeli závažnými alergickými reakciami alebo podstupujete desenzibilizačnú liečbu (napr. proti bodnutiu osou alebo včelou),
- ak máte psoriázu (ložiská zhrubnutej a bolestivej kože),
- ak máte nízky krvný tlak pri vstávaní (ortostatická hypotenzia),
- ak máte určité poruchy srdcového rytmu (atrioventrikulárny (AV) blok 1. stupňa),
- ak máte akútne zápalové ochorenie srdca,
- ak máte zúženie srdcových chlopní alebo výtokového traktu srdca,
- ak máte terminálne štádium periférneho arteriového ochorenia,
- ak máte nestabilnú alebo sekundárnu hypertenziu,
- ak súčasne užívate niektoré iné lieky na zníženie krvného tlaku (antagonisty alfa1-receptorov alebo agonisty alfa2-receptorov),
- ak súčasne užívate lieky na liečbu srdcového zlyhávania (digitálne glykozidy) alebo porúch srdcového rytmu (napr. verapamil, diltiazem),
- ak vás čaká anestézia a veľký chirurgický zákrok,
- ak nosíte kontaktné šošovky, pretože Carvedilol-Teva môžu spôsobovať suchosť očí,
- ak máte výrazne pomalý pulz (menej ako 55 úderov za minútu).

### *Závažné kožné reakcie*

U pacientov užívajúcich Carvedilol-Teva sa vyskytli závažné kožné reakcie (napr. toxická epidermálna nekrolýza alebo Stevensov-Johnsonov syndróm). Pozri časť 4.

### *Syndróm z vysadenia*

Liečba liekom Carvedilol-Teva sa nemá náhle ukončiť. Toto odporúčanie platí najmä pre pacientov s ochorením srdca spôsobeným zníženým prietokom krvi v koronárnych cievach. Dávka sa má znižovať postupne počas obdobia 2 týždňov.

### **Deti a dospievajúci**

Údaje o účinnosti a bezpečnosti lieku Carvedilol-Teva u detí a dospievajúcich do 18 rokov sú nedostatočné. Carvedilol-Teva sa preto nemajú používať v tejto skupine pacientov.

### **Starší pacienti**

Starší pacienti môžu byť na liek Carvedilol-Teva citlivejší a musia byť starostlivo monitorovaní.

### **Iné lieky a Carvedilol-Teva**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných liekov. Je to preto, lebo carvedilol môže ovplyvniť účinok niektorých liekov. Tiež iné lieky môžu ovplyvniť účinok carvedilolu.

Informujte svojho lekára, keď užívate niektorý z nasledovných liekov:

- iné lieky na srdce alebo na vysoký krvný tlak obzvlášť
  - lieky na kontrolu srdcového rytmu (antiarytmiká) napr. amiodarón
  - blokátory kalciových kanálov napr. amlodipín, diltiazem, verapamil, nifedipín
  - na liečbu srdcového zlyhania napr. digoxín
  - nitráty napr. glyceryl trinitrát
  - guanetidín, reserpín, metyldopa
  - klonidín
- inhibítory monoamino-oxidázy (lieky na liečbu depresie) napr. moklobemid
- barbituráty napr. amylobarbiton (liek na spanie)
- fenotiazíny napr. prochlorperazín (na útlm vracania a nevoľnosti)
- antidepresíva napr. amitriptilín, fluoxetín (na liečbu depresie)
- cyklosporín a takrolimus (liek, ktorý sa používa na potlačenie imunitného systému pri transplantácii orgánov)
- inzulín alebo tablety na liečbu cukrovky
- nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) napr. ibuprofen (na liečbu bolesti, stuhnutosti a zápalu bolestivých kostí, kĺbov a svalov)
- kortikosteroidy (na potlačenie zápalu) napr. beklometazón
- estrogény (užívané ako antikoncepcia alebo hormonálna substitučná liečba)
- rifampicín (antibiotikum, ktoré sa používa na liečbu tuberkulózy)
- cimetidín (liek, ktorý sa používa na liečbu žalúdočných vredov)
- ketokonazol (liek, ktorý sa používa na liečbu hubových infekcií)
- haloperidol (liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých mentálnych/psychických ochorení)
- erytromycín (antibiotikum na liečbu bakteriálnych infekcií)
- sympatomimetiká (lieky, ktoré zvyšujú funkciu nervového systému), napr. efedrín alebo bronchodilatátory zo skupiny beta-agonistov.
- ergotamín (liek, ktorý sa používa na liečbu migrény)
- neuromuskulárne relaxanciá (lieky, ktoré znižujú napätie svalov pri anestézii), napr. atrakurium besilát
- vazodilatátory (lieky, ktoré rozširujú steny krvných ciev)
- guanfacín (liek, používaný na liečbu vysokého krvného tlaku)

Keď sa chystáte na operačný zákrok, oznámte vo vašej nemocnici alebo svojmu zubárovi, že užívate Carvedilol-Teva.

### **Carvedilol-Teva a jedlo, nápoje a alkohol**

Počas zavádzania liečby liekom Carvedilol-Teva sa má vyhnúť súčasnému užívaniu alebo užívaniu v krátkom časovom odstupe od grapefruitu alebo grapefruitovej šťavy. Grapefruit a grapefruitová šťava môžu zvýšiť hladinu liečiva Carvedilol-Teva v krvi a viesť k nepredvídateľným nežiaducim účinkom.

Rovnako sa má vyhnúť konzumácii alkoholu súčasne alebo v krátkom čase po užití lieku Carvedilol-Teva, pretože alkohol môže ovplyvniť účinok tohto lieku.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Keď ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte tento liek pokiaľ vám to nepovedal lekár.

Liečba beta-blokátormi sa má ukončiť 72 až 48 hodín pred očakávaným pôrodom. Ak to nie je možné, novorodenec musí byť počas prvých 48 – 72 hodín po narodení starostlivo monitorovaný.

Nie je známe, či Carvedilol-Teva prechádza do ľudského materského mlieka. Z tohto dôvodu sa počas liečby liekom Carvedilolom-Teva neodporúča dojčenie.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Carvedilol-Teva môže znížiť pozornosť a môžete pociťovať závraty počas užívania Carvedilolu-Teva. Je to pravdepodobnejšie ak začínate liečbu alebo ak sa vaša liečba zmenila a keď pijete alkohol. Ak cítite, že vaša pozornosť je znížená, neved'te vozidlá a neobsluhujte stroje.

### **Carvedilol obsahuje laktózu**

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

## **3. Ako užívať Carvedilol-Teva**

Vždy užívajte liek presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárničky.

- Tablety sa majú prehltnúť a zapíť pohárom vody.
- Tablety s obsahom 6,25 mg / 12,5 mg / 25 mg: Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.
- Váš lekár vás môže chcieť sledovať na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávok. Toto môže zahŕňať testy moču a krvné testy.

Odporúčaná dávka je:

#### **Vysoký tlak krvi:**

- **Dospelí:** Bežná začiatková dávka je 12,5 mg jedenkrát denne prvé dva dni, po ktorých odporúčaná dávka je 25 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, váš lekár môže postupne dávku zvyšovať. Odporúčaná maximálna jednotlivá denná dávka je 25 mg a maximálna denná dávka je 50 mg.
- **Starší ľudia:** Bežná začiatková dávka je 12,5 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, váš lekár môže postupne dávku zvyšovať.

#### **Angína pectoris:**

- **Dospelí:** Bežná začiatková dávka je 12,5 mg dvakrát denne prvé dva dni, po ktorých odporúčaná dávka je 25 mg dvakrát denne. Ak je to potrebné, váš lekár môže postupne dávku zvyšovať. Maximálna denná dávka je 50 mg dvakrát denne.
- **Starší ľudia:** Bežná začiatková dávka je 12,5 mg dvakrát denne prvé dva dni, po ktorých odporúčaná dávka je 25 mg dvakrát denne, čo je maximálna denná dávka.

#### **Srdcové zlyhanie:**

Tablety majú byť užívané s jedlom na zníženie rizika výrazného zníženia krvného tlaku pri postavení sa, čo môže spôsobiť závrat, zatmenie pred očami alebo mdloby.

- **Dospelí:** Bežná začiatková dávka je 3,125 mg dvakrát denne prvé dva týždne. Váš lekár môže postupne dávku zvyšovať na 25 mg dvakrát denne. Maximálna denná dávka je 25 mg podávaných dvakrát denne u pacientov s hmotnosťou menej ako 85 kg. U pacientov s hmotnosťou viac ako 85 kg je maximálna dávka 50 mg dvakrát denne.

#### **Problémy s obličkami**

Keď máte problémy s obličkami, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.

#### **Starší ľudia**

Váš lekár vás môže chcieť starostlivo sledovať.

#### **Použitie u detí a dospievajúcich (do 18 rokov)**

Užívanie karvedilolu sa neodporúča deťom a dospelým do 18 rokov.

#### **Ak užijete viac Carvedilolu-Teva, ako máte**

Ak ste užili vy (alebo niekto iný) viac tabliet naraz alebo ak si myslíte, že dieťa prehltlo nejaké tablety, kontaktujte ihneď najbližšiu pohotovosť alebo svojho lekára. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať zníženie tlaku krvi (čo môže spôsobovať pocit na zmdlenie, tras a slabosť), dýchavičnosť, vracanie, pády, veľmi pomalú frekvenciu srdca, zlyhanie srdca/srdcový infarkt, ťažké s dýchaním a stratu vedomia.

#### **Ak zabudnete užiť Carvedilol-Teva**

Ak zabudnete užiť dávku, užite jednu dávku ihneď ako si spomeniete. Ak je čas už na ďalšiu dávku, užite túto dávku v normálnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

#### **Ak prestanete užívať Carvedilol-Teva**

Neprestaňte náhle užívať vaše tablety, keďže sa môžu objaviť vedľajšie účinky. Ak má byť liečba vysadená, váš lekár bude postupne vašu dávku znižovať.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

**Ak sa u vás objavia niektoré z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte urgentnú lekársku pomoc / navštívte pohotovosť:**

#### **Závažné alergické reakcie (veľmi zriedkavé)**

Príznaky môžu zahŕňať náhle opuchnutie hrdla, tváre, pier a úst, čo môže sťažovať dýchanie alebo prehĺtanie.

**Bolesť na hrudníku** (menej časté) sprevádzaná dýchavičnosťou, potením a pocitom na vracanie.

**Menej časté močenie** (časté) spolu s opuchom dolných končatín môže naznačovať zlyhanie obličiek a pokles ich funkcie u pacientov s difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo poruchou funkcie obličiek.

**Veľmi nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia)** (časté) u pacientov s cukrovkou môže viesť k záchvatom alebo strate vedomia.

#### **Kožné reakcie**

Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné kožné ochorenia (erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza). Na koži alebo slizniciach (napr. v ústach, genitálnej oblasti alebo na viečkach) sa môže objaviť začervenanie, často sprevádzané pľuzgiermi. Tieto prejavy sa môžu spočiatku objaviť ako kruhové ložiská s centrálnymi pľuzgiermi, ktoré môžu postupne viesť k rozsiahlemu olupovaniu kože a môžu byť život ohrozujúce. Tieto závažné kožné reakcie sú často predchádzané bolesťami hlavy, horúčkou a bolesťami tela (chrípkové príznaky).

#### **Ďalšie nežiaduce účinky:**

**Veľmi časté** (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- závraty,
- bolesť hlavy,
- problémy so srdcom,
- pocit slabosti alebo únavy,

- nízky tlak krvi (pocit závratov alebo točenia) .

**Časté** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- infekcia dýchacích ciest (bronchitída), pľúc (pneumónia), nosa a hrdla,
- infekcia močových ciest,
- anémia,
- prírastok hmotnosti,
- zvýšenie obsahu cholesterolu (tuku) v krvi,
- strata kontroly nad cukrom v krvi u ľudí s cukrovkou,
- depresia, depresívna nálada,
- strata vedomia / mdloby,
- problémy so zrakom, suché oči, podráždenie očí,
- pomalý tep srdca,
- opuch rúk, členkov alebo nôh,
- problémy s cirkuláciou, zadržiavanie tekutín,
- slabosť alebo závraty pri postavení sa (spôsobené nízkym tlakom krvi),
- zhoršenie chladu končatín u pacientov, ktorí trpia Raynaudovým ochorením alebo problémy s cirkuláciou,
- problémy s dýchaním,
- hromadenie tekutiny v pľúcach (pľúcny edém),
- astma a ťažkosti s dýchaním u pacientov so sklonom k spazmom dýchacích ciest,
- pocit choroby, bolesť brucha, vracanie, porucha trávenia,
- hnačka,
- bolesť v rukách a nohách,
- zmeny v močení,
- bolesť.

**Menej časté** (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- problémy so spánkom, nočné mory,
- halucinácie, zmätenosť,
- trpnutie a znecitlivenie,
- problémy so srdcom
- zápcha,
- problémy s vašou kožou (svrbenie, suché kožné miesta, žihľavka (urtikária), psoriáza, kožná vyrážka podobná psoriáze),
- impotencia (ťažkosti s dosiahnutím alebo udržaním erekcie).

**Zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- znížený počet krvných doštičiek vo vašej krvi (spôsobuje nezvyčajné krvácanie alebo tvorbu modrín),
- upchatý nos,
- sucho v ústach.

**Veľmi zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- znížený počet bielych krviniek v krvi,
- psychózy,
- zmeny funkcie pečene (zistené testami),
- problémy s udržaním moču (inkontinencia u žien).

**Neznáme** (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- vypadávanie vlasov.

Liečivá zo skupiny beta-blokátorov môžu vyvolať skrytú cukrovku.

Môže sa vyskytnúť nadmerné potenie (hyperhidróza).

Ak sa vaše príznaky alebo váš stav zhorší, oznámte to vášmu lekárovi, keďže môže byť potrebné zmeniť dávku liekov, ktoré užívate alebo dávku Carvedilolu-Teva.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Carvedilol-Teva**

### **Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.**

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Skratka pre dátum expirácie (napr. EXP) sa môže uviesť na obal alebo blister.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Carvedilol-Teva obsahuje:**

- Liečivo je karvedilol.  
Každá 6,25 mg tableta obsahuje 6,25 mg účinnej látky karvedilolu.  
Každá 12,5 mg tableta obsahuje 12,5 mg účinnej látky karvedilolu.  
Každá 25 mg tableta obsahuje 25 mg účinnej látky karvedilolu.
- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, povidón, krospovidón, koloidný oxid kremičitý, bezvodý a magnéziumstearát. Tablety obsahujú nasledujúce farbivá:
- 6,25 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)
- 12,5 mg tablety: červený oxid železitý (E172).

### **Ako vyzerá Carvedilol-Teva a obsah balenia**

Carvedilol-Teva tablety sú okrúhle, ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným „CVL“ v hornej časti. Okrem toho:

- 6,25 mg tablety sú svetložlté až žlté a majú „T2“ v spodnej časti
  - 12,5 mg tablety sú mramorované bledotieľavo červené a majú „T3“ v spodnej časti
  - 25 mg tablety sú biele až takmer-biele a majú „T4“ v spodnej časti.
- 
- 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg tablety sú dostupné v baleniach po\*: 14, 28, 30, 50, 56 a 100 tabliet.

\*Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

## **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.  
Swensweg 5,  
2031 GA Haarlem,  
Holandsko

Výrobca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Ut 13, 4042 Debrecen, Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Poľsko

Pharmachemie B. V., Swensweg 5, PO Box 552, 2003 RN, Haarlem, Holandsko

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:**

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Belgicko:            | Carvedilol Teva 6.25 mg, 12.5 mg Tabletten                         |
| Dánsko:              | Carvedilol Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Tabletter        |
| Nemecko:             | Carvedilol-Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Tabletten        |
| Španielsko:          | Carvedilol Teva 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Comprimidos EFG            |
| Maďarsko:            | Carvol 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletta                  |
| Taliansko:           | Carvedilolo ratiopharm 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Compresse |
| Portugalsko:         | Carvedilol Teva 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg Comprimidos      |
| Slovenská republika: | Carvedilol-Teva 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg                            |

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2025.**