

Písomná informácia pre používateľa

ARCHIFAR 500 mg

ARCHIFAR 1 g

meropeném
prášok na injekčný/infúzny roztok

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je ARCHIFAR a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ARCHIFAR
3. Ako používať ARCHIFAR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ARCHIFAR
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je ARCHIFAR a na čo sa používa

ARCHIFAR obsahuje účinnú látku, ktorá sa nazýva meropeném. ARCHIFAR patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká. Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie.

Používa sa u dospelých a detí starších ako 3 mesiace na liečbu nasledujúcich infekcií:

- Infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc)
- Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov s cystickou fibrózou
- Komplikované infekcie močových ciest
- Komplikované infekcie v brušnej dutine
- Infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode
- Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
- Náhly výskyt bakteriálnej infekcie mozgu (akútna bakteriálna meningitída)

ARCHIFAR sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.

Meropeném sa môže používať na liečbu bakteriálnej infekcie krvi, ktorá môže súvisieť s niektorým z vyššie uvedených typov infekcie.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete ARCHIFAR

Nepoužívajte ARCHIFAR

- ak ste alergický na meropeném alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak ste alergický (precitlivý) na iné tzv. betalaktámové antibiotiká, ako sú penicilíny, cefalosporíny alebo karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na meropeném

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať ARCHIFAR:

- ak sa u vás niekedy vyskytla alergická reakcia na iné antibiotiká
- ak máte zdravotné problémy, ako sú problémy s pečeňou alebo obličkami
- ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku
- ak užívate liek s obsahom kyseliny valproovej alebo valproátu sodného, pozri časť Iné lieky a ARCHIFAR.

Ak si nie ste istý, či sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako začnete používať ARCHIFAR.

Počas používania lieku ARCHIFAR:

Môže sa u vás objaviť pozitívny test (Coombsov test), ktorý svedčí o prítomnosti protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa o tom s vami porozpráva.

Môžu sa u vás objaviť príznaky závažných kožných reakcií (pozri časť 4). Ak sa tak stane, ihneď sa obráťte na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, aby mohli príznaky liečiť.

Ak sa u vás vyskytne nevysvetliteľná bolesť, citlivosť alebo slabosť svalov a/alebo tmavo sfarbený moč okamžite sa obráťte na svojho lekára. Môžu to byť prejavy rozpadu svalov (rabdomyolýzy), ktorý môže viesť k problémom s obličkami.

Problémy s pečeňou

Ak spozorujete zožltnutie kože a očí, svrbenie kože, tmavo sfarbený moč alebo svetlo sfarbenú stolicu, povedzte to svojmu lekárovi. Môže to byť prejav problémov s pečeňou, ktoré váš lekár musí skontrolovať.

Počas liečby alebo aj po jej skončení sa môže u vás vyskytnúť zápal hrubého čreva (kolitída). Pozri časť 4.

Počas používania lieku ARCHIFAR sa môžu zriedkavo vyskytovať záchvaty kŕčov. Ak sa u vás objavia kŕče, obráťte sa na lekára.

Iné lieky a ARCHIFAR

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre predtým, ako začnete používať tento liek.

Je to z toho dôvodu, že ARCHIFAR môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok lieku ARCHIFAR.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- probenecid (na liečbu dny)
- kyselina valproová/valproát sodný/valpromid (na liečbu epilepsie). Meropeném sa nemá používať, pretože môže znížiť účinok valproátu sodného.
- lieky proti zrážaniu krvi (napr. warfarín)

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas tehotenstva je vhodné vyhnúť sa používaniu lieku ARCHIFAR.

Váš lekár rozhodne o tom, či máte ARCHIFAR používať.

Je dôležité, aby ste pred užívaním meropenému informovali svojho lekára, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Malé množstvo tohto lieku sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto váš lekár rozhodne, či máte počas dojčenia používať meropeném.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Meropeném bol spájaný s bolesťou hlavy a mravčením alebo pichaním v koži (parestézia). Ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov by mohol ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Meropeném môže spôsobiť mimovoľné pohyby svalov, ktoré môžu spôsobiť rýchle a nekontrolovateľné chvenie tela (kŕče). Toto je zvyčajne sprevádzané stratou vedomia. Ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok, nevedzte vozidlá ani nepoužívajte stroje.

ARCHIFAR obsahuje uhličitan sodný

ARCHIFAR 500 mg: Tento liek obsahuje 46 mg sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v injekčnej liekovke. To sa rovná 2,3 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

ARCHIFAR 1 g: Tento liek obsahuje 92 mg sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v injekčnej liekovke. To sa rovná 4,6 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

Ak máte ochorenie, ktoré vyžaduje sledovanie vášho príjmu sodíka, informujte, prosím, svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

3. Ako užívať ARCHIFAR

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste ničím istí, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

Použitie u dospelých

- Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od toho, kde sa infekcia vo vašom tele nachádza a aká je závažnosť infekcie. Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre vás vhodná.
- Odporúčaná dávka pre dospelých sa pohybuje v rozmedzí 500 mg (miligramy) a 2 g (gramy). Dávku budete zvyčajne dostávať každých 8 hodín. Avšak, ak vaše obličky nepracujú správne, môžete dostávať dávku menej často.

Použitie u detí a dospievajúcich

Dávka pre dieťa vo veku od 3 mesiacov do 11 rokov sa určí na základe veku a telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka sa pohybuje v rozmedzí 10 mg až 40 mg lieku ARCHIFAR na každý kilogram (kg) telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa zvyčajne podáva každých 8 hodín. Dieťa s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg bude dostávať dávku ako dospelý pacient.

Ako sa ARCHIFAR podáva

- ARCHIFAR vám bude podávaný vo forme injekcie alebo infúzie do veľkej žily.
- ARCHIFAR vám bude zvyčajne podávať váš lekár alebo zdravotná sestra.
- Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú však zaškolení na podávanie lieku ARCHIFAR v domácom prostredí. Pokyny k takémuto podávaniu sú uvedené v tejto písomnej informácii (v časti nazývanej „Pokyny na podávanie lieku ARCHIFAR sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí“). Vždy používajte ARCHIFAR presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára.
- Vaša injekcia alebo infúzia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú iné lieky.
- Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút a podanie infúzie 15 až 30 minút. Váš lekár vám povie, ako ARCHIFAR podávať.
- Liek by ste mali zvyčajne dostávať každý deň v rovnakom čase.

Ak použijete viac lieku ARCHIFAR, ako máte

Ak ste náhodne použili viac, ako je vaša predpísaná dávka, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete použiť ARCHIFAR

Ak vynecháte podanie injekcie, mali by ste ju dostať v čo najkratšom čase. Ak to však zistíte takmer v čase podania nasledujúcej injekcie, premeškané injekčné podanie vynechajte. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať ARCHIFAR

Neprestaňte ARCHIFAR používať, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj ARCHIFAR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné alergické reakcie (častosť neznáma - nedá sa určiť z dostupných údajov)

Ak máte závažnú alergickú reakciu, **ukončíte používanie lieku ARCHIFAR a ihneď vyhľadajte lekára**. Môžete potrebovať bezodkladné ošetrovanie lekárom. Príznaky sa vyskytnú náhle a môžu zahŕňať:

- závažnú vyrážku, svrbenie alebo žihľavku na koži
- opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela
- dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním
- závažné kožné reakcie, ktoré zahŕňajú:
 - závažná alergická reakcia s horúčkou, kožnou vyrážkou a zmenami krvných testov, ktoré kontrolujú funkciu pečene (zvýšené pečeňové enzýmy) a zvýšenie určitého typu bielych krviniek (eozinofília) a zväčšenie lymfatických uzlín. To môžu byť prejavy multiorgánovej precitlivelosti známej ako DRESS syndróm (*DRESS, Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*).
 - závažné červené šupinaté vyrážky, kožné hrčky, ktoré obsahujú hnis, pľuzgiere alebo olupovanie kože, ktoré môžu byť spojené s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov.
 - závažné kožné vyrážky, ktoré sa môžu objaviť ako červenakasté kruhové škvrny často s centrálnymi pľuzgiermi na trupe, olupovanie kože, vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a v očiach a ktorým môže predchádzať horúčka a príznaky podobné chrípke (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo závažnejšia forma (toxická epidermálna nekrolýza).

Nedostatok bielych krviniek (častosť neznáma)

Medzi príznaky patria:

- časté infekcie, vysoká teplota a boľavé hrdlo. Váš lekár vám môže z času na čas urobiť krvné vyšetrenie.

Poškodenie červených krviniek (častosť neznáma)

Medzi príznaky patria:

- nečakaná dýchavičnosť
- červené alebo hnedé zafarbenie moču.

Ak sa u vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, **ihneď sa obráťte na svojho lekára**.

Rozpad svalov (častosť neznáma)

- nevysvetliteľná bolesť, citlivosť alebo slabosť svalov a/alebo tmavo sfarbený moč

Ak sa u vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, **ihneď sa obráťte na svojho lekára**.

Problémy s pečeňou (menej časté - môže postihovať až 1 z 100 osôb)

- zožltnutie kože, očných bielok, svrbenie kože, tmavo sfarbený moč alebo svetlo sfarbená stolica.

Ak sa u vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, **ihneď sa obráťte na svojho lekára.**

Náhla bolesť na hrudníku, ktorá môže byť príznakom potenciálne závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm, bola zaznamenaná pri iných liekoch rovnakého typu. Ak sa to stane, okamžite sa poraďte s lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Iné možné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

- brušné (žalúdočné) bolesti
- pocit na vracanie (nauzea)
- vracanie
- hnačka
- bolesť hlavy
- kožná vyrážka, svrbenie kože
- bolesť a zápal v mieste podania
- zvýšený počet krvných doštičiek vo vašej krvi (zistené krvným testom)
- zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia vašej pečene

Menej časté (môžu postihovať až 1 z 100 osôb)

- zmeny vo vašej krvi. Medzi ne patrí znížený počet krvných doštičiek (čo môže spôsobiť ľahšiu tvorbu modrín), zvýšený počet niektorých bielych krviniek, znížený počet iných bielych krviniek a zvýšené množstvo látky nazývanej „bilirubín“. Váš lekár vám môže občas urobiť krvné vyšetrenie.
- zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia vašich obličiek
- znížená hladina draslíka v krvi (čo môže spôsobovať slabosť, svalové kŕče, mravčenie a poruchy srdcového rytmu)
- pocit típnutia (mravčenie)
- žihľavka
- infekcie v ústach alebo v pošve spôsobené plesňami (kandidóza)
- zápal čreva s hnačkou
- zápal žily s tvorbou krvnej zrazeniny v mieste podania

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)

- záchvaty (kŕče)
- akútna dezorientácia a zmätenosť (delírium)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ARCHIFAR

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte ARCHIFAR po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete poškodenie obalu alebo akékoľvek viditeľné znaky poškodenia.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Neuchovávajúte v mrazničke

Po rekonštitúcii

Injekčný roztok na intravenóznou bolusovú injekciu, s konečnou koncentráciou 50 mg/ml:

Po rozpustení lieku vo vode na injekcie sa pripravené roztoky na intravenóznou injekciu majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom rekonštitúcie a ukončením podávania intravenózne injekcie nemá prekročiť:

- 3 hodiny pri uchovávaní pri teplote do 25 °C
- 9 hodín pri uchovávaní v chladničke (2 °C – 8 °C).

Infúzny roztok na intravenóznou infúziu, s koncentráciou 1 až 20 mg/ml:

Po rozpustení lieku v 0,9 % infúznom roztoku chloridu sodného sa pripravené roztoky na intravenóznou infúziu majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom rekonštitúcie a ukončením podávania intravenózne infúzie nemá prekročiť:

- 3 hodiny pri uchovávaní pri teplote do 25 °C
- 12 hodín pri uchovávaní v chladničke (2 °C – 8 °C).

Infúzny roztok pripravený použitím 5 % roztoku glukózy sa má použiť okamžite po rekonštitúcii. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, ak spôsob otvorenia/rekonštitúcie/riedenia nezabraňuje riziku mikrobiálnej kontaminácie. Ak sa liek nepoužije okamžite, za dĺžku a podmienky jeho uchovávaní je zodpovedný používateľ.

Neuchovávajúte v mrazničke. Len na jednorazové použitie, nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ARCHIFAR obsahuje

- Liečivo je trihydrát meropenému.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 500 mg bezvodého meropenému (vo forme trihydrátu meropenému).

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 g bezvodého meropenému (vo forme trihydrátu meropenému).

- Ďalšie zložky sú: uhličitan sodný.

Ako vyzerá ARCHIFAR a obsah balenia

Biely alebo svetložltý prášok v bezfarebnej sklenenej injekčnej liekovke (trieda I) s nominálnym objemom 20 ml (ARCHIFAR 500 mg) a 30 ml (ARCHIFAR 1 g) s brómbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom alebo s hliníkovým uzáverom s modrým plastovým odnímateľným viečkom „flip-off“.

Veľkosť balenia: 10, 25, 50 alebo 100 injekčných liekoviek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupolis Street, 3011 Limassol, Cyprus

Výrobca

Medochemie Ltd (Factory C - Cephalosporins), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2025.

Odporúčanie/medicínska osveta

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Neúčinkujú proti infekciám spôsobeným vírusmi.

Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na antibiotickú liečbu. Jeden z najčastejších dôvodov prečo k tomu dôjde je, že baktérie spôsobujúce infekciu sú odolné voči antibiotikám, ktoré používate. To znamená, že môžu prežívať a dokonca sa rozmnožiť napriek liečbe antibiotikami. Baktérie sa môžu stať odolnými voči antibiotikám z rôznych dôvodov. Opatrné používanie antibiotík môže pomôcť znížiť možnosť baktérie stať sa odolnou voči nim.

Antibiotická liečba, ktorú vám predpísal váš lekár, je určená len na liečbu vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, ktoré pomôžu predísť výskytu odolných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinku antibiotík.

1. Je veľmi dôležité, aby ste používali antibiotiká v správnej dávke, v správnom čase a dostatočne dlhý čas. Prečítajte si pokyny v písomnej informácii pre používateľa a v prípade, že niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.
2. Nepoužívajte antibiotiká, pokiaľ neboli predpísané výhradne vám. Mali by ste ich používať len na liečbu infekcie, na ktorú boli predpísané.
3. Nepoužívajte antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak mali rovnaké príznaky infekcie ako vy.
4. Nedávajte antibiotiká, ktoré vám lekár predpísal, iným ľuďom.
5. Ak vám po liečbe, pri ktorej ste postupovali podľa pokynov lekára, zvýšilo akékoľvek množstvo antibiotík, vráťte ho do lekárne, kde ho náležite zlikvidujú.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Pokyny na podávanie lieku ARCHIFAR sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí

Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú zaškolení na podávanie lieku ARCHIFAR v domácom prostredí.

Upozornenie - v domácom prostredí si tento liek môžete podávať alebo ho môžete podávať niekomu inému len vtedy, ak ste zaškolený lekárom alebo zdravotnou sestrou.

- Tento liek sa musí zmiešať s inou tekutinou (rozpúšťadlo). Váš lekár vám povie, aké množstvo rozpúšťadla použiť.
- Liek podajte ihneď po príprave. Neuchovávajte v mrazničke.

Ako pripraviť tento liek

1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný priestor.
2. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) lieku ARCHIFAR z obalu. Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum expirácie. Skontrolujte, či je injekčná liekovka neporušená a nebola poškodená.
3. Odstráňte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku vyschnúť.
4. Novú sterilnú ihlu nasadte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez toho, aby ste sa dotkli koncov.
5. Do injekčnej striekačky naberte odporúčané množstvo sterilnej „vody na injekcie“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:

Dávka lieku ARCHIFAR	Množstvo „vody na injekcie“ potrebné na nariadenie
500 mg (miligramov)	10 ml (mililitrov)
1 g (gram)	20 ml
1,5 g	30 ml
2 g	40 ml

Prosím všimnite si: Ak je vaša predpísaná dávka lieku ARCHIFAR viac ako 1 g, budete potrebovať použiť viac ako 1 injekčnú liekovku lieku ARCHIFAR. Potom môžete nabráť tekutinu z injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.

6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnete stred sivej gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekcie do injekčnej liekovky alebo injekčných liekoviek lieku ARCHIFAR.
7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potrepťte asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju vysušiť.
8. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným na doraz ihlou opäť prepichnete sivú gumovú zátku. Injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku musíte podržať a injekčnú liekovku potom obrátiť hore dnom.
9. Udržiavaním konca ihly v tekutine potiahnite piest a všetku tekutinu z injekčnej liekovky naberte do injekčnej striekačky.
10. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu injekčnú liekovku vyhoďte na bezpečné miesto.
11. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do vrchnej časti striekačky.
12. Vzduch zo striekačky odstráňte jemným tlačením piestu.
13. Ak ARCHIFAR používate v domácom prostredí, zlikvidujte použité ihly a infúzne sety primeraným spôsobom. Ak váš lekár rozhodne o ukončení vašej liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý ARCHIFAR vhodným spôsobom.

Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon alebo prostredníctvom injekčného portu alebo centrálného žilového katétra.

Podávanie lieku ARCHIFAR prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon

1. Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhod'te do nádoby na použité ihly a striekačky.
2. Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým tampónom a nechajte ho vyschnúť. Otvorte viečko na vašej kanyle a pripojte injekčnú striekačku.
3. Pomaly stláčajte piest injekčnej striekačky, aby ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.
4. Hneď ako sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a urobte prepláchnite kanylu podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.
5. Viečko vašej kanyly uzavrite a injekčnú striekačku opatrne vyhod'te do nádoby na použité ihly a striekačky.

Podávanie lieku ARCHIFAR prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra

1. Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým tampónom a nechajte vyschnúť.
2. Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.
3. Hneď ako sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a vykonajte preplach podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.
4. Na centrálny žilový katéter nasad'te nové čisté viečko a injekčnú striekačku opatrne vyhod'te do nádoby na použité ihly a striekačky.