

Písomná informácia pre používateľa

Meropenem Eberth 500 mg
Meropenem Eberth 1000 mg
prášok na injekčný alebo infúzny roztok

meropeném

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Meropenem Eberth a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Meropenem Eberth
3. Ako používať Meropenem Eberth
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Meropenem Eberth
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Meropenem Eberth a na čo sa používa

Meropenem Eberth patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká. Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie.

- Infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc).
- Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou.
- Komplikované infekcie močových ciest.
- Komplikované infekcie v brušnej dutine.
- Infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode.
- Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.
- Akútna bakteriálna infekcia mozgu (meningitída).

Meropenem Eberth sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne spôsobená dôsledkom bakteriálnej infekcie.

Meropenem Eberth sa môže používať na liečbu bakteriálnej infekcie krvi, ktorá môže súvisieť s horeuvedeným typom infekcie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Meropenem Eberth

Nepoužívajte Meropenem Eberth

- ak ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Meropenemu Eberth (uvedených v časti 6. Ďalšie informácie).
- ak ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká, ako sú penicilíny, cefalosporíny alebo karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na meropeném.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Meropenem Eberth, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

- ak máte zdravotné problémy, ako sú problémy s pečeňou alebo obličkami.
- ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku.

Problémy s pečeňou

Ak spozorujete zožltnutie kože a očí, svrbenie kože, tmavo sfarbený moč alebo svetlo sfarbenú stolicu, povedzte to svojmu lekárovi. Môže to byť prejav problémov s pečeňou, ktoré váš lekár musí skontrolovať.

Môže sa u vás objaviť pozitívny test (Coombsov test), ktorý svedčí o prítomnosti protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa o tom s vami porozpráva.

Ak si nie ste istý, či sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako začnete používať Meropenem Eberth.

Iné lieky a Meropenem Eberth

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Je to z toho dôvodu, že Meropenem Eberth môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Meropenemu Eberth.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- Probenecid (na liečbu dny)
- Kyselina valproová/valproan sodný/valpromid (na liečbu epilepsie) - Meropenem Eberth sa nemá používať, pretože to môže znížiť účinok valproanu sodného.
- Perorálne (užívané ústami) antikoagulancia (používané na liečbu alebo prevenciu vzniku krvných zrazenín).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. Počas tehotenstva je vhodnejšie sa vyhnúť používaniu meropenému. Váš lekár rozhodne o tom, či máte meropeném používať.

Je dôležité, aby ste pred užívaním meropenému informovali svojho lekára, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Malé množstvo tohto lieku sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto váš lekár rozhodne, či máte počas dojčenia používať meropeném.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak meropeném je spájaný s bolesťou hlavy, poruchou citlivosti pokožky (parestézia) prejavujúcou sa ako pálenie alebo pichanie, mimovoľnými pohybmi svalov, ktoré spôsobujú u človeka rýchlu a nekontrolovateľnú triašku (kŕče), ktorá je zvyčajne sprevádzaná stratou vedomia. Ktorkoľvek z uvedeného by mohlo ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Meropenem Eberth obsahuje sodík.

Meropenem Eberth 500 mg: tento liek obsahuje približne 2,0 mmol sodíka v dávke 500 mg, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným prísunom sodíka.

Meropenem Eberth 1000 mg: Tento liek obsahuje približne 4,0 mmol sodíka v 1000 mg dávke, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným prísunom sodíka.

Ak máte ochorenie, ktoré vyžaduje sledovanie vášho príjmu sodíka, informujte, prosím svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

3. Ako používať Meropenem Eberth

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Použitie u dospelých

- Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od toho, kde sa infekcia vo vašom tele nachádza a aká je závažnosť infekcie. Váš lekár rozhodne, akú dávku potrebujete.
- Zvyčajná dávka pre dospelých sa pohybuje v rozmedzí 500 mg (miligramy) a 2 g (gramy). Dávku budete zvyčajne dostávať každých 8 hodín. Avšak, ak vaše obličky nepracujú správne, môžete dostávať dávku menej často.

Použitie u detí a dospievajúcich

Dávka pre deti vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov sa určí na základe veku a telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka sa pohybuje v rozmedzí 10 mg až 40 mg Meropenemu Eberth na každý kilogram (kg) telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa zvyčajne podáva každých 8 hodín. Deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg dostanú dávku ako dospelý pacient.

Ako používať Meropenem Eberth

- Meropenem Eberth vám bude podávaný vo forme injekcie alebo infúzie do veľkej žily.
- Meropenem Eberth vám bude zvyčajne podávať váš lekár alebo zdravotná sestra.
- Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú však zaškolení na podávanie Meropenemu Eberth v domácom prostredí. Príslušné pokyny k takémuto podávaniu sú uvedené v tejto písomnej informácii (v časti nazývanej „Pokyny na podávanie Meropenemu Eberth sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí“). Vždy používajte Meropenem Eberth presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára.
- Vaša injekcia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú iné lieky.
- Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút alebo 15 až 30 minút. Váš lekár vám povie, ako Meropenem Eberth podávať.
- Vaše injekcie by ste mali zvyčajne dostávať každý deň v rovnakom čase.

Ak použijete viac Meropenemu Eberth, ako máte

Ak ste náhodne použili viac, ako je vaša predpísaná dávka, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete použiť Meropenem Eberth

Ak podanie injekcie vynecháte, mali by ste ju dostať čo najskôr, ako je to možné. Ak je však už takmer čas na podanie ďalšej injekcie, nepodanú injekciu vynechajte. Nepoužite dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Meropenem Eberth

Neprestaňte Meropenem Eberth používať, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Oznámte okamžite vášmu lekárovi, alebo vo vážnom prípade choďte do najbližšej nemocnice na oddelenie urgentného príjmu, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov.

Závažné alergické reakcie

Ak máte závažnú alergickú reakciu, **okamžite ukončíte používanie Meropenemu Eberth a ihneď vyhľadajte lekára**. Môžete potrebovať bezodkladné ošetrovanie lekárom. Príznaky môžu okrem iných zahŕňať náhly výskyt nasledovných ťažkostí:

- Závažná vyrážka, svrbenie alebo opuchy kože.
- Opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela.
- Skrátený dych, sipot alebo sťažené dýchanie.

Poškodenie červených krviniek (neznáme)

Medzi príznaky patria:

- Nečakaná dýchavičnosť.
- Červené alebo hnedé zafarbenie moču.

Ak sa u vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, **ihneď vyhľadajte lekára**.

Iné možné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- Brušné (žalúdočné) bolesti.
- Pocit na vracanie (nauzea).
- Vracanie (dávnenie).
- Hnačka.
- Bolesť hlavy.
- Kožná vyrážka, svrbenie kože.
- Bolesť a zápal.
- Zvýšený počet krvných doštičiek vo vašej krvi (zistené krvným testom).
- Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia vašej pečene.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- Zmeny vo vašej krvi. Medzi ne patrí znížený počet krvných doštičiek (čo môže spôsobiť ľahšiu tvorbu modrín), zvýšený počet niektorých bielych krviniek, znížený počet iných bielych krviniek a zvýšené množstvo látky nazývanej „bilirubín“. Váš lekár vám môže z času na čas urobiť krvné vyšetrenie.
- Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia vašich obličiek.
- Pocit tŕpnutia (mravčenie).
- Infekcie v ústach alebo v pošve spôsobené plesňami (kandidóza).
- Zápal čriev s hnačkou.
- Bolesť žíl v mieste podania injekcie Meropenem Eberth.
- Iné zmeny vo vašej krvi. Medzi príznaky patria časté infekcie, vysoká teplota a bolesť v hrdle. Váš lekár môže z času na čas vykonať vyšetrenie krvi.
- Náhly výskyt závažnej vyrážky alebo tvorba pľuzgierov alebo olupovanie kože. Toto môže byť spojené s vysokou teplotou a bolesťou kĺbov.
- Znížené hladiny draslíka v krvi (čo môže spôsobovať slabosť, svalové kŕče, mravčenie a poruchy srdcového rytmu).
- Problémy s pečeňou. Zožltnutie kože a očí, svrbenie kože, tmavo sfarbený moč alebo svetlo sfarbená stolica. Ak spozorujete tieto prejavy alebo príznaky, okamžite navštívte lekára.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

- Kŕče.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- Závažné reakcie precitlivenosti zahŕňajúce horúčku, kožnú vyrážku a zmeny krvných testov, ktorými sa kontroluje funkcia pečene (zvýšené pečeňové enzýmy) a zvýšenie počtu určitého typu bielych krviniek (eozinofília) a zväčšenie lymfatických uzlín. To môžu byť

prejavy multiorgánovej (vplývajúca na viacero orgánov) precitlivenosti známej ako DRESS syndróm.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Meropenem Eberth

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Meropenem Eberth po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale liekovky a vonkajšom obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Podanie intravenózneho bolusového podania:

Roztok na bolusovú injekciu sa pripraví rozpustením lieku vo vode na injekcie na konečnú koncentráciu 50 mg/ml.

Chemická a fyzikálna stabilita pripraveného roztoku na bolusovú injekciu bola preukázaná počas 3 hodín pri teplote do 25 °C alebo 12 hodín v chladničke (2-8 °C).

Z mikrobiologického hľadiska, pokiaľ metóda otvárania/rekonštitúcie/riedenia nevylúči riziko mikrobiálnej kontaminácie, sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pripraveného lieku je zodpovedný používateľ.

Podanie intravenózneho infúzie:

Infúzny roztok sa pripraví rozpustením lieku buď v 0,9 % infúznom roztoku chloridu sodného alebo v 5 % infúznom roztoku glukózy na konečnú koncentráciu 1 až 20 mg/ml.

Chemická a fyzikálna stabilita infúzneho roztoku pripraveného s použitím 0,9 % infúzneho roztoku chloridu sodného bola preukázaná počas 8 hodín pri teplote do 25 °C alebo 24 hodín v chladničke (2-8 °C).

Z mikrobiologického hľadiska, pokiaľ metóda otvárania/rekonštitúcie/riedenia nevylúči riziko mikrobiálnej kontaminácie, sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pripraveného lieku je zodpovedný používateľ.

Roztok lieku po rekonštitúcii s 5 % infúznym roztokom glukózy sa má použiť do 30 minút po rekonštitúcii.

Pripravené roztoky neuchovávajte v mrazničke.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepoužívate. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Meropenem Eberth obsahuje

Liečivo je meropeném. Každá injekčná liekovka obsahuje 500 mg meropenému (ako trihydrát meropenému).

Liečivo je meropeném. Každá injekčná liekovka obsahuje 1000 mg meropenému (ako trihydrát meropenému).

Ďalšia zložka je bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Meropenem Eberth a obsah balenia

Meropenem Eberth je biely až svetložltý prášok na injekčný alebo infúzny roztok v injekčnej liekovke, Veľkosti balenia: 10 injekčných liekoviek v škatuľke.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Am Bahnhof 2
92289 Ursensollen
Nemecko

Výrobca:

VENUS PHARMA GmbH
Am Bahnhof 1 – 3
59368 Werne
Nemecko

European Pharma Hub Kft.
Gorcsev Ivan Utca 5
Gyal, 2360
Maďarsko

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Am Bahnhof 2
92289 Ursensollen
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia:	Meropenem Venus 500 mg powder for solution for injection or infusion Meropenem Venus 1 g powder for solution for injection or infusion
Taliansko:	Meropenem Venus Pharma 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione Meropenem Venus Pharma 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Írsko:	Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
Rakúsko:	Meropenem Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung Meropenem Eberth 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Holandsko:	Meropenem Eberth 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Eberth 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Island:	Meropenem WH 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn Meropenem WH 1 g stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
Malta:	Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
Nemecko:	Meropenem Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung Meropenem Eberth 1g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Slovenská republika:	Meropenem Eberth 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok Meropenem Eberth 1000 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2025.

Odporúčanie / medicínska osveta

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Nemajú žiaden účinok voči infekciám spôsobeným vírusmi.

Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na liečbu antibiotikami. Jedným z najčastejších dôvodov je to, že baktérie zapríčiňujúce infekciu sú na podané antibiotiká rezistentné. To znamená, že môžu prežívať a dokonca sa premnožiť a to aj napriek užívaniu antibiotík.

Baktérie sa môžu stať rezistentnými na antibiotiká z mnohých dôvodov. Starostlivé použitie antibiotík môže pomôcť znížiť pravdepodobnosť nadobudnutia bakteriálnej rezistencie voči nim.

Keď vám lekár predpíše antibiotikum, tak toto je určené výlučne na liečbu vášho súčasného ochorenia. Dodržiavanie nasledujúcich pokynov pomôže predísť vzniku rezistentných baktérií, ktoré by mohli zastaviť účinok antibiotík.

1. Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v stanovenom čase a správny počet dní. Prečítajte si písomnú informáciu a ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
2. Neužívajte antibiotiká, ak neboli predpísané osobitne pre vás a užívajte ich len na liečbu infekcie, na ktorú vám boli predpísané.
3. Neužívajte antibiotiká, ktoré boli predpísané iným pacientom, aj keby mali infekciu, ktorá je podobná tej vašej.
4. Nedávajte antibiotiká, ktoré boli predpísané vám, iným ľuďom.
5. Ak vám aj napriek dodržaniu pokynov lekára pre užívanie zostanú nejaké antibiotiká v balení, vráťte nespotrebovaný liek do lekárne za účelom správnej likvidácie.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov.

Pokyny na podávanie Meropenemu Eberth sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí

Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú zaškolení na podávanie Meropenemu Eberth v domácom prostredí.

Upozornenie - v domácom prostredí si tento liek môžete podávať alebo ho môžete podávať niekomu inému len vtedy, ak ste zaškolený lekárom alebo zdravotnou sestrou.

- Tento liek sa musí zmiešať s inou tekutinou (rozpúšťadlo). Váš lekár vám povie, aké množstvo rozpúšťadla použiť.
- Liek použite ihneď po jeho príprave. Neuchovávajte ho v mrazničke.

Ako pripraviť tento liek

1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný priestor.
2. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) Meropenemu Eberth z obalu. Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum expirácie. Skontrolujte, či je injekčná liekovka neporušená a či nebola poškodená.
3. Odstráňte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku vyschnúť.
4. Novú sterilnú ihlu nasadíte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez toho, aby ste sa dotkli jej koncov.
5. Do injekčnej striekačky natiahnite odporúčané množstvo sterilnej „vody na injekcie“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:

Meropenem 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok je zabalený v injekčnej liekovke o veľkosti 10 ml a za účelom podania injekcie sa môže roztok pripraviť s 10 ml vody na injekcie.

Meropenem 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok je zabalený v injekčnej liekovke o veľkosti 20 ml a za účelom podania injekcie sa môže roztok pripraviť s 20 ml vody na injekcie.

Dávka Meropenemu Eberth	Množstvo „vody na injekcie“ potrebné na nariadenie
500 mg (miligramov)	10 ml (mililitrov)
1 g (gram)	20 ml
1,5 g	30 ml
2 g	40 ml

Prosím všimnite si: Ak je vaša predpísaná dávka Meropenemu Eberth väčšia ako 1 g, budete musieť použiť viac ako 1 injekčnú liekovku Meropenemu Eberth. Potom môžete nabráť tekutinu z oboch injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.

6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnete stred sivej gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekcie do injekčnej liekovky alebo injekčných liekoviek Meropenemu Eberth.
7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potraďte asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju vysušiť.
8. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným na doraz prepichnete ihlou sivú gumovú zátku. Prítom musíte zároveň držať injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku a následne obrátiť injekčnú liekovku hore dnom.

9. Dajte pozor na to, aby hrot ihly zostal v tekutine a následne vytiahnite piest. Natiahnite (naberte) všetku tekutinu z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky.
10. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu injekčnú liekovku zahod'te na bezpečné miesto.
11. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do vrchnej časti striekačky.
12. Jemným stlačením piestu odstráňte všetok vzduch zo striekačky.
13. Ak Meropenem Eberth používate v domácom prostredí, zlikvidujte všetky použité ihly a infúzne sety primeraným spôsobom. Ak váš lekár rozhodne o ukončení vašej liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý Meropenem Eberth vhodným spôsobom.

Všimnite si prosím:

Infúzny roztok sa pripraví rozpustením lieku buď v 0,9 % infúznom roztoku chloridu sodného, alebo v 5 % infúznom roztoku glukózy na konečnú koncentráciu 1 až 20 mg/ml.

Pridajte do liekovky Meropenem 500 mg 10 ml infúzneho roztoku na prípravu, potom dobre pretrepte kvôli rozpusteniu a pridajte výsledný roztok do infúzneho vaku na riedenie.

Pridajte do liekovky Meropenem 1 g 20 ml infúzneho roztoku na prípravu, potom dobre pretrepte kvôli rozpusteniu a výsledný roztok pridajte do infúzneho vaku na riedenie.

Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon alebo prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra.

Podávanie Meropenemu Eberth prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon

1. Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhod'te do nádoby na použité ihly a striekačky.
2. Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým tampónom a nechajte ho vyschnúť. Otvorte viečko na vašej kanyle a pripojte injekčnú striekačku.
3. Pomaly tlačte piest injekčnej striekačky nadol, aby ste antibiotikum podali rovnomerne počas približne 5 minút.
4. Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a použite preplach podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.
5. Uzavrite viečko vašej kanyly a injekčnú striekačku opatrne vyhod'te do nádoby na použité ihly a striekačky.

Podávanie Meropenemu Eberth prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra

1. Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým tampónom a nechajte vyschnúť.
2. Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.

3. Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a použite preplach podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.
4. Na centrálny žilový katéter nasad'te nové čisté viečko a injekčnú striekačku opatrne vyhod'te do nádoby na použité ihly a striekačky.