

Písomná informácia pre používateľa

Imuclear obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Imuclear a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imuclear
3. Ako užívať Imuclear
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Imuclear
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Imuclear a na čo sa používa

Imuclear je tradičný rastlinný liek používaný pri prvých prejavoch prechladnutia a počas prechladnutia, ako je škriabanie v hrdle, bolesť hrdla, ťažkosti s prehĺtaním alebo dráždivý kašeľ.

Tento liek je tradičný rastlinný liek určený na indikácie (použitie) overené len jeho dlhodobým používaním.

Ak príznaky pretrvávajú počas užívania tohto lieku alebo ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Imuclear sa používa na liečbu detí vo veku od 6 rokov, ako aj dospelých a dospelých.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imuclear

Neužívajte Imuclear

- ak ste alergický (precitlivený) na koreň ibiša, kvet rumančeka, vňať prasličky, listy orecha, vňať rebríčka, dubovú kôru, vňať púpavy alebo na iné rastliny z čeľade astrovitých, napr. palinu, rebríček, chryzantému, margarétu, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.

Upozornenia a opatrenia

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň alebo ak sa vyskytne dýchavičnosť, vykašliavanie hnisu alebo hnisu s prímiesou krvi, navštívte lekára.

Deti

Použitie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča z dôvodu nedostatočných údajov a ako všeobecné preventívne opatrenie, pretože lieková forma „obalená tableta“ nie je vhodná pre deti vo veku do 6 rokov (pre riziko neúmyselného prehĺtnutia).

Iné lieky a Imuclear

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vzájomnom pôsobení s inými liekmi (interakčné štúdie). K dispozícii nie sú žiadne hlásenia o vzájomnom pôsobení Imuclearu a iných liekov.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Bezpečnosť lieku počas tehotenstva nebola stanovená. Užívanie Imuclearu počas tehotenstva sa neodporúča.

Nie je známe, či sa liečivá/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko u dojčeného novorodenca/dieťaťa nemôže byť vylúčené. Imuclear sa nemá užívať v období dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Imuclear obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Imuclear

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Vek	Dávkovanie v prípade akútnych príznakov	Dávkovanie po odznení akútnych príznakov
Deti vo veku 6-11 rokov	1 obalená tableta 5 až 6-krát denne	1 obalená tableta 3-krát denne
Dospievajúci vo veku od 12 rokov a dospelí	2 obalené tablety 5 až 6-krát denne	2 obalené tablety 3-krát denne

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o špecifických odporúčaní na dávkovanie u ľudí s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene.

Použitie u detí

Použitie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča z dôvodu nedostatočných údajov a ako všeobecné preventívne opatrenie, pretože lieková forma „obalená tableta“ nie je vhodná pre deti vo veku do 6 rokov (pre riziko neúmyselného prehltnutia).

Spôsob podávania

Perorálne použitie (užitie ústami).

Obalené tablety prehltnite nerozhryzené, najlepšie s trochou tekutiny (napr. pohárom vody).

Dĺžka liečby

Neužívajte dlhšie ako 2 týždne.

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 7 dní počas užívania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

Je dôležité, aby ste si prečítali informácie v časti „Upozornenia a opatrenia“, ako aj informácie v časti „Vedľajšie účinky“.

Ak užíjete viac Imuclearu, ako máte

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Ak ste užili väčšie množstvo Imuclearu, ako ste mali, informujte svojho lekára. Lekár rozhodne o všetkých potrebných opatreniach.

Ak zabudnete užiť Imuclear

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Imuclear

Ukončenie liečby je zvyčajne neškodné.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (napr. kožné vyrážky, žihľavka) a poruchy tráviaceho traktu (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 liečených osôb).

Ak si všimnete tieto alebo iné vedľajšie účinky, okamžite prestante liek užívať a poraďte sa s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Imuclear

Tento liek uchováajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo na pretlačovacom balení (blistri). Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Podmienky uchovávania:

Uchováajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Blistre (pretlačovacie balenie) uchováajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou (napr. do toalety alebo umývadla). Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Imuclear obsahuje

Liečivá sú:

1 obalená tableta obsahuje:

koreň ibiša, práškovaný	8 mg
dubová kôra, práškovaná	4 mg
kvet rumančeka, práškovaný	6 mg
vňat' púpavy, práškovaná	4 mg
vňat' prasličky, práškovaná	10 mg
vňat' rebríčka, práškovaná	4 mg
list orecha, práškovaný	12 mg

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát glukózy; monohydrát laktózy; kukuričný škrob; zemiakový škrob; oxid kremičitý, koloidný, bezvodý; kyselina stearová.

Obal tablety: uhličitan vápenatý; ricínový olej, panenský; dextrín; roztok glukózy; kukuričný škrob; montánny glykolový vosk; povidón K25; povidón K30; sacharóza; šelak (odvoskovaný); oxid kremičitý, koloidný, bezvodý; mastenec.

Ako vyzerá Imuclear a obsah balenia

Obalené tablety sú biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé s hladkým povrchom. Obalená tableta má priemer 8,0 – 8,3 mm.

Balenie s obsahom 50 obalených tabliet.

Balenie s obsahom 100 obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt, Nemecko

Tel.: +49 (0)9181 / 231-90

Fax: +49 (0)9181 / 231-265

E-mail: info@bionorica.de

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Rakúsko	Imupret Dragees
Česko, Belgicko	Imulgon
Francúzsko	Imuvalis
Grécko, Taliansko, Portugalsko	Imupret
Holandsko	Imudynon
Bulharsko	Imupret, coated tablets
Nemecko	Imupret N Dragees
Romunsko	Imupret drajeuri
Slovensko	Imuclear

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2026.