

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **Prindex 4 mg Prindex 8 mg tablety**

perindopril terc-butylamín

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Prindex a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prindex
3. Ako užívať Prindex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Prindex
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### **1. Čo je Prindex a na čo sa používa**

Perindopril je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín, (ACE) inhibítor.

Tieto lieky účinkujú tým, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu prečerpávať cez ne krv.

*Prindex 4 mg sa používa:*

- na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
- na liečbu srdcového zlyhávania (stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpať dostatok krvi potrebnej na zásobovanie všetkých častí tela),
- na zníženie rizika srdcových príhod, napríklad srdcového záchvatu, u pacientov so stabilným ochorením koronárnych artérií (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zastavené) a u pacientov, ktorí už prekonali srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou pomocou rozšírenia krvných ciev, ktoré srdce zásobujú.

*Prindex 8 mg sa používa:*

- na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
- na zníženie rizika srdcových príhod, napríklad srdcového záchvatu, u pacientov so stabilným ochorením koronárnych artérií (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zastavené) a u pacientov, ktorí už prekonali srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou pomocou rozšírenia krvných ciev, ktoré srdce zásobujú.

### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prindex**

**Neužívajte Prindex**

- ak ste alergický na perindopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.) alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor.
- ak ste už mali v minulosti z predchádzajúcej liečby ACE inhibítormi príznaky ako je sipot, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky alebo ste tieto príznaky mali za nejakých iných okolností vy alebo člen vašej rodiny (tento stav sa nazýva

- angioedém).
- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (tiež je lepšie vyhnúť sa užívaniu Prindexu na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).
- ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.
- ak podstupujete dialýzu alebo iný typ filtrovania krvi. V závislosti od použitého stroja sa môže stať, že Prindex nemusí byť pre vás vhodný.
- ak máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížený prístup krvi do obličiek (stenóza renálnej artérie).
- ak ste užívali alebo teraz užívate sakubitril/valsartan, liek ktorý sa používa na liečbu určitého typu dlhodobého (chronického) zlyhávania srdca u dospelých, pretože sa u vás zvyšuje riziko angioedému (náhly opuch pod kožou v oblasti, ako je hrdlo).

### **Upozornenia a opatrenia**

#### **Predtým, ako začnete užívať Prindex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.**

- ak máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej cievy, ktorá vychádza zo srdca) alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej artérie (zúženie tepny, ktorá zásobuje obličky krvou).
- ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom.
- ak máte problémy s pečeňou.
- ak máte problémy s obličkami alebo podstupujete dialýzu.
- ak máte v krvi nezvyčajne zvýšené hladiny hormónu, ktorý sa nazýva aldosterón (primárny aldosteronizmus).
- ak máte kolagénové cievne ochorenie (ochorenie spojivových tkanív), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia.
- ak máte diabetes (cukrovku).
- ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate náhrady solí, ktoré obsahujú draslík.
- ak máte podstúpiť anestéziu a/alebo veľký chirurgický zákrok.
- ak máte podstúpiť LDL aferézu (čo je odstránenie cholesterolu z krvi pomocou prístroja).
- ak máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu zameranú na zníženie prejavov alergie na uštipnutie včelou alebo osou.
- ak ste prednedávnom mali hnačku alebo ste vracali, alebo ste dehydratovaný.
- ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášate) na niektoré cukry.
- ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:
  - blokátory receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou,
  - aliskiren.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov v krvi (napríklad draslíka). Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Prindex“.

- ak ste čiernej rasy, pretože je u vás zvýšené riziko angioedému a tento liek môže byť menej účinný pri znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás.
- ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov, riziko angioedému sa môže zvýšiť:
  - racekadotril (liek používaný na liečbu hnačky),
  - lieky používané na predchádzanie odmietnutia transplantovaných orgánov a na liečbu rakoviny (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus),
  - vildagliptín, liek používaný na liečbu cukrovky,
  - sakubitril (dostupný vo fixnej kombinácii s valsartanom) používaný na liečbu dlhodobého zlyhávania srdca.

### Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Prindexu, bol hlásený angioedém (závažná alergická reakcia s opuchom tváre, pier, jazyka alebo krku s ťažkosťami pri prehĺtaní). Môže sa objaviť kedykoľvek počas liečby. Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, ukončíte užívanie Prindexu a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pozri tiež časť 4.

Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť). Prindex sa neodporúča užívať v ranom štádiu tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

### **Deti a dospievajúci**

Užívanie perindoprilu deťmi a dospievajúcimi do 18 rokov sa neodporúča.

### **Iné lieky a Prindex**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali iné lieky, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Liečbu Prindexom môžu ovplyvňovať iné lieky. Lekár vám môže zmeniť dávku a/alebo spraviť iné opatrenia. Sem patria:

- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, vrátane blokátorov receptorov angiotenzínu II (ARB), aliskirenu (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Prindex“ a „Upozornenia a opatrenia“) alebo diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču produkovaného obličkami.
- draslík šetriace lieky (napr. triamterén, amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík, iné lieky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka vo vašom tele (napr. heparín a kotrimoxazol, tiež známy ako trimetoprim/sulfametoxazol); cyklosporín, imunosupresívum, ktoré sa používa na predchádzanie odmietnutia transplantovaných orgánov; heparín, liek používaný na riedenie krvi na predchádzanie tvorby krvných zrazenín.
- lítium na liečbu mánie alebo depresie.
- nesteroidné protizápalové liečivá na zmiernenie bolesti (napr. ibuprofén), vrátane kyseliny acetylsalicylovej vo vysokých dávkach.
- lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín alebo metformín).
- baklofén (používa sa na liečbu svalovej stuhnutosti pri ochoreniach ako je skleróza multiplex).
- lieky na liečbu duševných porúch ako sú depresia, úzkosť, schizofrénia atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká).
- imunosupresíva (lieky na potlačenie imunitných reakcií organizmu), ktoré sa používajú na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii (napr. cyklosporín, takrolimus).
- trimetoprim (na liečbu infekcií).
- estramustín (na liečbu rakoviny).
- alopurinol (na liečbu dny).
- prokaínamid (na liečbu nepravidelného tlkotu srdca).
- vazodilatancia vrátane nitrátov (lieky, ktoré rozširujú cievy).
- lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín).
- soli zlata, najmä pri intravenóznom podaní (používajú sa na liečbu symptómov reumatoidnej artritídy).
- lieky, ktoré sú najčastejšie používané na liečbu hnačky (racekadotril) alebo lieky, ktoré sú najčastejšie používané, aby sa predišlo odmietnutiu transplantovaných orgánov (sirolimus, everolimus, temsirolimus a iné lieky patriace do triedy nazývanej inhibítory mTOR). Pozri časť „Upozornenia a opatrenia“.
- sakubiril/valsartan (používaný na liečbu dlhodobého zlyhávania srdca). Pozri časti „Neužívajte Prindex“ a „Upozornenia a opatrenia“.

### **Prindex a jedlo a nápoje**

Užívanie Prindexu je najvhodnejšie pred jedlom.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu skôr, ako začnete užívať tento liek.

### **Tehotenstvo**

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Zvyčajne vám váš lekár odporučí, aby ste prestali užívať Prindex predtým ako otehotníte alebo čo najskôr ako

zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Prindexu. Prindex sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

### **Dojčenie**

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Prindex sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a váš lekár vám vyberie inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Prindex zvyčajne neovplyvňuje pozornosť, ale pre nízky tlak sa môže u niektorých pacientov objaviť závrat alebo slabosť. Ak máte tieto príznaky, vaša schopnosť viesť vozidlo alebo narábať so strojmi môže byť porušená.

### **Prindex obsahuje laktózu.**

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

## **3. Ako užívať Prindex**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tabletu zapite pohárom vody, najlepšie každý deň ráno v rovnakom čase, skôr ako sa naraňajkuje. Váš lekár vám určí správnu dávku.

Odporúčané dávkovanie je nasledovné:

**Vysoký krvný tlak:** zvyčajná začiatočná a udržiavacia dávka sú 4 mg jedenkrát denne.

Po jednom mesiaci sa môže dávka zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne, ak je to potrebné. Maximálna odporúčaná dávka na liečbu vysokého tlaku krvi je 8 mg denne.

Ak máte 65 rokov alebo viac, zvyčajná začiatočná dávka sú 2 mg jedenkrát denne. Po jednom mesiaci sa môže dávka zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne a potom na 8 mg jedenkrát denne, ak je to potrebné.

**Srdcové zlyhávanie:** zvyčajná začiatočná dávka sú 2 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pri liečbe srdcového zlyhávania.

**Stabilné ochorenie koronárnych artérií:** zvyčajná začiatočná dávka sú 4 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne, čo je maximálna dávka pri tejto indikácii.

Ak máte 65 rokov alebo viac, zvyčajná začiatočná dávka sú 2 mg jedenkrát denne. Po jednom týždni sa môže dávka zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne a ďalší týždeň na 8 mg jedenkrát denne.

### **Použitie u detí a dospelých**

Použitie u detí a dospelých sa neodporúča.

### **Ak užijete viac Prindexu, ako máte**

Ak užijete príliš veľa tabliet, ihneď navštívte najbližšiu pohotovosť alebo kontaktujte svojho lekára. Najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sú nízky tlak krvi, ktorý u vás môže vyvolať závrat alebo omdlenie. Ak sa to stane, môže vám pomôcť, keď si ľahnete na zem a zdvihnete nohy.

### **Ak zabudnete užiť Prindex**

Je dôležité, aby ste svoj liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba lepšie účinkuje. Ak však

zabudnete užiť dávku Prindexu, užite až nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

#### **Ak prestanete užívať Prindex**

Keďže liečba Prindexom trvá väčšinou celý život, porozprávajte sa so svojim lekárom skôr, ako prerušíte užívanie tohto lieku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

#### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

**Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, prestaňte užívať váš liek a ihneď vyhľadajte lekára:**

- opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním (angioedém) (pozri časť 2. Upozornenia a opatrenia) (Menej časté – môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)
- silné závraty alebo mdloby z dôvodu nízkeho tlaku krvi (Časté - môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)
- veľmi rýchly alebo nepravidelný tep srdca, bolesť na hrudi (angína) alebo srdcový infarkt (Veľmi zriedkavé - môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
- náhly sipot, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť alebo problémy s dýchaním (bronchospazmus) (Menej časté – môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)
- zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), ktorý môže spôsobiť silnú bolesť brucha alebo chrbta s pocitom celkového nepohodlia (Veľmi zriedkavé - môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
- zožltnutie pokožky alebo očí (žltacka), čo môže byť prejav zápalu pečene (hepatitídy) (Veľmi zriedkavé - môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
- kožná vyrážka, ktorá sa často začína červenými svrbiacimi škvrkami na tvári, ramenách alebo nohách (multiformný erytém) (Veľmi zriedkavé - môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
- slabosť v ramenách alebo v nohách alebo problémy s rečou, čo môže byť prejav mozgovej mŕtvice (Veľmi zriedkavé - môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí).

**Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, povedzte o tom svojmu lekárovi:**

**Časté** (môžu postihnúť 1 z 10 ľudí)

- bolesť hlavy
- motanie hlavy
- pocit závratu a točenia (vertigo)
- mravčenie
- poruchy zraku
- tinnitus (zvonenie v ušiach)
- kašeľ
- dýchavičnosť (dyspnoe)
- gastrointestinálne poruchy (pocit na vracanie, vracanie, bolesť brucha, zmeny vnímania chuti, porucha trávenia alebo ťažkosti pri trávení, hnačka, zápcha)
- alergické reakcie (vyrážky na koži, svrbenie)
- svalové kŕče
- pocit slabosti

**Menej časté** (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

- zmeny nálady
- poruchy spánku
- sucho v ústach
- silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky

- vytváranie zoskupení pľuzgierov na pokožke (pemfigoid),
- problémy s obličkami
- impotencia (neschopnosť dosiahnuť erekciu)
- potenie
- nadbytok eozinofilov (určitého typu bielych krviniek)
- ospalosť
- mdloby
- palpitácie (búšenie srdca)
- tachykardia (rýchly pulz srdca)
- vaskulitída (zápal ciev)
- fotosenzitívna reakcia (zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie)
- artralgia (bolesť kĺbov)
- myalgia (bolesť svalov)
- bolesť na hrudi
- malátnosť
- periférny edém
- horúčka
- pády
- zmeny laboratórných parametrov: zvýšenie hladiny draslíka v krvi, ktoré sa upraví po prerušení liečby, znížená hladina sodíka, hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi) u diabetických pacientov, zvýšená hladina močoviny a kreatinínu v krvi
- depresia

**Zriedkavé** (môžu postihnúť 1 z 1 000 ľudí)

- zmeny laboratórných parametrov: zvýšená hladina pečeňových enzýmov, vysoká hladina bilirubínu v sére
- zhoršenie psoriázy
- tmavé sfarbenie moču, nevoľnosť (nauzea) alebo zvracanie, svalové kŕče, zmätenosť a záchvaty. Môže ísť o príznaky stavu nazývaného SIADH (syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu).
- zníženie alebo zastavenie tvorby moču
- začervenanie
- akútne zlyhanie obličiek

**Veľmi zriedkavé** (môžu postihnúť 1 z 10 000 ľudí)

- zmätenosť
- eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc)
- rinitída (upchanie nosa alebo tečenie z nosa)
- poruchy krvi, vrátane zníženého množstva bielych a červených krviniek, znížených hladín hemoglobínu, znížených hladín krvi
- hemolytická anémia u pacientov s vrodennou nedostatočnosťou G-6PDH. Ak máte tieto príznaky, čo najrýchlejšie kontaktujte svojho lekára.

**Neznáme** (z dostupných údajov)

- zmena sfarbenia, necitlivosť a bolesť v prstoch na rukách alebo nohách (Raynaudov fenomén)

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prilohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

**5. Ako uchovávať Prindex**

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajújte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Prvé 2 čísla znázorňujú mesiac a posledné čísla rok. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neužívajte tento liek, ak si všimnete zmenu farby na tabletách.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Prindex obsahuje**

Liečivo je perindoprilium.

Každá tableta Prindexu 4 mg obsahuje 4 mg terc-butylamóniovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 3,338 mg perindoprilu.

Každá tableta Prindexu 8 mg obsahuje 8 mg terc-butylamóniovej soli perindoprilu, čo zodpovedá 6,676 mg perindoprilu.

Ďalšie zložky sú: koloidný oxid kremičitý hydrofóbny, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy a stearát horečnatý.

### **Ako vyzerá Prindex a obsah balenia**

#### *Prindex 4 mg*

Biele podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách, s označením „PP“ na jednej strane tablety a „4“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

#### *Prindex 8 mg*

Biele okrúhle obojstranne vypuklé tablety s označením „PP“ na jednej strane tablety a „8“ na druhej strane.

Každá sila lieku je dostupná v Al/Al blistrových baleniach, ktoré obsahujú 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

#### Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4  
Česká republika

#### Výrobcovia:

- 1) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Fibichova 143  
566 17 Vysoké Mýto  
Česká republika
- 2) Bluepharma-Industria Farmaceutica S.A (len pre Prindex 4 mg)  
S.Maartinho do Bispo  
Coimbra, 3045-016  
Portugal

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:**

Holandsko	Perindopril tert-butylamine Glenmark 2/4/8 mg tabletten
Česká republika	Gleperil 4/8 mg
Maďarsko	Gleperil 4/8 mg tableta
Portugalsko	Perindopril Bluepharma
Slovenská republika	Prindex 4/8 mg

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2025.**