

Písomná informácia pre používateľa

Penicillamine Olikla 300 mg filmom obalené tablety penicilamín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Penicillamine Olikla a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Penicillamine Olikla
3. Ako užívať Penicillamine Olikla
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Penicillamine Olikla
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Penicillamine Olikla a na čo sa používa

Penicillamine Olikla patrí do farmakoterapeutickej skupiny: lieky, ktoré sa používajú na liečbu otráv a k úprave priebehu reumatických ochorení.

Penicillamine Olikla 300 mg je určený na liečbu:

- reumatoidnej artritídy (pretrvávajúce zápal kĺbov),
- Wilsonovej choroby (hepatolentikulárna degenerácia - dedičné ochorenie, pri ktorom je narušený metabolizmus medi),
- otravy spôsobenej ťažkými kovmi ako sú meď, zlato, olovo, ortuť,
- cystinúrie (ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšenému vylučovaniu cystínu močom).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Penicillamine Olikla

Neužívajte Penicillamine Olikla

- ak ste alergický na penicilamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- súbežne so soľami zlata alebo antimalarikami (liekmi na liečbu malárie).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Penicillamine Olikla, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Iné lieky a Penicillamine Olikla

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Penicillamine Olikla sa s vitamínom B6, antihistaminikami, analgetikami, protizápalovými liekmi ani kortikosteroidmi navzájom neovplyvňujú.

Penicillamine Olikla sa nesmie súbežne podávať so soľami zlata, antimalarikami a cytotoxickými liekmi.

Ak pacient podstúpil liečbu so soľami zlata, odporúča sa časový odstup medzi podaním liekov viac ako 6 mesiacov, čím sa vylúči riziko závažných nežiaducich účinkov penicilamínu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Reumatoidná artritída: užívanie sa neodporúča.

Wilsonova choroba: pokračovacia liečba sa odporúča.

Cystinúria: na základe zhodnotenia lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie skúmajúce účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Penicillamine Olikla

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie určí lekár v závislosti od závažnosti ochorenia.

Reumatoidná artritída:

Dospelí (úvodná dávka): ½ – 1 tableta denne rozdelená do 1 alebo 2 dávok.

(po 4 – 6 týždňoch): 1 – 2 tablety denne rozdelené do 1 alebo 2 dávok.

U niektorých pacientov sa denná dávka 600 mg – 1 500 mg rozdelí na 3 alebo 4 dávky počas dňa.

Účinok liečby sa zvyčajne dostaví po 6 až 12 týždňoch od začiatku liečby.

Minimálna účinná dávka sa má udržiavať 6 mesiacov a potom sa môže postupne znižovať (počas 2 alebo 3 mesiacov), kým sa nedosiahne udržiavacia dávka.

Wilsonova choroba:

Dospelí: 2 – 7 tabliet denne rozdelených do 2 alebo 4 dávok.

Deti: do 20 mg/kg/deň rozdelených do 2 alebo 4 dávok.

Otrava ťažkými kovmi:

20 – 40 mg/kg/deň rozdelených do 4 dávok.

Cystinúria:

Dospelí: 2 – 7 tabliet denne rozdelených do 2 až 4 dávok.

Deti: 30 mg/kg/deň.

Tablety lieku Penicillamine Olikla sa prehltávajú s vodou najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo po jedle, alebo po užití iných liekov a pred spaním.

Ak užíjete viac lieku Penicillamine Olikla, ako máte

Pri predávkovaní sa pozorujú najmä vedľajšie účinky.

V týchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojim lekárom.

Ak zabudnete užiť Penicillamine Olikla

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak zabudnete užiť dávku lieku Penicillamine Olikla, pokračujte v obvyklej dávke 1 hodinu pred ďalším jedlom alebo po ňom, alebo po užití iných liekov, alebo pred spaním.

Ak zabudnete užiť Penicillamine Olikla niekoľko dní, pokračujte v obvyklom dávkovacom režime, ako je popísané vyššie.

Ak prestanete užívať Penicillamine Olikla

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Reakcie z precitlivenosti: počas prvých týždňov liečby sa môže objaviť kožná vyrážka, žihľavka a horúčka. U pacientov alergických na penicilín sa môžu tiež vyskytnúť reakcie z precitlivenosti na penicilamín.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prilohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Penicillamine Olikla

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C a chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neužívajte tento liek, ak na tabletách spozorujete viditeľné znaky poškodenia.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Penicillamine Olikla obsahuje

- Liečivo je penicilamín (300 mg).
- Ďalšie zložky sú:
Tableta: mikrokryštalická celulóza, draselná soľ polakrilínu, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, stearát horečnatý a povidón.
Filmový obal: hypromelóza.

Ako vyzerá Penicillamine Olikla a obsah balenia

Balenie obsahuje 20 tabliet v PVC/PVDC-hliníkových blistroch.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Olikla s.r.o., náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

Výrobca

Medinfar Manufacturing, S.A., Parque Industrial Armando Martins Tavares, Rua Outeiro da Armada, 5, Condeixa-a-Nova, 3150-194 Sebal, Portugalsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Česká republika	Penicillamine Olikla
Portugalsko	Kelatine
Slovenská republika	Penicillamine Olikla

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2026.