

## Písomná informácia pre používateľa

### Soledum 100 mg mäkké gastrorezistentné kapsuly

cineol

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečíitali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudec cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Soledum 100 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Soledum 100 mg
3. Ako užívať Soledum 100 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Soledum 100 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Soledum 100 mg a na čo sa používa**

Soledum 100 mg je liek na liečbu príznakov zápalu priedušiek (bronchitídy) a bežného nachladnutia. Na prídavnú liečbu chronických a zápalových ochorení dýchacích ciest, ako je sínusitída (zápal prínosových dutín), chronická bronchitída (chronický zápal priedušiek), CHOCHP (chronická obstrukčná choroba plúc) a bronchiálna astma (chronické zápalové ochorenie dolných dýchacích ciest).

Soledum 100 mg je určený dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov.

Ak sa do 7 dní nebudec cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Soledum 100 mg**

**Neužívajte Soledum 100 mg**

- ak ste alergický na cineol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte čierny kašeľ alebo nepravý záškrt (pseudokrup – zápal hrtana).
- u detí vo veku do 12 rokov.

**Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Soledum 100 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte akékoľvek ochorenie so značnou precitlivenosťou dýchacích ciest.
- ak máte bronchiálnu astmu alebo CHOCHP, liečba liekom Soledum 100 mg sa má vykonávať len pod lekárskym dohľadom.
- ak t'ažkosti pretrvávajú dlhšie ako týždeň, alebo ak sa objaví dýchavičnosť, teplota alebo vykašliavanie hnisu alebo krvi, navštívte svojho lekára.

Hned' ako sa prejavia počiatočné príznaky reakcie precitlivenosti, prestaňte užívať Soledum 100 mg.

**Iné lieky a Soledum 100 mg**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri pokusoch na zvieratách cineol navodzuje látkovú premenu (metabolizovanie) enzymov v pečeni. Preto sa nedá vylúčiť, že vysoké dávky cineolu môžu oslabiť a/alebo skratiť účinok iných liekov. Zatiaľ sa takýto účinok pri použití cineolu u ľudí nepozoroval.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

#### Tehotenstvo

Nie sú dostupné žiadne vedecké štúdie o užívaní lieku Soledum 100 mg počas tehotenstva. Ak ste tehotná, musíte užívanie lieku Soledum 100 mg konzultovať so svojím lekárom.

Pri pokusoch na zvieratách s potkanmi prechádzalo liečivo lieku Soledum 100 mg, cineol, cez placentu do krvného obehu plodu. Výsledky pokusov na zvieratách, ktoré sú k dispozícii, však nenaznačujú výskyt prípadných poškodení.

#### Dojčenie

Vzhľadom na to, že ide o liečivo, ktoré je v tuku rozpustné, jeho vylučovanie do materského mlieka sa nedá vylúčiť. Neexistujú však štúdie s týmto zameraním, ani s ohľadom na možný výskyt nežiaducích vedľajších účinkov. Esenciálne oleje môžu zmeniť chuť materského mlieka, a tým spôsobiť problémy s dojčením. V období dojčenia užívajte Soledum 100 mg len po konzultácii s lekárom.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Neboli vykonané žiadne štúdie.

### **Soledum 100 mg obsahuje sorbitol a sodík**

Tento liek obsahuje 11 mg sorbitolu (vo forme sorbitolu, nekryštalizujúceho roztoku 70 % (E420) v každej kapsule.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v každej kapsule, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

### **3. Ako užívať Soledum 100 mg**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár nepredpíše inak, odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov: 2 kapsuly 3-krát denne.  
Celková denná dávka: 6 kapsúl (čo zodpovedá 600 mg cineolu).

Soledum 100 mg môžu užívať aj pacienti s cukrovkou (diabetici).

Prehltnite kapsulu Soledum 100 mg vcelku (nerozhrýzajte) a zapite ju veľkým množstvom nie veľmi horúcej tekutiny (odporúča sa jeden pohár čistej vody [200 ml]) najmenej pol hodiny pred jedlom. Ak máte citlivý žalúdok, odporúča sa užiť kapsulu Soledum 100 mg počas jedla.

Dĺžka liečby liekom Soledum 100 mg záleží od typu, závažnosti a priebehu ochorenia.

Ak t'ažkosti pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, ak sa objaví dýchavičnosť, teplota alebo v prípade vykašliavania hnisu alebo krvi, navštívte svojho lekára.

Ak máte dojem, že je účinok lieku Soledum 100 mg veľmi silný alebo veľmi slabý, poraďte sa so svojím lekárom.

### **Ak užijete viac lieku Soledum 100 mg, ako máte**

Doposiaľ neboli zaznamenané žiadne otravy v dôsledku užívania lieku Soledum 100 mg.

Ak máte podozrenie, že ste užili veľmi veľa lieku Soledum 100 mg, informujte o tom svojho lekára. Podľa závažnosti príznakov otravy lekár rozhodne o potrebných opatreniach.

Možné príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak užijete viac lieku Soledum 100 mg ako máte, sú poruchy centrálnej nervovej sústavy ako je zastreté vedomie, únava, slabosť končatín, zúženie zrenice (míóza) a v závažnejších prípadoch – kóma a poruchy dýchania.

### **Ak zabudnete užiť Soledum 100 mg**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Na vyjadrenie frekvencie vedľajších účinkov sa používajú nasledujúce štandardné kategórie:

- Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
- Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
- Neznáme (časťosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Menej časté:

Môžu sa vyskytnúť tráviace ťažkosti (napr. nevol'nosť, hnačka).

Zriedkavé:

Hlásené boli reakcie precitlivenosti (napr. tvárový edém, svrbenie, respiračná tieseň (porucha dýchania), kašeľ) a bolestivé a namáhavé prehlítanie (dysfágia).

Ak sa u vás objavia prvé príznaky reakcie precitlivenosti, okamžite prestaňte užívať Soledum 100 mg.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Soledum 100 mg**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Soledum 100 mg obsahuje**

- Liečivo je cineol.  
1 mäkká gastrorezistentná kapsula obsahuje 100 mg cineolu.
- Ďalšie zložky sú: triacylglyceroly, so stredne dlhým reťazcom, sorbitol, nekryštalizujúci roztok 70 % (E420) (Ph. Eur.), želatína, 85 % glycerol, etylcelulóza, amoniak, koncentrovaný roztok, kyselina olejová, alginát sodný, kyselina stearová, kandelilový vosk.

Poznámka pre diabetikov: jedna kapsula Soledum 100 mg zodpovedá 0,0013 chlebovým jednotkám.

#### **Ako vyzerá Soledum 100 mg a obsah balenia**

Soledum 100 mg sú priehľadné, mäkké, želatínové kapsuly béžovej farby, oválneho tvaru (s dĺžkou približne 10 mm a hrúbkou asi 7 mm), s povrchom odolným voči žalúdočným šťavám.

Veľkosti balenia:

Originálne balenie s obsahom 20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl.  
Originálne balenie s obsahom 25 mäkkých gastrorezistentných kapsúl.  
Originálne balenie s obsahom 50 mäkkých gastrorezistentných kapsúl.  
Originálne balenie s obsahom 100 mäkkých gastrorezistentných kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

#### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

##### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii**

Cassella-med GmbH & Co. KG  
Gereonsmühlengasse 1  
50670 Kolín  
Nemecko

##### **Výrobca**

Klosterfrau Berlin GmbH  
Motzener Str. 41  
12277 Berlín  
Nemecko

a

Artesan Pharma GmbH & Co. KG  
Wendlandstr. 1  
29439 Lüchow  
Nemecko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2021.**